

20249/8

.

TABLEAU

DE

ÉCOLE DE BOTANIQUE DU JARDIN DU ROI.

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE

DU JARDIN DU ROI,

Par M. DESFONTAINES, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur, Professeur de Botanique, etc.

SECONDE ÉDITION.

A PARIS,

Chez J. A. BROSSON, Libraire, rue Pierre-Sarrazin, nº 9.
1815.

DE L'IMPRIMERIE DE FEUGUERAY,

rue Pierre-Sarrazin, nº 11.



The state of the s

AVERTISSEMENT.

Le Tableau que j'offre au Public renferme les noms latins et français des plantes cultivées dans le Jardin du Roi. Ce petit Ouvrage est particulièrement destiné à faciliter la correspondance avec les Etrangers, et à leur indiquer les végétaux qu'ils peuvent acquérir, et ceux dont ils peuvent enrichir le Jardin par des échanges réciproques.

J'ai suivi les familles naturelles de M. de Jussieu, établies depuis un grand nombre d'années dans l'Ecole de Botanique, et dont les avantages se font sentir de jour en jour. Les espèces ont été disposées méthodiquement, et, autant qu'il m'a été possible, d'après leurs rapports, asin

d'en faciliter l'étude.

Les noms des auteurs ont été rapportés à chaque plante avec toute l'exactitude dont je suis capable, et ce travail a demandé beaucoup de soins et de recherches. J'ai ajouté à plusieurs espèces des synonymes dont quelques-uns étoient difficiles à trouver, afin que les Botanistes évitent à l'avenir d'indiquer, comme espèces distinctes, des plantes qui sont les mêmes, quoique désignées dans divers ouvrages sous des noms différens. Celles qui sont annuelles, bisannuelles, vivaces ou ligneuses, ont été distinguées par les signes universellement adoptés, et j'ai noté par des abréviations dont je donne l'explication, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris. M. Thouin l'aîné a bien voulu se charger de revoir cette partie de mon travail; M. de Lamarck m'a communiqué ses herbiers; de sorte que j'ai pu comparer un grand nombre de plantes du Jardin avec celles qu'il a décrites dans son Dictionnaire de Botanique, et que l'on peut compter sur l'exactitude des noms que j'ai donnés d'après lui.

J'ai desséché un individu de chaque espèce désignée dans mon Tableau, et j'ai écrit à côté le nom qu'elle y porte; de manière qu'on pourra toujours en reconnoître l'identité, et même rectifier les erreurs de nomenclature qui pourroient m'être échappées. Cette précaution sera également utile pour vérifier facilement les plantes qui seront envoyées par les correspondans, et pour corriger, sans beaucoup de peine, les fautes inévitables qui se commettent chaque année dans l'Ecole de Botanique, soit par la dissémination des graines d'une place dans une autre, soit par la transposition des étiquettes, ou autres accidens.

La collection des plantes vivantes cultivées au Jardin du Roi, et dont le nombre est de plus de six mille, sans y comprendre les variétés, est sans contredit une des plus riches de l'Europe; elle offre un champ vaste à l'étude, et de grandes ressources à l'agriculture par les nombreuses distributions de graines que l'on y fait chaque année. Ce Jardin est un dépôt où viennent se rendre toutes les richesses végétales que l'on peut se procurer des diverses parties du globe, d'où elles se répandent dans nos départemens, chez les autres nations de l'Europe, et souvent même audelà des mers. La France lui doit, depuis l'époque de sa création, un grand nombre d'arbres étrangers, de plantes économiques et d'agrément qui se sont multipliés sur son sol; en un mot, cet Etablissement, par son but d'utilité publique et par sa magnificence, est digne de la protection que le Gouvernement lui accorde.

EXPLICATION des abréviations et des signes indicatifs de la durée des Plantes.

Af. Afrique. ile de F. Ile de France. Am. m. Amérique méridionale. N. Esp.. Nouvelle-Espagne. Am. s.. Amérique septentrionale. N. Holl. Nouvelle-Hollande. Ant.... Antilles. As.... Asie. (alim.). Alimentaire. As. min. Asie mineure. (écon.). Economique. (méd.). Médicinale. Esp.... Espagne. (orn.).. Ornement. Eur.... Europe. (vén.).. Vénéneuse. F..... France. F. m... France méridionale.

Noms d'Auteurs.

All. Ped.....

Allioni, Flora pedemontana.

Auct	— Auctuarium.
undr. rep	Andrews, Repository.
Arduin. spec	Arduini, Specimen.
Balbis, Add	Balbis, Miscellanea et Additamentum ad Floram
	pedemontanam.
— H. Taur	— Hortus taurinensis.
Beauv. Agrost	Beauvois, Agrostographie.
Bellardi, App	Appendix ad Floram pedemontanam.
Bill. N. Holl	La Billardière, Novæ Hollandiæ plant. Specimen.
Bonpland, Malm	Plantes rares de Navarre et de la Malmaison.
— Equinox	— Plantes équinoxiales.
Bosc, Dict	Dictionnaire d'Agriculture.
— soc. Lin. Par	- Actes de la Société d'Histoire naturelle de
	Paris.
Bot. Magaz	Botanical Magazin.
Brotero, Fl	Flora lusitanica.
- Phyt	- Phytographia lusitaniæ Selectior.
Brown. Prodr	Prodromus Floræ N. Hollandiæ.
cav. Ic	Cavanilles, Icones.
- piss	— Dissertationes.
correa, s. Lin	Transactions of the Linnean Society.
crantz, Austr	Stirpium austriacarum Fasciculi.
curtis, Fl	Flora Londinensis.
cyrillo, pec	Plant. rariorum regni neapolitani Fasciculi.
Dec. Ann	Decandolle, Annales du Muséum d'Histoire
	naturelle.
Astr.	

(viii)

Dec. cat	Decandolle, Catalogus plant. horti botanici
	Monspeliensis.
Fl	
Delile, Fl	
- $x = x + y + y + y + y + y + y + y + y + y +$	
Desf. Atl	
- Ann	
— Acad	
	Paris.
Desvaux, Journ	Journal de Botanique.
Duham. Arbr	
-Ed. n	
punal, sol	Amount and the second s
Encycl	Service and the service and th
- suppl	
Fl. pan	
Fl. per	
Forsk. Fl	
Gærin	
Good. s. Lin	
Gouan, Ill	Illustrationes.
Guers. s. philom	Guersant, Bulletin de la Société philomatique.
Haw. Mesemb	Haworth, Observations on the genus Mesem-
	bryanthemum.
H. K	Hortus Kewensis, ed. 2ª.
	Icones et Descriptiones graminum, etc.
Jacq. Amer	Jacquin, Selectarum Stirpium americanarum
	Historia.
Austr	
- collect	
- Fragm	
— н. schœп	
— Hort	- Hortus vindobonensis.
1C	
- miscell	
obs	
-ox	— Oxalis.
Juss. Ann	De Jussieu, Annales du Muséum d'Histoire na- turelle.
was law a name	
Kæler, Gram	
Lambert, Pin	
Lamk, Ill	Lamarck, Illustration des genres. — Journal d'Histoire naturelle.
	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Lapeyr. Pyr	The state of the s
Leers, Herb	
L'Hérit. corn	
Ger. ,	
CIC1	· ~ ~ variation of Prote

r werit cert	
11 11 01 10. 3010.	L'Héritier, Sertum anglicum.
-stirp	- Stirnes nove
	Times C : D
	Linnæus, Species Plantarum.
— <i>Mant</i>	— Mantissa.
-L.f.	- Filius, Supplementum.
zois. Fl	Loiseleur, Flora gallica.
Maisch, cauc.	Marschall, Flora Taurico-caucasica.
Marco stan	Maischair, Piora Laurico-caucasica.
mas. stap	Masson, Stapeliæ novæ.
Mich. Fl	Michaux, Flora boreali Americana.
Mich. Arbr	Michaux fils, Histoire des Arbres forestiers de
	l'Amérique septentrionale.
Goett.	Commontario Son Continue
William C Tron	— Commentaria Soc. Goettingensis.
murray, s. veg	Systema vegetabilium.
Nester, Pot	Potentillæ genus (manuscrit).
ortega, pec	Decades.
Pallas, Astrag.	Species Astragalorum, etc.
— <i>Itin</i>	Voyages
77 /01 10 01 100 1	- voyages.
- N. Act. petrop	- Nova Acta Petropolitana.
— Ross	— Flora rossica.
pers. syn	Persoon, Synopsis.
Pollich. Palat	Historia Plant. in Palatinatu sponte nascentium.
Pouret Act Tolos	Mémoires de l'Académie de Toulouse.
Panat town dirit	Demones de l'Academie de Louionse.
hamai.Journ.a Hist.nat	Ramatuelle, Journal d'Histoire naturelle.
Ramond, S. Phyl	Bulletin de la Société Philomatique.
Red. Lil	Redouté, Liliacées.
Retz. obs	Retzius, Observationes botanicæ.
salish prodr	Salisbury, Prodromus.
schk car	Salabala II'd in 1 Company
schk. car	
schousb. Maroc	, () ()
schrad. Germ	Schrader, Flora germanica.
schreb. gram	Schreber, Gramina.
spicil	
- vert	- Plantarum verticillatarum unilabiatarum ge-
	- Plantarum verticillatarum unilabiatarum ge- nera et species.
scop. carn	- Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica.
	- Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica.
scop. carn	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ.
scop. carn — Insub smith, fl	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica.
scop. carn — Insub smith, Fl — N. Holl	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland.
scop. carn. — Insub. smith, Fl. — N. Holl. — pict.	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ.
scop. carn	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society.
scop. carn	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum.
scop. carn	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum.
scop. carn — Insub smith, Fl — N. Holl — Pict — soc. Lin — spicil sonn. Itin	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc.
scop. carn — Insub smith, fl — N. Holl — Pict — soc. Lin — spicil sonn. Itin swartz, obs	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ.
scop. carn — Insub smith, fl — N. Holl — Pict — soc. Lin — spicil sonn. Itin swartz, obs — orchid	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ. Orchides.
scop. carn. — Insub. smith, Fl. — N. Holl. — Pict. — soc. Lin. — spicil. sonn. Itin. swartz, obs. — orchid. — Prodr.	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ. Orchides. Prodromus.
scop. carn — Insub smith, fl — N. Holl — Pict — soc. Lin — spicil sonn. Itin swartz, obs — orchid — prodr. Thouin, Ann	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ. Orchides. Prodromus. Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
scop. carn — Insub smith, fl — N. Holl — Pict — soc. Lin — spicil sonn. Itin swartz, obs — orchid — prodr. Thouin, Ann	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ. Orchides. Prodromus. Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
scop. carn. — Insub. smith, fl. — N. Holl. — Pict. — soc. Lin. — spicil. sonn. Itin. swartz, obs. — orchid. — prodr. Thouin, Ann. Thuilier, fl.	 Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et species. Scopoli, Flora carniolica. Deliciæ floræ et faunæ insubricæ. Flora britannica. A Specimen of the Botany of New-Holland. Icones pictæ. Transactions of the Linnean Society. Spicilegium botanicum. Sonnerat, Voyage aux Indes orientales, etc. Observationes botanicæ. Orchides. Prodromus.

vahl, symb	Symbolæ botanicæ.
Wald. et Kitt. Hung	the second secon
, S	Plant. rariorum Hungariæ.
wendl. sert. Hann	
vent. choix de pl	Ventenat, Choix de Plantes.
—н. cels	
Inst	- Mémoires de l'Institut.
— мalт	— Jardin de la Malmaison.
vill. Delph	Villars, Histoire des Plantes du Dauphiné.
willd. Enum	
2.00.000	berolinensis.
— Enum. suppl	
— н. вегоl	
sp	— Species plantarum.
viviani, Fragm	Floræ italicæ Fragmenta.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	221011010 21451101104
⊙	Annuel.
o'	ten t
Z	Vivace.
b	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
or,	Orangerie.
s. ch	
1	, ,
reage entities	
July	

Cyi , to continue ? 100.

Cyi , to continue ? 100.

Cir pl. 100.

of the second se

CANAL ELLEN THE CALL TO CALL T

The state of the s

TABLEAU

DE

L'ÉCOLE DE BOTANIQUE DU JARDIN DU ROI.

CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

CLASSE I.

ACTYLÉDONS.

Nota. Cette Classe a été supprimée du Tableau, parce que les Plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

ORDO I.

FILICES.

I. Capsula nuda nec annulo cincta.

Ophioglossum vulgatum z.

Botrychium Lunaria swartz, syn.) osmunda Lunaria z. (

Dit a, as butter so so

Hydroglossum
japonicum willd, H. Berol.
Lygodium japonicum swartz,
syn.

CLASSE II.

MONOCOTYLÉDONS.

ORDRE I.

FOUGÈRES.

I. Capsules nues et sans anneau.

OPHIOGLOSSE
commune. F. L

BOTRYCHIUM

Lunaire. F. Y

HYDROGLOSSUM

du Japon. s. ch. 4

Osmunda regalis z.

II. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

Acrostichum aureum L. marantæ L.

officinarum willd. sp. asplenium ceterach z.

POLYPODIUM.

1. Fronde simplici. crassifolium L.

2. Fronde pinnatifidâ.

phymatodes L. Mant. aureum L. vulgare L. cambricum L.

3. Fronde bipinnatifidá.phegopteris L.4. Fronde suprà-decompositá.

pryopteris L.

III. Capsula indusio velata.

ASPIDIUM.

1. Fronde ternata.

trifoliatum swartz, syn. }
Polypodium trifoliatum L.

2. Fronde pinnata.

polypodium Lonchitis L. achrosticoides swartz, syn.

3. Fronde bipinnatifida, indusio reniformi.

oreopteris swartz, syn.
Thelypteris swartz, syn.
Polypodium Thelypteris L.
molle swartz, syn.
cristatum swartz, syn.

OSMONDE officinale. F. Z (méd.)

II. Capsules nues, entourées d'un anneau.

Acrostic doré. Antilles. s. ch. Z de Maranta. f. Alpes. Z

Сетекасн officinal. F. \u03c4 (med.)

POLYPODE.

1. Feuilles simples.

à feuill. épaiss. Ant. s. ch. 72

2. Feuilles pinnatisides.

phymatode. mde. s. ch. & doré. Antilles. s. ch. & commun. F. & (méd.)
. lacinié. F. &

3. Feuilles deux fois pinnatifides.

Phégoptéris. F. 72

4. Feuillage décomposé.

pry optéris. F. L

III. Capsules reconvertes d'une enveloppe.

ASPIDIUM.

1. Feuilles ternées.

trifolié. Antilles. s. ch. Z

2. Feuilles pennées.

faux Acrostic, virginie, V

3. Feuilles deux fois pinnatifides; enveloppe réniforme.

oréoptéris. F. Y

Thélyptéris. F. Y

à feuill. moll. Am. m. s. ch. Z à crête. suisse. Z 4. Fronde bipinnata triplicato-pinnatave, 4. Feuilles deux ou trois fois pennées, indusiis reniformibus.

rilix-mas swartz. syn. polypodium Filix-mas L. Filix fæmina swartz. syn. polypodium rilix fæmina L. aculeatum swartz. syn. polypodium aculeatum z. dilatatum swartz. syn. rigidum swartz. syn. fragrans vill. nelph. Halleri willd. sp. fontanum swartz. syn. bulbiferum swartz. syn. polypodium bulbiferum z. fragile swartz. syn. Polypodium fragile L. rhæticum swartz. syn. polypodium rhæticum L. S montanum swartz. syn. myrrhidifolium vill. pelph.

ONOCLEA sensibilis L.

ASPLENIUM

septentrionale willd. sp. Acrostichum septentrion. z. marinum L. acrostichoides swartz. syn. Trichomanes L. furcatum swartz. syn. Ruta-muraria L. Adiantum-nigrum. L.

SCOLOPENDRIUM officinarum swartz. syn. Asplenium scolopendrium L.

BLECHNUM occidentale L. boreale swartz. syn. osmunda spicant L.

WOODWARDIA radicans swartz. syn.

PTERIS aquilina L. arguta swartz. syn. serrulata L.

- batus a fr

enveloppe réniforme.

Fougère mâle. F. Z (méd.) Fougere femelle. F. 4 à aiguillons. F. Z. dilaté. F. 74 à feuilles roides. F. Z de Haller. Alpes. Z bulbisère. canada. ¥ fragile. F. 7

de Rhétie. Alpes. 4 des montagnes. Alpes. 4

ONOCLEA sensible. Am. s. T

ASPLENIUM

du nord. F. T

maritime. F. ¥ faux Acrostic. Am. s. 4 Trichomanes. F. Z cunéiforme. cap. or. ¥ Rue des murailles. F. Z (méd.) capillaire noir. F. L (méd.)

SCOLOPENDRE

officinale. F. Z (méd.).

BLECHNUM d'occident. Inde. s. ch. 4 du nord. F. Y

WOODWARDIA prolifère. italie. or. Z

PTERIS

Fougère commune. F. F. à seuill. en scie. canar. or. Z crénelée. inde. s. ch. 14

cretica L.
longifolia L.
crispa swartz. syn.
osmunda crispa L.

CHEILANTHES

odora swartz. syn.

polypodium fragrans besf. Atl.

pteris acrosticha Balbis. Add.

ADIANTUM
reniforme L.
pedatum L.
capillus-veneris L.

DAVALLIA

canariensis swartz. syn.

Trichomanes canariense L.

ORDO II.

RHIZOSPERMÆ.

PILULARIA globulifera z.

Marsilea quadrifolia L.

ORDO III.

CICADEÆ.

pumila *Encycl*. (non *Lin*.)
furfuracea *willd*. *sp*.
integrifolia *Jacq*. *Ic*.
spiralis. *salisb*. *Prodr*.
tridentata *willd*. *sp*.

CYCAS

circinalis L.

revoluta Thunb. Jap.

ORDO IV.

EQUISETACEÆ.

Equiserum
arvense z.
sylvaticum z.
palustre z.
fluviatile z.

de Crète. or. Z à f. long. antill. s. ch. Z crépue. Alpes. Z

CHEILANTHE

odorant. f. m. or. Z

ADIANTUM réniforme. canaries. or. 軍 de Canada. 軍 (méd.) de Montpellier. 軍 (méd.)

DAVALLIA

des Canaries. or. Z

RHIZOSPERMES.

PILULAIRE
à globules. F. γ

MARSILEA

à quatre feuilles. F. 軍

ORDRE III. CICADÉES.

ZAMIA

nain. Am. s. s. ch. 5

fursuracé. inde. s. ch. 5

à feuill. entières. inde. s. ch. 5

en spirale. N. Holl. s. ch. 5

tridenté. N. Holl. s. ch. 5

en éventail. inde. s. ch. b roulé. Japon. s. ch. b

ORDRE IV. ÉQUISÉTACÉES.

PRÉLE

des champs. F. W

des bois. F. W

des marais. F. W

des rivières. F. W

limosum z. hyemale z.

ORDO V.

NAIADES.

HIPPURIS vulgaris L.

Vulgaris L.
tomentosa L.
flexilis L.

CERATOPHYLLUM submersum L, demersum L.

NAIAS

major Dec. Fl.
monosperma willd. sp. }

minor Dec. Fl.
caulinia fragilis willd. sp.

SAURURUS cernuus L.

Potamogeton
natans L.
perfoliatum L.
densum L.
lucens L.
crispum L.
compressum L.
peclinatum L.
gramineum L.
pusillum L.

Ruppia maritima z.

Zanichellia palustris L.

Verna L.

— angustifolia

— autumnalis L.

Lemna
polyrhiza z.
minor z.
gibba z.
trisulca z.

limoneuse. F. Z. d'hiver. F. Z

ORDRE V.

NAIADES.

HIPPURIS (onagraires. Decand.)
aquatique. F. 72

CHARA

commun. f. ①

cotonneux. f. ①

flexible. f. ①

Ceratoph velum (salicaires. dec.)
à fruit lisse. F. Z
à fruit épineux. F. Z

NAIADE

à feuilles lancéolées. F. O

à feuilles lineaires. F. O

SAURURUS incliné. Am. s. Z

Potamogeton (Alismacées, pes.)
flottant. F. W
perfolié. F. W
bifurqué. F. W
luisant. F. W
crépu. F. W
comprimé. F. W
pectiné. F. W
à feuilles de Gramen. F. W
grêle. F. W

Ruppia (Alismacées. Dec.)
maritime. F. (?)?

ZANICHELLE (Alismacées. Dec.)
des marais. F. ①

CALLITRIC (onagraires. Dec.)
printanier. F. ①

- à seuilles étroites.

LEMNA

à larges feuilles. F. ⊙

à petites feuilles. F. ¥

— gibbeux.

à trois sillons. F. ¥

Plantæ monocotyledones staminibus hypogynis.

ORDOI.

AROIDE E.

I. Spadix spathâ involutus.

AMBROSINIA Bassii L.

ARUM.

1. Acaulia, foliis compositis.

crinitum willd. sp. }
muscivorum z. f. }
clavatum.
Dracunculus z.
Dracontium z.
triphyllum z.

2. Acaulia, foliis simplicibus.

maculatum z.
italicum encycl.
Arisarum z.
colocasia z.
pictum z. f.
tenuifolium. z.
divaricatum z.
trilobatum z.

CALADIUM.

I. Acaulia.

reticulatum.
punctatum.
sagittifolium willd. sp.
violaceum.
bicolor vent. H. cels.

2. Caulescentia.

lacerum willd. sp.
seguinum willd. sp.
auritum willd. sp.
tripartitum willd. sp.

CALLA

æthiopica z.
palustris z.

Plantes monocoty lédones à étamines sous le pistil.

ORDRE I.

AROÏDES.

I. Spadice entouré d'une spathe.

Ambrosinia
de Bassi. sicile. or. 75

ARUM.

1. Point de tiges, feuilles composées.

en massue. s. ch. Z serpentaire. F. Z (méd.) Dracontium. Am. s. or. Z à trois feuilles. Am. s. Y

2. Point de tiges, feuilles simples.

maculé. F. Z (méd.)
d'Italie. Z
capuchon. F. m. or. Z
colocase. Egypte. s. ch. Z
veiné. Minorque. or. Z
à feuilles étroites. F. m. or. Z
divergent. Inde. s. ch. Z
trilobé. Inde. s. ch. Z

CALADIUM.

1. Point de tiges.

à réseau. s. ch. L moucheté. s. ch. L hasté. Antilles. s. ch. L violet. Antilles. s. ch. L bicolor. Buénos-Ayres. s. ch. L

2. Une tige.

lacéré. Antilles. s. ch. 5 à f. de Balisier. Antill. s. ch. 5 auriculé. Antilles. s. ch. 5 trilobé. caracas. s. ch. 5

CALLA

d'Ethiopie. cap. or. Z (orn.)
des marais. F. Z

Dracontium pertusum L. polyphyllum L.

Ротноѕ

crassinervia Jacq. 1c. lanceolata L. cordata L.

II. Spadix spatha destitutus.

ORONTIUM japonicum Thunb. Jap.

Acorus calamus z. gramineus *H. K.*

ORDO II.

TYPHÆ.

Турна

latifolia z. angustifolia z. minima Dec. Fl.

SPARGANIUM
erectum L.
simplex smith. Fl.
natans L.

ORDO III.

CYPEROIDE Æ.

I. Flores monoici.

CAREX.

1. Spica unica simplici.

dioica z.
pulicaris z.

2. Spicis androgynis.

fætida All. Ped.
baldensis L.
cyperoides schk. car.
bohemica schreb. gram.
disticha schreb. spic.
intermedia good. s. Lin.
spicata Encycl.
arenaria Leers. Herb. (non Lin.)

DRACONTIUM

perforé. Antilles. s. ch. 5
à f. nombr. surinam. s. ch. 9

Pothos

à gross.nervur.caracas.s.ch. L' lancéolé. Antilles. s. ch. L à f. en cœur. Antill. s. ch. L

II. Spadice sans spathe.

ORONTIUM
du Japon. s. ch. ¥

Acorus

aromatique. r. \u03c4 (méd.)
à feuilles étroites. chine. or. \u03c4

ORDRE II.

MASSETTES.

MASSETTE

à larges feuilles. F. V

à feuilles étroites. F. V

petite. F. V.

Ruban-d'eau rameux. f. W à tige simple. f. W flottant. f. W

ORDRE III.

SOUCHETS:

I. Fleurs monoïques.

CAREX.

1. Un seul épi simple.

dioïque F. V pulicaire. F. V

2. Épis androgynes.

fétide. Alpes. ¥
du mont Baldo. Italie. ¾
cypéroïde. F. ¥

à deux rangs. F. Z

atrata L.
arenaria L.
tenella Thuil. Fl.
ovalis Good. S. Lin.
vulpina L.
muricata L.
stellulata Good. S. Lin.
divulsa Good. S. Lin.
curta Good. S. Lin.
elongata L.
brizoides L.
paniculata L.
teretiuscula Good. S. Lin.
remota L.

3. Spicis sexu distinctis, famineis sessilibus.

digitata L.
flava L.
œderi Roth. Germ.
extensa Good. s. Lin.
montana L.
collina willd. sp.
tomentosa L.
præcox Jacq. Austr.
filiformis L.
distans L.

4. Spicis sexu distinctis, famineis pedunculatis.

argentea vill. Delph.
scariosa Encycl.
prostrata All. Ped.
clandestina schk. car.
panicea z.
sylvatica good. s. Lin.
prymeja z. f.
pallescens z.
plantaginea Encycl.
pseudo-cyperus z.
depauperata good. s. Lin.
pendula good. s. Lin.
maxima scop. carn.

5. Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

cæspitosa z. glauca scop. carn.

noirâtre. Alpes. To des sables. F. To grêle. F. To ovale. F. To compacte. F. To hérissé. F. To étoilé. F. To séparé. F. To allongé. F. To brizoïde. F. To paniculé. F. To cylindrique. F. To écarté. F. To desarté. F. T

3. Épis femelles sessiles, séparés des mâles.

digité. F. Z

jaune. F. Z

d'OEder. F. Z

à longues bractées. Anglet. Z

de montagne. F. Z

cotonneux. F. Z

précoce. F. Z

filiforme. F. Z

distant. F. Z

4. Épis femelles séparés des mâles et portés sur des pédoncules.

argenté. F. U.

faux panis. F. T.

des bois. F. T.

pâle. F. T.

à feuill. de plantain. Am. s. T.

faux souchet. F. T.

à fruits rares. F. T.

à épis pendans. F. T.

5. Plusieurs épis mâles séparés des femelles,

gazonnant. F. ¥

stricta good. s. Lin. }
verna Encycl.
riparia good. s. Lin.
paludosa good. s. Lin.
acuta schk. car.
secalina willd. sp.
vesicaria z.
ampullacea good s. Lin.
hirta z.
hordeistychos vill. pelph.

II. Flores hermaphroditi.

SCHOENUS.

1. Culmo tereti.

mariscus z.
mucronatus z.
nigricans z.
fuscus z.
rhincospora fusca n. k.

2. Culmo triquetro.

compressus z.
albus z.
Rhincospora alba vahl. sp.

ERIOPHORUM

polystachyum z.
latifolium schrad. germ.
vaillantii poiteau fl.
gracile roth. catal.
triquetrum schrad. germ.
angustifolium schrad. germ.
vaginatum z.
capitatum nost. Gram.

Scirpus.

1. Spica unica.

articulatus z.
palustris z.
cæspitosus z.
acicularis z.
fluitans z.
ovatus roth. catal.
campestris roth. catal.

2. Culmo tereti polystachyo.

setaceus z.

serré. F. Y

des rivages. F. Y

des marais. F. Y

aigu. F. Z

à épi de seigle. F. Y

vésiculeux. F. Z

renflé. F. Y

velu. F. Z

épi d'orge. F. Z

II. Fleurs hermaphrodites.

SCHOENUS.

1. Chaume cylindrique.

des étangs. f. Z acéré. f. Z noir. f. Y brun. f. Y

2. Chaume triangulaire.

comprimé. F. V

blanc. F. V

LINAIGRETTE

à larges feuilles. F. Z

de Vaillant. F. Z

grêle.

à feuilles étroites. F. Z

engaînée. F. Z

à fleurs en tête. F. Z

SCIRPE.

r. Un seul épi.

articulé. Inde. s. ch. Y des marais, F. Y gazonnant. F. Z aiguille. F. Y flottant. F. Z ovale. F. Z des champs. F. Y

2. Chaume cylindrique à plusieurs épis.

sétiforme. f. ¥ couché. f. ¥ lacustris z.
Holoschænus z.
romanus z.

3. Culmo triquetro polystachyo.

triqueter L.

mucronatus L.

maritimus L.

sylvaticus L.

annuus All. Ped.

biumbellatus Forsk. Fl.

dichotomus L.

Fimbristylis dichotoma vahl.

sp.

CYPERUS.

i. Culmo tereti.
junciformis Desf. Atl.
articulatus z.

2. Culmo triquetro. viscosus swartz. prodr. longus z. tenuislorus Jacq. Ic. rotundus z. esculentus I. vegetus vahl. sp. compressus Jacq. Hort. patulus willd. Enum. strigosus willd. Enum. glomeratus willd. Enum. flavescens z. fuscus L. pannonicus L.f. papyrus L. alternifolius L. - lascini.

KILLINGIA triceps L. f.

ORDO IV.

GRAMINE Æ.

CINNA

arundinacea L.
Agrostis cinna willd. Enum.

ANTHOXANTHUM odoratum L.

des étangs. f. Y à globules. f. Y romain. f. Y

3. Chaume triangulaire à plusieurs épisse triangulaire. F. m. V. piquant. F. m. or. V. maritime. F. V. des bois. F. V.

annuel. Italie. O

SOUCHET.

vert. Z

jonciforme. F. m. 14 articulé. Inde. s. ch. 16

2. Chaume triangulaire.
visqueux. Antilles. Z
odorant. F. Z (écon. méd.)
à petites fleurs. Z
rond. F. Z (méd.)
comestible. Égypte. or. Z

étalé. Hongrie. ¥
desséché. virginie. ¥
aggloméré. Italie. ⊙
jaunátre. F. ¥
brun. F. ¥
de Hongrie. ¥
Papyrus. sicile. or. Æ
à feuill. alternes. Madagascar.
s. ch. Æ

KILLINGIA à trois têtes. Antilles. s. ch. Z

ORDRE IV.
GRAMINÉES.

CINNA

de Canada. ¥

FLOUVE odorante. F. V.

amarum Brotero. Phyt.] glauque. Portugal. T glaucum vahl. sp. CRYPSIS CRYPSIS aculeata H. K. scheenus mucronatus L. Anthoxanthum aculeatum L.f. piquant. F. m. Y Antitragus aculeatus. Gært. Fruct. Heleochloa aculeata Host. Gr. schenoides H. K. Phleum schænoides z. faux scheenus. F. m. T Heleochloa schænoides Host. Gram. CORNUCOPIÆ CORNUCOPIÆ en capuchon. orient. O cucullatum L. ALOPÉCURE ALOPECURUS utriculatus schrad. Germ.) à utricules. F. () Phalaris utriculata z. bulbosus z. bulbeux. F. T des champs. F. Z agrestis z. pratensis L. des prés. F. Z arundinaceus Encycl. arundinacé. F. V ventricosus pers. syn. J géniculé. F. Y geniculatus L. gerardi vill. pelph. de Gérard. Alpes. 14 Phleum Gerardi All. ped. FLÉ $_A$ U PHLEUM des prés. F. Z pratense z. bulbeux. F. Z nodosum L. des Alpes. F. W alpinum L. hérissé. F. Z echinatum Host. Gram. des sables. F. Z arenarium L. Bellardii willd. Enum. Phalaris bulbosa z. de Bellardi, F. Z Phalaris cylindrica pec. Fl. phleum tenue schrad. Germ. LÉERSIA LEERSIA oryzoides willd. sp.] des marais. F. Z phalaris oryzoides L. ALPISTE PHALARIS aspera Retz. obs. rude. F. O rhleum asperum Jacq. 1c. mineure. orient. O minor Retz. obs. canariensis L. des Canaries. O rongée. orient. O paradoxa L.

phleoides L.
phleum Boehemeri schr. Germ.
mucronata.
phleum phalaroides vill.
pelph.
capensis Thunb.
arundinacea L.
picta.

BECKMANNIA

erucæformis nost. cr. phalaris erucæformis z.

PASPALUM

stoloniferum Bosc. s. Lin. par. racemosum Jacq. Ic.
milium latifolium L.
membranaceum Lamk. Ill. ceresia elegans willd. Enum. tenellum willd. Enum.
Kora willd. sp.

CYNODON

panicum pactylon L.

DIGITARIA

sanguinalis willd. Enum. }
panicum sanguinale L.

PANICUM.

1. Flores spicati.

verticillatum L.
viride L.
glaucum L.
geniculatum willd. Enum.
maritimum Encycl.
italicum L.
germanicum willd. sp.

2. Flores spicati, spicis pluribus.

crus-galli L.
— aristatum.
echinatum willd. Enum.
colonum L.

3. Flores paniculati.

sulcatum.

plicatum *Lamk. 1ll.*plicatum *willd. Enum.*

in 11 11

Fléau. F. E

à deux pointes. F. Z

du Cap. or. Z roseau. F. Z — panachée.

BECKMANNIA

chenillette. sibérie. O

PASPALUM

rampant. pérous 72

membraneux. Pérou. s. ch. V délicat. s. ch. V Kora. Inde. s. ch. V

CYNODON

chiendent. f. \u03c4 (méd.)

DIGITAIRE

sanguine. F. T

PANIS.

1. Fleurs en épi.

verticillé. F. ①
vert. F. ②
glauque. F. ③
coudé. Antilles. s. ch. Z
maritime. ③
d'Italie. ③
d'Allemagne. ④

2. Plusieurs épis.

Pied-de-poule. F. ①
— barbu.
hérissé. Am. m. ①
tacheté. Inde. ①

3. Fleurs en panicule.

sillonné. Antilles? s. ch. Z. plissé. Inde. s. ch. Z.

proliferum Encycl.
virgatum L.
coloratum L.
miliaceum L.
— nigrum.
capillare L.
latifolium L.

JUDOLPHIA

glaucescens willd. Enum.

panicum arborescens Lam. Ill.

MILIUM

paradoxum z.

effusum z.

confertum z.

multiflorum schrad. germ.

Agrostis miliacea z.

GASTRIDIUM

lendigerum Beauv. Agr.

milium lendigerum L.

AGROSTIS.

I. Aristata.

spica-venti L.
interrupta L.
retrofracta willd. Enum.
debilis Encycl. suppl.
racemosa Mich. Am.

2. Mutica.

foliosa mertens.
stolonifera L.
alba L.
vulgaris smith. Fl.
capillaris Leers. Herb.
dulcis.
serotina L.
pumila L.
pungens L.
mexicana L.
tenacissima Jacq. 1c.

TRICHODIUM

caninum schrad. Germ.

Agrostis canina L.

laxiflorum mich. Fl.

Agrostis cornucopiæ Lam. Ill.

decumbens mich. Fl.

prolifère. Am. s. 76
effilé. Am. s. 76
coloré. Égypte. ①
Millet. inde. ① (écon.)
— noir.
capillaire. Am. s. ①
à larg. feuill. Am. m. s. ch. p

LUDOLPHIA

glauque. inde. s. ch. 19

 M_{IL}

noir. f. Z étalé. f. Z ramassé. f. Z à fleurs nombreuses. f. Z

GASTRIDIUM

tuberculeux. F. ()

AGROSTIS.

2. Fleurs garnies d'arêtes.

des moissons. F. O interrompu. F. O recourbé. N. Holl. Z à grappes. Am. s. Y

feuillu. Z

2. Fleurs sans arêtes.

traçant. f. ¥
blanc. f. Æ
commun. f. ¥
doux. orient. ①
d'automne. f. m. ¥
nain. f. Æ
piquant. f. m. Æ
du Mexique. ¥
à feuill. dures. inde. s. ch. ¥

TRICHODIUM

des chiens. F. 1

à fleurs láches. caroline. tombant. Am. s. Z CHAMAGROSTIS
minima schrad. Germ.
Agrostis minima L.
knappia agrostidea smith. Fl.

POLYPOGON

monspeliensis *pesf. Atl.*Alopecurus monspeliensis *L.*subspicatus *willd. Enum.*chæturus subspicatus *Beauv. Gram.*

STIPA

capillata willd.sp.
pennata L.
conferta.
Aristella willd.
juncea L.
tenacissima L.
tortilis pesf. Atl.

ARISTIDA

cærulescens pesf. Atl. canariensis willd. Enum.

SACCHARUM

officinarum z.
violaceum.
cylindricum zamk. Ill.
imperata cylindrica Beauv.
Agrost.
Lagurus cylindricus z.

ERIANTHUS

saccharoides mich. Fl.
Ravennæ Beauv. Agr.
Andropogon Ravennæ L.

LAGURUS ovatus L.

Penicillaria
spicata willd. enum. \
Holcus spicatus L.

SORGHUM

vulgare willd. Enum.
cernuum willd. Enum.
saccharatum willd. Enum.
cafrorum willd. Enum.
halepense L.
Holcus halepensis L.

CHAMAGROSTIS

filiforme. F. O

POLYPOGON

de Montpellier. O

de Portugal. O

STIPA

chevelu. F. V
plumeux, F. V
à fleurs serrées. V
à petites barbes. F. V
jonciforme. F. V
spart. Esp. or. V
tordu. Barbarie. V

ARISTIDA

bleuatre. Barbarie. O

SUCRE

officinal. inde. z (écon.)

— violet.

cylindrique. F. m. or Z

ERIANTHUS

faux sucre. caroline. or. 7

de Ravenne. F. m. or. 7

LAGURUS

ovale. F. m. O

PÉNICILLAIRE

en épi. inde. (écon.)

Sorgho

commun. inde. ① (écon.)
penché. ② (écon.)
sucré. inde. ② (écon.)
des Cafres. Afr. ② (écon.)
d' Alep. ①

Holcus

lanatus L. mollis L.

ANDROPOGON

Allionii Decand. Fl.
contortum Allion. (non zin.) }
provinciale Encycl.
Ischæmum L.
annulatum vahl. symb.
Nardus Pers. syn. }
citriodorum. }
strictum Host. Gr.
hirtum L.
distachyon L.
Gryllus L.
schænanthus L.

macrouros mich. Fl.

CHLORIS

petræa swartz. Prodr.
ciliata swartz. Prodr.
scoparia.
cynosurus scoparius Encycl.
radiata swartz Prodr.
Agrostis radiata L.
Andropogon fasciculatum L.
ex swartz.

CHONDROSUM willd. Mss.

chloris filiformis Encycl. sup. chloris gracilis Durand. Diss.

TRIPSACUM

dactyloides L.
hermaphroditum L.
Antephora elegans schreb.Gr.

TRAGUS

racemosus *Desf. Atl.*cenchrus racemosus *L.*Lappago racemosa *Willd. sp.*

CENCHRUS

echinatus z.
ciliaris z.
rennisetum cenchroides pers.

Holcus

laineux. f. L velouté. f. L

ANDROPOGON

d'Allioni. F. K

de Provence. F. m. K

digité. F. K

annulaire. Égypte. or. K

odorant. île de F. s. ch. K

serré. Hongrie. K

hérissé. F. m. or. K.

à deux épis. F. m. or. K

jonc odorant. inde. s. ch. K

à grande panicule. caroline.

or. K

CHLORIS

des rochers. Antilles. s. ch. & ciliée. Antilles. s. ch. & à balais. inde. ①

rayonnante. Inde. O

CHONDROSUM

filiforme. mexique.

TRIPSACUM

monoïque. Am. s. ¥

hermaphrodite. Antilles. O

TRAGUS

à grappes. F. O

CENCHRUS

hérissé. Antilles. O

cilié. cap. O

	i(6)
ECHINARIA	ECHINARIA
capitata pesf. Atl.	LICHIN ARIA
cenchrus capitatus L.	à fl an tôta
sesleria echinata schrad. Ger.	à fl. en tête. F. m. O
ÆGILOPS	15
ovata L.	AEGILOPS
triuncialis L.	ovale. F. O
squarrosa L.	à longs épis. F. O
ROTTBOELLIA	rude. Barbarie. ⊙
incurvata L.	ROTTBOELLIA
pannonica Host. Gr.	arqué. F. 🔾
biflora pers. syn.	de Hongrie. 🔾
monandra schrad. germ:	0
Nardus aristata L.	à une étamine. F. Z
AIRA	
cæspitosa z.	AIRA
flexuosa L.	touffu. F. Z
juncea vill. pelph.	tortueux. F. Y
Deschampsia juncea Beauv.	jonciforme. Alpes. Z
Agrost.	Jonetjorme. Alpes. 12
caryophyllea ż.	étalé. F. 🔾
præcox L.	printanier, F. O
minuta z.	filiforme. Esp. O.
canescens z.	3.03 c. 135 c.
corynophorus canescens	blanchåtre. F. O
Beauv. Agrost.	
pubescens vahl. symb.	pubescent. F. m. O
CATABROSA	CATABROSA
aquatica Beauv. Agrost.	
Aira aquatica L .	aquatique. F. Z
MELICA	MÉLICA
ciliata L.	cilié. F. U
pyramidalis <i>Lamk</i> . 1ll.	pyramidal. г. т. or. ц
Bauhini willd. Enum.	de Bauhin. F. Z
unislora Retz. obs.	
Lobelii vill. pelph.	à une fleur. F.
nutans L,	÷ A 7 /
montana Dec. Fl.	à fleurs penchées. F. Z
altissima z.	élevé. sibérie. Z
Molinia	MOLINIA
cœrulea Beauv. Agrost.	bleuatre. F. Z
melica cœrulea z.	oteautie. F. E
SPARTINA	SPARTINA
cynosuroides Beauv. Agrost.	9 44 9
Trachynotia cynosuroides	farm comme
Mich. Fl.	faux cynosurus. Am. s. L
pactylis cynosuroides z.	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- \
	7)
DACTYLIS .	$D_{ACTYLIS}$
glomerata z.	aggloméré. F. V
SESLERIA	SESLÉRIA ,
cœrulea Arduin. spec.	bleudtre. F. 4
cynosurus cœruleus L. } elongata Host. Gr.	
	à longs épis. Allem. z
DINEBA	D_{INEBA}
ægyptiaca pelile Fl.	v E
pactylis paspaloides willd.	d'Egypte. O
curtipendula Beauv. Agrost.	
chloris curtipendula mich.	à fleurs pendantes. Am. s. 4.
Fl.	wysears pentanties. Am. s. ц.
Cynosurus	CRETELLE
cristatus z.	des prés. f. 1
echinatus z.	hérissée. F. 🕥
durus z.	roide. F. O
Lamarckia	LAMARCKIA
aurea pec. fl.	ZIMI MICKIA
Cynosurus aureus L.	·
chrysurus cynosuroides pers.	jaune. F. m. 🔾
syn.	
ELEUSINE	ELEUSINE
ægyptia.	d'Egypte. 🕤
cynosurus ægyptius z. \ \(\) indica zamk. 1ll.	<i>a L_S) pic</i> . O
cynosurus indicus L.	des Indes. O
coracana Lamk. Ill.	9
cynosurus coracanus L.	coracan. Barbarie. O
Lolium	LOLIUM
temulentum L.	Ivraie. F. 🔾
perenne L.	Raygrass. F. Y
— tenue.	— grêle.
Elymus	E_{LYME}
arenarius z.	des sables. F. Z
giganteus vahl. symb.	
racemosus Lamk. Ill.	gigantesque. \p
virginicus z. sibiricus schr. gram.	de Virginie. Z
tener $L. f.$?	de Sibérie. T
canadensis z.	de Canada. T
7 * 0 7 * • • 77 5	и полития

glaucifolius willd. Enum.

ramosus.

europæus L.

hordeiformis.

d'Europe. F. W.

épi d'orge. 4

rameux. Z

glauque. Am. s. Z

ASPR	ELLA	ASPRELLA
1	nystrix willd. Enum.	7 ° ° ° °
1	elymus hystrix L.	divergent. orient. E
Hord	EUM	O_{RGE}
	vulgare L.	commune. Russie. (écon.)
	- cœleste.	-nue.
	nexastichon z.	hexagône. O (écon.)
	eocriton L.	éventail. (écon.)
Ċ	listichon z.	à deux rangs. Russie. (écon.)
a.	- nudum.	-nue.
r	naritimum L	maritime. F 🔾
s	ecalinum L.	des prés. F. O
ı	nurinum L.	des murailles. F. 🔾
j	ubatum z.	chevelue. syrie. O
TRITI	CIIM '	FROMENT
	rulgare willd. Enum.	
	- hybernum.	cultivé. ⊙ (écon.) — d'hiver.
	compositum L. f.	rameux. () (écon.)
	lurum Desf. Atl.	corné. (écon.)
	pelta L.	Épeautre. (écon.)
	tea Host. Gr.	zea. (écon.)
	nonococcum L.	monosperme. O (écon.)
	polonicum L.	de Pologne. O (écon.)
-	cristatum pers. syn.	à crêtes. U
	unceum L.	jonciforme. F. W
í	rigidum schrad. Germ.	
	elongatum Host. Gram.	rude. Autriche. Z
3	cepens z.	chiendent. F. 72
	— aristatum.	barbu.
	caninum L.	des chiens. F. W
_	glaucum.	glauque. Z
	prostratum L. f.	couché. sibérie. 🕥
•	patulum willd. Enum.	étalé Égypto
	secale pungens pers. syn. §	étalé. Égypte. 🔾
-	poa Dec. Fl.	poa. f. O
	nardus pec. fl.	filiforme. F. O
1	unilaterale z.	unilatéral. F. O
SECA	LE	Seigle
(cereale z.	cultivé. 🔾 (écon.)
•	villosum z.	cilié. orient. O
Brom	TT C	
	mollis z.	BROME .
	parviflorus.	velu. F. O
	lanceolatus <i>Roth. cat.</i>	à petites fleurs. ① lancéolé. orient. ①
	grossus.	
	secalinus z. (ex swartz.)	à gros épis. F. 🔾
	Tomata Di (con strains.))	

squarrosus L. rude. F. O dumetorum Lamk. Ill. des buissons. F. T asper L. f. arvensis L. des champs. r. O sterilis L. stérile. F. O maximus Desf. Atl. à grands épis. F. 🔾 madritensis L. de Madrid. O gynandrus Roth. cat. tectorum L. des toits. F. O pendulinus. commutatus schrad. Germ.? pendant. O giganteus L. gigantesque. F. ¥ pratensis Lamk. 111. perennis vill. Delph. des prés. F. 1 erectus schrad. Germ. purgans L. purgatif. canada. v purpurascens belile. Fl. pourpre, f. m. O rubens L. rougedtre. F. 🔾 inermis willd. sp. sans arêtes. F. Alpes. T. FESTUCA FESTUCA pinnata. Bromus pinnalus L. penné. F. V. Triticum pinnatum Dec. Fl. sylvatica. Bromus sylvaticus Lamk. Ill. des bois. F. W Festuca gracilis schrad. Germ. Triticum sylvaticum Dec. Fl.) scabra zea. rude. 💿 distachyos. à deux épis. F. m. 🔾 Bromus distachyos L. stipoides Desf. Atl. stipoide. F. m. 🔾 Bromus stipoides L. bromoides L. bromoide. F. V. ovina L. des moutons. F. F. capillata Lamk. Ill. capillaire. F. V tenella willd. sp. à feuilles menues. Am. s. 4 heterophylla *Lamk*. *Ill*. à feuilles variables. F. ¥ rubra L. rouge. F. T. duriuscula L. à feuilles dures. F. Z glauca Lamk. Ill. glauque. f. V dumetorum L. des buissons. F. T. pratensis schrad. Germ. Ioliacea pec. Fl. des prés. F. 4 elatior Lamk. Ill. varia Host. Gram. panaché. F. 76 elatior schrad. cerm. arundinacea vill. pelph. élevé. F. V Ioliacea Lamk. 111.

myuros L.
uniglumis willd. sp.
spadicea. willd. sp.
diandra mich. fl.
unioloides willd. H. Ber.
alopecuros willd. Enum.
fascicularis Lamk. Ill.
polystachya Mich. fl.
virgata Lamk. Ill.
calycina L.
divarica a Desf. Atl.
phleoides vill. Delph.

Danthonia
decumbens Dec. Fl.
Festuca decumbens L.
Triodia decumbens Beauv.
Agrost.

Pos

fluitans schrad. Germ. restuca fluitans L. aquatica L. alpina L. molinerii Balbis miscell. badensis willd. sp. bulbosa z. seslerioides mich. Fl. cenisi Allion. Auct. cæsia smith. Fl. trivialis L. angustifolia L. debilis Encycl. pratensis L. trinervata Dec. Fl. sylvatica Pollich. Palat. pilosa L. annua L. compressa L. nemoralis L. rariflora. ægyptiaca willd. Enum. rigida L. procumbens smith. Fl. maritima willd. sp. cristata willd. sp. peruviana Jacq. Ic. glomerata. elongata willd. Enum.

myuros. F. &
à une seule valve. F. ©
jaune. Alpes. W
à deux étamines. Am. S. W
unioloïde. caroline. ©
plumeux. Maroc. ©

fasciculé. Am. s. W
effilé. Antilles. ©
à grand calice. Esp. ©
étalé. Barbarie. ©
fléau. Alpes. W

DANTHONIA

incliné. F. K

POA

flottant. F. 4 (écon.) aquatique. F. Z des Alpes. F. Z de Molineri. Alpes. Z bulbifère. F. Z seslérioide. Am. s. Z du mont Cénis. V bleuatre. Écosse. Z commun. F. L à feuilles étroites. F. 75 foible. F. Z des prés. F. Z à trois nervures. velu. F. T. annuel. F. () comprimé. F. 74 des bois. F. L à fleurs rares. F. W. d'Egypte. O roide. F. T tombant. Angleterre. O

aggloméré. mde. s. ch. 14

maritime. F. Z à crêtes. F. Z

du Pérou. O

retroflexa curtis. Lond. distans. }

striata Lamk. Ill. \
nervata willd. sp. \
glauca willd. Enum.
abyssinica L.
capillaris L.
tenella L.
ciliaris L.
sicula Jacq. obs.
megastachya Kœler. Gram. \
Briza Eragrostis L.

BRIZA

minor L.
media L.
maxima L.

Uniola latifolia mich. fl.

AVENA

elatior L. - nodosa. striata Lamk. Ill. sativa L. - nuda. orientalis willd. sp. brevis willd. sp. fatua L. sterilis L. pubescens L. pratensis L. bromoides L. distichophylla vill. pelph. flavescens L. panicea Lamk. Ill. fragilis L.

ARUNDO.

1. Calix multiflorus.

ponax L.

— variegata.

phragmitis L.

2. Calix uniflorus.

epigeios L.
calamagrostis epigeios Roth.
Germ.

recourbé. F. Z.

strié. Am. s. Y
glauque. Y
d'Abyssinie. ①
capillaire. Am. s. ①
délicat. Inde. ②
cilié. Antilles. ①
de Sicile. ②

BRIZA

triangulaire. F. ①
des prés. F. ¥
à grandes fleurs. F. ②

UNIOLE
à larges feuilles. Am. 5. 14

AVOINE

Fromental. F. 75 - bulbeuse. striée. F. Alpes. Z cultivée. (écon.) - sans barbes. d'Orient. () courte. Brême. 🔾 Avron. F. 🔾 stérile. F. 🔾 pubescente. F. Z des prés. F. Z bromoide. F. Z distique. F. Alpes. V jaunâtre. F. V panis. F. O fragile. F. O

ROSEAU.

1. Calice à plusieurs fleurs.

à quenouille. F. m. ¥ (écon.)
— panaché.
à balais. F. ¥

2. Calice à une fleur.

épigeios. F. Z

raint. 1.

in , one was, and a, a my congi

calamagrostis L.
calamagrostis lanceolata Roth.
Germ.
arenaria L.
calamagrostis arenaria Roth.
Germ

ORYZA

sativa z.

EHRHARTA
panicea willd. sp.

NARDUS stricta L.

LYGEUM . spartum z.

Zea

— maïs L.

Coix
- Lacryma L.

plumeux. F. 76

des sables. F. Z

 R_{IZ}

cultivé. mde. O (écon.)

EHRHARTA
à fleurs de panis. cap. or. 😮

NARD serré. f. Z

LYGEUM
sparte. F. m. or. ¥ (écon.)

ZEA maïs. pérou. ① (écon.)

Coix Larme de Job. inde. ()

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perigyna).

ORDO I.

PALMÆ.

I. Fronde pinnata.

PHOENIX

dactylifera Z.

CARYOTA

urens L.

II. Fronde palmata.

CHAMEROPS

humilis L. hystrix (an generis?).

SABAL

Adansonii *Guers. s. Philom.* chamærops acaulis *mich. fl.* corypha minor *Jacq. nort.*

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice).

ORDRE I.

PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

DATTIER

cultivé. Afr. s. ch. y (écon.)

CARYOTA

brülant. inde. s. ch. p

II. Feuilles palmées.

CHAMÆROPS

commun. Barb. or. 5 (écon.)
hystrix. s. ch. 5

SABAL

d'Adanson. Am. s. or. b

LATANIA

chinensis Jacq. Frag. borbonica willd. sp.

RHAPIS

flabelliformis willd. sp.

ORDO II.

ASPARAGINEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

DRACENA

terminalis Jacq. 1c. marginata Encyl.

reflexa *Encycl*.)
cernua *Jacq. H. sch.*)
umbraculifera *Jacq. H. sch.*

DIANELLA

nemorosa Encycl.
pracæna ensifolia willd. sp. cærulea Bot. Mag.

Asparagus

tenuifolius Encycl.

officinalis L.

— maritimus.

decumbens Jacq. H. sch. }

crispus Encycl.

mauritianus.

retrofractus L.

asiaticus L.

pectinatus Red. Lil.

albus L.

acutifolius L.

aphyllus L.

— horridus.

capensis L.

sarmentosus L.

MEDEOLA asparagoides z.

Trillium sessile z.

Paris quadrifolia z.

LATANIER

de Chine. s. ch. 5

RHAPIS

éventail. chine. s. ch. 5

ORDRE II.

ASPARAGINÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

DRACÆNA

sang-drag. can. s. ch. b (méd.)
pourpre. chine. s. ch. b
à bords rouges. madagascar.
s. ch. b

recourbé. île de France. s. ch. 5 en parasol. mde. s. ch. 5

DIANELLE

des bois. inde. s. ch. Z bleue. n. Holl. s. ch. Z

ASPERGE

à feuilles menues. F. L. officinale. F. (écon.)
— maritime.

de l'île de France. s. ch. 5
coudée. cap. s. ch. 5

d'Asie. s. ch. 5
pectinée. or. 5
blanche. orient. or. 5
à feuilles aiguës. F. m. or. 5
sans feuilles. orient. or. 5

du Cap. s. ch. 5 sarmenteuse. ceylan. s. ch. 5

MEDEOLA

sarmenteux. cap. s. ch. y

Trillium sessile. Am. s. 72

- hérissée.

PARISETTE à quatre seuilles. F. V Convallaria
maialis z.
japonica Thunb. Jap.
ophiopogon japonicus Bot.
mag.

Polygonatum
vulgare Desf. Ann.
convallaria polygonatum L.
multiflorum Desf. Ann.
convallaria multiflora L.
verticillatum Desf. Ann.
convallaria verticillata L.

racemosa pesf. Ann. convallaria racemosa L. stellata pesf. Ann.

convallaria stellata L. S

MAIANTHEMUM bifolium Desf. Ann. convallaria bifolia z.

II. Flores unisexuales.

Ruscus

aculeatus z.
hypophyllum z.
hypoglossum z.
androgynus z.
racemosus z.

SMILAX.

1. Caule aculeato, fruticoso.

aspera L.
oblongata swartz. prodr.
mauritanica pesf. Atl.
excelsa? L.
horrida.
laurifolia L.
rotundifolia mich. Fl.
glauca mich. Fl.
pubera mich. Fl.

2. Caule herbaçeo.

herbacea L.

RAJANIA cordata z.

Muguet de mai. f. 华 (orn.) du Japon. or. 华

Sceau-de-Salomon
commun. f. ¥
à plusieurs fieurs. f. ¥
verticillé. f. ¥

à grappes. Am. s. Léétoilé. Am. s. L

MAIANTHEMUM
à deux feuilles. F. W.

II. Fleurs unisexuelles.

FRAGON
épineux. F. 5 (méd.)
sans foliole. Italie. or. 5
à foliole. Italie. or. 5
androgyne. canaries. or. 5
à grappes. Italie. 5

SMILAX.

1. Tige épineuse, ligneuse.

rude. F. m. or. h (méd.)
à feuill. oblong. Antill.s.ch. h
de Mauritanie. Alger. or. h
élevé. orient. or. h
hérissé. Am. s. or. h
à feuilles de Laurier. Am. s. h
à feuilles rondes. Am. s. h
glauque. Am. s. h
velu. Am. s. h

2. Tige herbacée.

herbacé. Am. s. 74

RAJANIA

à feuill, en cœur. Ant. s. ch. 19

III. Flores unisexuales, ovarium semi- III. Fleurs unisexuelles, ovaire moitié inferum.

DIOSCOREA 3 villosa L. alata L.

TAMNUS

communis L.

ORDO III.

JUNCEÆ.

APHYLLANTHES monspeliensis L.

LOMANDRA longifolia Bill. N. Holl.

1. Culmo nudo.

acutus L. maritimus Encycl. conglomeratus L. effusus L. glaucus willd. sp. australis. trifidus z. squarrosus L.

2. Culmo folioso.

articulatus z. sylvaticus willd. sp. bulbosus L. renageia L. f. busonius z.

LUZULA

JUNCUS.

nivea Dec. Fl. Juncus niveus L. campestris Dec. Fl. juncus campestris z. pilosa. vernalis pec. Fl. Juncus pilosus L. maxima pec. Fl. juncus maximus willd. sp. compacta. pediformis Dec. Fl. juncus pediform. vill. pelph. infère.

IGNAME velue. Am. s. Z ailée. inde. s. ch. ¥ (alim.) TAMNE commun. f. \u03c4 (med.)

ORDRE III.

JONCÉES.

APHYLLANTHES de Montpellier. F. m. or, Z (écon.)

LOMANDRA à fcuilles long. N. Holl, or. W Jonc.

1. Chaume nu.

aigu. f. V maritime. F. 华 aggloméré. F. Z étalé. F. Z glauque. F. V de la N. Hollande. or. ¥ trifide. Alpes. T rude. F. ¥ 2. Chaume garni de feuilles.

articulé. F. Z des bois. F. W bulbeux. F. 72 à fleurs sessiles. F. V. dichotôme. F. V

LUZULA

à fleurs blanches. F. V. des champs. F. Z

velu. F. Z

à larges feuilles. F. W à sleurs en tête. F. Z en grappe. Alpes. Z

ORDO IV.

COMMELINEÆ.

COMMELINA.

1. Petala inaqualia.

communis L.
africana L.
erecta L.
pallida willd. H. Ber.
rubens Red. Lil.
benghalensis L.
caroliniana willd. Enum.

virginica L.
dianthifolia Red. Lil.
tuberosa L.
cristata L.
Tradescantia cristata willd. sp.
zanonia L.
Tradescantia zanonia willd.sp.

TRADESCANTIA
virginica L.
erecta Jacq. 1c.
rosea mich. Fl.
discolor smith 1c.

ORDO V.

ALISMACE Æ.

Butomus umbellatus L.

Alisma

plantago L.

ranunculoides L.

natans L.

namasonium L.

SAGITTARIA sagittifolia L.

Scheuchzeria palustris z.

TRIGLOCHIN

palustre L.

maritimum L.

ORDRE IV.

COMMÉLINÉES.

COMMÉLINE.

1. Pétales inégaux.

commune. Am. ⊙
d'Afrique. cap. s. ch. ¥
droite. virginie. ¥
à fleurs pâles. s. ch. ¥
du Bengale. s. ch. ¥
de Caroline. or. ℤ

2. Pétales égaux ou presque égaux.

de Virginie. Z

à feuilles d'oxillet. s. ch. Z

tubéreuse. mexique. s. ch. Z

à crête. ceylan.

à fruit mou. antilles. s. ch. 19

Ephémère
de Virginie. ъ (orn.)
à tige droite, mexique. ⊙
rose. Am. s. ъ
de deux coul. Ам. m. s. ch. ъ

ORDRE V.

ALISMACÉES.

Butome ombellifere. f. v (orn.)

Alisma

plantain-d'eau. f. v

renoncule. f. v

flottant. f. v

étoilé. f. v

Fléchière aquatique. F. W

SCHEUCHZERIA

des marais. F. 75

Triglochin

des marais. r. 75

maritime. r. V

ORDO VI.

COLCHICACE Æ.

NARTHECIUM
caliculatum Lamk. Ill.
Anthericum caliculatum L.
Toffieldia palustris Dec. Fl. (
Helonias borealis Willd. sp.)

Helonias bullata L.

Veratrum album z. nigrum z.

Colchicum
autumnale L.
variegatum L.
montanum L.

Merendera Bulbocodium *ram. Bul. Phil.*

ORDO VII.

LILIACE Æ.

Tulita
sylvestris L.
suaveolens roth. cat.
oculus-solis red. Lil.
gesneriana L.

Erythronium dens-canis L.

Methonica superba. Gloriosa superba z. }

Uvularia amplexifolia z. perfoliata z.

Fritillaria imperialis 2.

> persica L. meleagris L. latifolia *red. zil*.

ORDRE VI.

COLCHICACÉES.

NARTEC

caliculé. F. 75

HELONIAS

à fleurs roses. Am. s. V.

VERATRUM
blanc. f. (vénén.)
noir. sibérie. Z

Colchique d'automne. F. 足 panaché. orient. 足 (orn.) de montagne. Alpes. 华

MERENDERA
Bulbocodium. pyrénées. ¥

ORDRE VII.

LILIACÉES.

TULIPE
sauvage. F. W
odorante. Asie. W (orn.)
œil-de-soleil. F. m. W (orn.)
des jardins. orient. W (orn.)

ERYTHRONIUM

Dent-de-chien. Alpes. ¥

METHONICA
superbe de Malabar. inde.
s. ch. (orn.)

UVULAIRE

des Alpes. F. Z

perfoliée. Am. s. Z

FRITILLAIRE

couronne-impériale. Asie. 花

(orn.)

de Perse. 足

panachée. F. 足 (orn.)

à larges feuilles. 炁

Lilium	Tra
candidum z.	Lis
bulbiferum L.	blanc. Asie. Z (orn.)
croceum.	bulbisere. suisse. Z (orn.)
tigrinum Bot. Mag.	orangė. V (orn.)
pomponium L.	tigré. chine. or. Z (orn.)
pyrenaicum gouan. 1ll.	pomponien. F. m. T (orn.)
Mariagon L.	des Pyrénées. It (orn.)
chalcedonicum z.	Martagon. F. (orn.)
pumilum Red. Lil.	Hémérocale. Asie. & (orn.)
philadelphicum z.	nain. It (orn.)
superbum L.	de Philadelphie. v (orn.)
canadense red. Lil.	superbe. Am. s. Z (orn.)
penduliflorum Red. Lil.	de Canada. ¥ (orn.)
Yucca	
	Y_{UCCA}
gloriosa L.	à feuilles entières. Am. s. h
aloifolia L.	afeuill. d'Aloès. caroline. or. h
draconis L.	a larges feuill. Am. m. s. ch. b
filamentosa z.	filamenteux. caroline. or. b
Boscii (an yucca?)	de Bosc. s. ch. 5
SANSEVIERA	$S_{ANSEVI\acute{E}RA}$
zeylanica willd. sp.	de Ceylan. s. ch. v
guineensis willd. sp.	de Guinée. s. ch. Z
carnea willd. Enum.	couleur de chair. chine. or. Z
ALETRIS	ALETRIS
fragrans	
Dracæna fragrans Bot. Mag.	odorant. cap. s. ch. p
VELTHEIMIA	$V_{ELTHEIMIA}$
capensis.	, all miller
viridiflora willd. sp.	du Cap. or. ¥
Aletris capensis L.	ст επρ. σι. μ
glauca Jacq. H. sch.	glauque. cap. s. ch. *
TRITOMA	Tritoma
uvaria red. zil.	I RII OMA
Aletris uvaria L.	d arama an an an
veltheimia uvaria willd. sp.	à grappe. cap. or. ф
sarmentosa.	
media Red. Lil.	COMMONIOTION CON ON THE
Aletris sarmentosa Andr. Rep.	sarmenteux. cap. or. r
PITCAIRNIA	D
bromeliæfolia l'Her. sert.	PITCAIRNIA
L'originatoria e Her. Sert.	à feuilles d'Ananas. Antilles.
angustifolia H. K.	s. ch. 1
latifolia H. K.	à feuill. étroit. Antill. s. ch. 4
ALOE	à larg. feuill. mde. s. ch. ¥
	Aloès
purpurea encycl.	à bords rouges. île de Bourbon.
pracæna marginata willd. sp.	s.ch. b.

vulgaris Dec. pl. gr. abyssinica Encycl. paniculata Jacq. Frag. rubescens Dec. pl gr. soccotrina Dec. pl. gr. fruticosa Encycl. arborescens pec. pl. gr. ferox H. K. mitræformis Encycl. - angustior. rhodacantha nec. pl. gr. perfoliata. serra Dec. pl. gr. brevifolia Dec. pl. gr. humilis z. echinata willd. Enum. umbellata Dec. pl. gr. maculata. picta nec. pl. gr. tenuifolia Encycl. variegata L. nigricans. disticha L. - triangularis. — latifolia. carinata Dec. pl. gr. obliqua Dec. pl. gr. plicatilis z. spiralis z. Viscosa L. retusa z. rigida pec. pl. gr. pentagona H. K. margaritifera L. radula Jacq. H. sch. cymbæfolia willd. Enum. arachnoidea z. atrovirens nec. pl. gr.

Anthericum frutescens z. alooides z. annuum z.

ECHEANDIA
terniflora Red. Lil.
Anthericum reflexum cav. Ic.

PHALANGIUM (Anthericum L.) revolutum z.

d'Abyssinie. s. ch. h paniculé. cap. s. ch. 5 rougeatre. inde.s. ch. 5 soccotrin. cap. s. ch. b corne-de-belier. cap. s. ch. 5 hérissé. cap. s. ch. 5 mitré. cap. s. ch. 19 - à feuilles étroites. à épines rouges. cap. s. ch. 5 perfolié. cap. s. ch. 5 à feuilles courtes, cap. s. ch. 5 nain. cap. s. ch. 4 hérissé. ombellisere. cap. s. ch. 5 moucheté. cap. s. ch. 19 à feuill. minces. cap. s. ch. 5 perroquet. cap. s. ch. 5 vert-noir. cap. s. ch. 72 bec-de-canne. cap. s. ch. T — triangulaire. cap. s. ch. 军 — à larg. feuill. cap. s. ch. ¥ tuberculeux. cap. s. ch. 74 oblique. cap. s. ch. 72 éventail. cap. s. ch. 5 en spirale. cap. s. ch. 5 visqueux. cap. s. ch. b écrasé. cap. s. ch. 74 à feuilles roides. cap. s. ch. T pentagône. cap. s. ch. 72 perlé. cap. s. ch. Z radula. cap. s. ch. Z en nacelle, cap. s. ch. Z patte d'araignée. cap. s. ch. ¥ vert-livide. cap. s. ch. 72

commun. Barbarie. s. ch. 5

Anthéric arbrisseau. cap. or. 5 à feuill. d'Aloès. cap. or. ¥ annuel. cap. ⊙

ECHEANDIA

à fleurs ternées. cuba. s. ch. 4

PHALANGIUM recourbé. cap. or. ψ

ramosum L.
Liliago L.
Liliastrum L.

bicolor pesf. Atl.
milleflorum Red. Lil.
Arthropodium paniculatum
Brown. prodr.
pendulum Red. Lil.

ASPHODELUS

- luteus z.
capillaris red. zil.
tauricus mars. cauc.
ramosus z.
spicatus.
fistulosus z.

Eucomis

undulata H.K.
regia Red. Lil.
punctata l'Her. sert.

MASSONIA

pustulata Red. Lil.
latifolia Jacq. H. sch.
violacea Red. Lil.
Polyanthes pygmea Jacq. 1c.
Agapanthus ensifol. willd. sp.
Mauhlia ensifolia Thunb. Pr.

DRIMMIA

elata Jacq. 1c.

HYACINTHUS

non-scriptus z.

patulus.
amethystinus encycl. }
amethystinus z.
hispanicus encycl. }
romanus z.
serotinus z.
orientalis z.
viridis z.
Lachenalia viridis H. K.
zuccagnia viridis willd. En.

MUSCARI

moschatum willd. Enum. comosum willd. Enum. — monstrosum.

rameux. F. W à grappes. F. W Lis de St. Bruno. Alpes. W (orn.) bicolor. F. W

mille-fleurs. N. Holl. or. 72

à fl. pendantes. N. Holl. or. Z

ASPHODÈLE

jaune. F. m. Y
capillaire. or. Y
de la Tauride. Z
rameux. F. Z
à grappe. F. m. Y
fistuleux. F. m. Z

Eucomis

ondulé. cap. or. Z couronné. cap. s. ch. Z tacheté. cap. s. ch. Z

MASSONIA

pustuleux. cap. s. ch. z à feuill. larg. cap. s. ch. z

à fleurs violettes. cap. s. ch. Z

DRIMMIA

élevé. cap. or. 12

 J_{ACINTE}

des bois. F. Z

étalée. V

améthyste. pyrénées. Z

de Rome. f. u rouillée. Espagne. u d'Orient. u (orn.)

verte. cap. or. 4

MUSCARI

odorant. orient. & (orn.)
chevelu. F. &
— monstrueux. (orn.)

racemosum willd. Enum. botryoides willd. Enum.

Phormium tenax Forster, Gen.

LACHENALIA

pendula Jacq. 1c.
lanceæfolia Jacq. 1c.
pallida willd. sp.
tricolor Jacq. 1c.
luteola Jacq. 1c.
angustifolia Jacq. 1c.
orchioides Jacq. 1c.

Cyanella capensis z.

ALBUCA

alba Encycl.
cornuta Red. Lil.
major L.
minor L.
abyssinica Jacq. 1c.
Asphodelus abyssinicus Enc.

SCILLA

maritima L.

peruviana L.

italica L.

amœna L.

Liliohyacinthus L.

pomeridiana Dec. cat.

hyacinthoides L.

bifolia L.

undulata Desf. Atl.

autumnalis L.

Eriospermum lanceæfolium *jacq. ic.*

ORNITHOGALUM
luteum z.
tenuifolium red. zil.
pyrenaicum z.
pyramidale willd. sp.
narbonense z.
trigynum red. zil.
lacteum jacq. ic.
umbellatum z.
nutans z.

à grappe. r. t botryoïde. r. v

PHORMIUM

Lin de la N. Zélande. or. \$\circ\$

(écon.)

LACHENALIA

à fleurs pendantes. or. Z

lancéolé. cap. or. Z

à fleurs pâles. cap. or. Z

tricolore. cap. or. Z

jaune. cap. or. Z

à feuilles étroites. cap. or. Z

moucheté. cap. or. Z

CYANELLA
du Cap. or. 74

ALBUCA

blanc. cap. or. Z

jaune. cap. or. Z

petit. cap. or. Z

d'Abyssinie. s. ch. Z

SCILLE

maritime. F. m. or. Z (méd.)
du Pérou. ryrénées. Z (orn.)
d'Italie. Z
agréable. orient. Z
Lis-jacinte. F. Z
poméridienne. F. Z
jacinte. Madère. or. Z
à deux feuilles. F. Z
ondée. Tunis. or. Z
d'automne. F. Z

ERIOSPERME lancéolé. cap. or. 12

ORNITHOGALE

jaune. F. W.
à feuilles menues. or. W.
des Pyrénées. F. W.
pyramidal. F. m. W.
de Narbonne. F. W.
à trois styles W.
blanc de lait. cap. or. W.
a fleurs penchées. F. W.

longibracteatum Jacq. Hort. arabicum Z. thyrsoides H. K.

ALLIUM.

1. Folia teretia aut sub-teretia.

cepa z. scheenoprasum z. ascalonicum I. glaucum. foliosum pec. syn. globosum Red. Lil. moschatum z. obtusiflorum red. Lil. bisulcum red. Lil. flavum z. vineale L. sphærocephalum z. pallens z. paniculatum z. lusitanicum red. Lil. longispathum red. Lil. oleraceum L.

2. Folia plana.

carinatum L. angulosum L. baiacalense willd. Enum. roseum L. — bulbiferum. striatum Jacq. Ic. denudatum Red. Lil. cernuum Roth. cat. tartaricum L.f. carolinianum red. Lil. album Red. Lil. ciliare red. Lil. brachystemon red. Lil. subhirsutum L. nutans L. sativum L. scorodoprasum L. arenarium L. obliquum L. Ampeloprasum L. porrum L. monspesullanum gouan Ill. victorialis L.

à longues bractées. cap. or. Z d'Arabie. Alger. or. Z (orn.) en thyrse. cap. or. Z (orn.)

AIL.

1. Feuilles cylindriques ou presque cylindriques.

oignon. & (écon.méd.) civette. sibérie. ¥ (écon.) Échalotte. Palest. Æ (écon.)

glauque. F. M. Z
globuleux. caucase. T
musqué. F. T
à fleurs obtuses. corse. or. Z
à deux sillons. T
jaune. F. T
des vignes. F. T
à tête ronde. F. Z
à fleurs pâles. F. T
paniculé. suisse. T
de Portugal. T
à long spathe. F. T
verdâtre. F. T

2. Feuilles plates.

en carêne. f. V. anguleux. F. L du lac Baïcal. V rose F. W — bulbifère. strié. cap. or. 4 dénudé. ¥ incliné. T de Tariarie. ¥ de Caroline. T blanc. F. m. ¥ cilié. Z à courtes étamines. T velu. orient. 4 penché. sibérie. ¥ cultivé. sicile. ¥ (écon. méd.) Rocambolle. F. 华 (écon.) des sables. F. ¥ oblique. sibérie. ¥ Ampéloprasum. orient. Z poireau. suisse. Z (écon.) de Montpellier. Z à feuilles de Plantain. F. 4

ursinum z.
scorzoneræfolium red. zil.
moly z
fragrans vent. H. cels.

Polianthes tuberosa L.

Hemerocallis
fulva ž.
flava z.
cœrulea red. zil.
japonica Thunb. sap.

AGAPANTHUS

— { crinum africanum z. }

umbellatus l'her. sert. }

— minor.

ORDO VIII.

NARCISSEÆ.

Dorianthes

excelsa correa s. lin. }

correa brown. prodr. }

Agave americana ž.

- variegata.
lurida Jacq. coll.?
mexicana.

- angustifolia.
vivipara z.
fœtida z. v.

manguai.
bulbifera Bonpland.
yuccæfolia Red. Lil.
spicata Dec. cat.

Alstroemeria pelegrina z. Ligtu z. Hæmanthus

EMANTHUS
coccineus L.
puniceus L.
pubescens L. f.
albiflos Jacq. H. sch.

pétiolé. f. v.
à feuill. de scorsonère. 12
Moly. f. w
odorant. cap. or. w

Tubéreuse
des jardins. inde. or. 72 (orn.)

Hémérocale
rouge. chine. L' (orn.)
jaune. suisse. L' (orn.)
bleue. chine. or. L' (orn.)
du Japon. L' (orn.)

AGAPANTHUS

ombellisere. cap. or. ұ(orn.)

— petit.

ORDRE VIII.

NARCISSÉES.

Dorianthes
élevé. n. holl. s. ch. p

AGAVÉ

d'Amérique. Am. m. or. 5

(orn.)

— panaché.

du Mexique. s. ch. 5

— à feuilles étroites.

vivipare. Am. m. s. ch. 5

Aloès-Pitt. Am. m. s. ch. 5

Manguai. Mexique. s. ch. 5

à feuilles d' rucca. s. ch. 4

à épis. Am. m. s. ch. 4

PÉLÉGRINE
tachetée. Pérou. or. ¥ (orn.)
veinée. Pérou. or. ¥ (orn.)

Hémanthe
écarlate. cap. or. Z (orn.)
ponceau. cap. or. Z (orn.)
pubescent. cap. or. Z (orn.)
à fleurs blanches. cap. or. Z
(orn.)

quadrivalvis Jacq. H. sch.

lanceæfolius. jacq. H. sch. multiflorus red. Lil.

CRINUM

asiaticum Red. Lil. americanum Red. Lil.

erubescens Red. Lil. commelini. Red. Lil.

giganteum Red. Lil.

otaitense Red. Lil. multiflorum.

CIRTHANTHUS

obliquus Red. Lil.
Amaryllis umbellata l'Her.
sert.
angustifolius H. K.
crinum angustifolium L. f.

Anigozanthos flavida red. Lil.

AMARYLLIS

lutea L.
Atamasco L.
formosissima L.

proussonetii red. Lil.)
ornata rot. mag. }
longifolia red. Lil.

reginæ l'Her. sert.
reginæ l'Her. sert.
revoluta l'Her. sert.
variabilis Jacq. H. sch.
equestris Red. Lil.
punicea. Encycl.
vittata l'Her. sert.
Josephinæ Red. Lil.

sarniensis L.

curvifolia jacq. H. sch.

à quatre valves. cap. or. Z (orn.) à f. en lance. cap. or. Z (orn.) à fleurs nombreuses. Guinée. s. ch. ¥ (orn.)

CRINUM

d'Asie. malabar. s. ch. \(\pi\) (orn.)
d'Amérique. Am. m. s. ch. \(\pi\)
 (orn.)
à bords rouges. Am. m. s. ch. \(\pi\)
de Commelin. Am. m. s. ch. \(\pi\)
de Connelin. am. m. s. ch. \(\pi\)
gigantesque. siéra-léona. s. ch. \(\pi\)
(orn.)
de Taïti. s. ch. \(\pi\) (orn.)
à fl. nombreus. s. ch. \(\pi\) (orn.)

CIRTHANTHUS

oblique. cap. or. \u03c4 (orn.)

à f. étroites. cap. or. 4 (orn.)

ANIGOZANTHOS
à fleurs jaunes. N. Holl. or. V.

AMARYLLIS

jaune. F. m. & (orn.)

Atamasco. Am. s. & (orn.).

Lis de S.-Jacques. Mexique.

or. & (orn.)

de Broussonet. s. ch. ¥ (orn.)

à feuilles longues. cap. or. Z. (orn.)

Belladone. cap. & (orn.)
de la reine cap. or. & (orn.)

réfléchie. cap. or. \u03c4 (orn.)

rose. Am. m. s. ch. ¥ (oru).

veinée. cap. or. Z (orn.) de Joséphine. Afr. mér. s. ch.

Tr (orn.)

Grénésienne. Grénesey. or. ¥ (orn.)

à seuilles courbes. cap. or. & (orn.)

gigantea H. K. }
sagus Thomps. }
undulata L. s. veg.
aurea l'Her. sert.
spectabilis.

PANCRATIUM
speciosum red. Lil.
littorale red. Lil.

fragrans red. Lil.
declinatum red. Lil.
amboinense L.
illyricum L.
maritimum L.

NARCISSUS

poeticus z.
biflorus Bot. Magaz.
Pseudo-Narcissus z.
— bicolor Gouan Ill.
odorus z.
punilus Red. Lil.
calathirus Red. Lil.
minor L.
Tazetta z.
Jonquilla Z.
Pseudo-Jonquilla.
Eulbocodium z.

Leucoium
vernum z.
æstivum z.
trichophyllum red. zil.

GALANTHUS nivalis z.

Hypoxis

erecta L.

sobolifera willd. sp.
stellata red. Lil.
tridentata red. Lil.

Bromelia Ananas L. Pinguin L.

TILLANDSIA serrata z.?

gigantesque. siéra-léona. s.ch. v (orn.) ondulée. cap. or. v (orn.) jaune. chine. s. ch. v (orn.) élégante. s. ch. v

PANCRATIUM
élégant. Antilles. s. ch. V (orn.)
des rivages. Am. m. s. ch. V
(orn.)
odorant. Am. m. s. ch. V (orn.)
abaissé. Guïane. s. ch. V (orn.)
d'Amboine. s. ch. V (orn.)
de Dalmatie. V (orn.)
maritime. f. V (orn.)

des poètes. F. W (orn.)
à deux fleurs. Angleterre. W
porion. F. Z (orn.)
— bicolor. F. Z (orn.)
odorant. F. m. W (orn.)
nain. Z
à grande coupe. Portug. or. W
petit. Espagne. W
à bouquets. F. m. Z (orn.)
Jonquille. F. m. Z (orn.)
Fausse Jonquille. Z
trompette. F. m. Z (orn.)

LEUCOIUM

printanier. Alpes v.
d'été. F. v.
à feuilles menues. corse. or. v.

GALANTHUS

Perce-neige. F. & (orn.)

Hypoxis à tige droite. Am. s. or. 12 à rejeton. cap. or. 12 étoilé. cap. or. 12 à trois. dents. cap. or. 14

ANANAS
cultivé. Antilles. s. ch. \(\varphi\) (alim.)
pinguin. Antilles. s. ch. \(\varphi\)

TILLANDSIA
à feuill. en scie. Antill. s. ch. 4.

ORDO IX.

IRIDEÆ.

SISYRINCHIUM

Bermudiana willd. sp.

gramineum Bot. Magaza

anceps willd. sp.

convolutum Red. Lil.

tenuifolium Red. Lil.

striatum smith. 1c. pictæ.

Tigridia pavonia red. Lil.

FERRARIA undulata z.

- IRIS.

1. Barbatæ.

susiana L. florentina L. germanica L. - cœrulea. - violacea. pallida Lamk. Ili. flavescens red. Lil. sambucina Red. Lil. plicata Lámk. Ill. swertii Lamk. Ill. squalens L. variegata L. aphylla? z. pumila L. - cærulea. lutescens Lamk. Ill. cristata Red. Lil. arenaria Kitt. et wald. Hung.

2. Imberbes.

pseudo-Acorus L.
foetidissima L.
monnieri Red. Lil.
ochroleuca willd. sp.
spuria L.
fimbriata vent. H. cels.
sibirica L.
pratensis Lamk. Ill.

Chara & 1

ORDRE IX.

IRIDÉES.

BERMUDIENNE

à petites fleurs. Am. s. V
à feuilles de Gramen. Virginie. U
roulée. Mexique. or. U
à feuilles menues. Mexique.
or. U
à réseau. Mexique. or. U

TIGRIDIA
panaché. mexique. or. ¥ (orn).

FERRARIA ondulé. cap. or. ¥

IRIS.

1. Fleurs barbues.

de Suze. orient. or. ¥ (orn.) de Florence. italie. \(\psi\) (méd.) Flambe. F. L (orn.) - bleue. - violette. pâle. orient. z (orn.) jaunâtre. ¥ (orn.) à odeur de sureau. F. Z plissé. orient. ¥ de Swert. V. sale. F. m. Z panaché. Hongrie. ¥ sans feuilles. Z nain. F. 华 (orn.) — bleu. jaune-pâle. F. Z à crête. Am. s. T des sables. Hongrie. L

2. Fleurs sans barbe.

des marais. F. Z (méd.)
fétide. F. Z
de le Monnier. orient. Z
jaune. orient. Z
bâtard. F. Z
frangé. chine. or. Z
de Sibérie. Z

stenogyna Red. Lil. \
stenogyna Red. Lil. \
graminea L.
scorpioides Desf. All.
xiphium L.
xiphioides Red. Lil.
tuberosa L.
persica L.
sisyrinchium L.
curtopetala Red. Lil.

VIEUSSEUXIA

glaucopis pec. Ann. du mus.

iris tricuspis Thunb. prodr.

MORÆA

iridioides L.

Northiana Andr. Rep.

vaginata Red. Lil.

elegans Jacq. H. sch.
sisyrinchium elegans Red. Lil.

sordescens Jacq. Ic.

chinensis Willd. sp.
ixia chinensis L.
Belamcanda chinensis Red.
Lil.

IXIA

Bulbocodium z.

— parviflorum red. zil.

crocata z.

hyalina red. zil.

miniata sacq. H. sch.

— maculata.
polystachia L.
scillaris Bot. Magaz.
tricolor Bot. Magaz.
anemonæflora Jacq. Ic.
fusco-citrina Red. Lil.
leucantha Jacq. Ic.
bulbifera L.
longiflora Lamk. Ill.
Gladiolus longiflorus Jacq. Ic.)
erecta Vahl. sp.
maculata Jacq. H. sch.
viridis Jacq. H. sch.
cruciata Jacq. Ic.
Liliago. Red. Lil.

bigarré. Am. s. W
à stigmates étroits. W
à f. de gramen. Autriche. W
Queue de scorpion. Barb. W
Xiphium. F. m. W (orn.)
xiphioïde. Esp. or. W (orn.)
Hermodate. orient. or. W
de Perse. or. W
à feuilles de safran. or. W
à pétales bossus. or. W

VIEUSSEUXIA

à taches bleues. cap. or, 4

Moréa
Faux Iris. cap. or. Z
à gaînes. cap. or. Z
élégant. cap. or. ¥
étalé. cap. or. ¥
de Chine. ¥ (orn.)

Bulbocodium. F. T.

— à petites fleurs.

safrané. cap. or. T. (orn.)

couleur de minium. cap. or. T.

(orn.)

— maculé.

à plusieurs épis. cap. or. T.

à fleurs de scille. cap. or. T.

tricolor. cap. or. T.

à fl. d'Anémone. cap. or. T.

à fleurs blanches. cap. or. T.

bulbifère. cap. or. T.

à longues fleurs. cap. or. T.

à longues fleurs. cap. or. & à tige droite. cap. or. & maculé. cap. or. & à fleurs vertes. cap. or. & crucifère. cap. or. & à fleurs de Lis. cap. or. &

GALAXIA

ixiæflora red. zil.

ixia columnaris Andr. rep.

DIASIA
iridifolia *red. Lil.*graminifolia *red. Lil.*

GLADIOLUS

communis L. - grandiflorus. plicatus L. mucronatus Jacq. Ic. xanthopylus red. Lil. undulatus Jacq. 1c. strictus Red. Lil. hirsutus Jacq. Ic. cardinalis red. zil. tristis L. angustus L. carneus Jacq. Ic. ringens Jacq. Ic. cuspidatus Jacq. Ic. lineatus Red. Lil. merianus Jacq. Ic. Antholiza meriana z.) tubatus Jacq. Ic. tubiflorus Jacq. 1c. inclinatus Red. Lil. § junceus red. Lil. Lapeyrousia juncea Pourret. Act. Tolos. securiger Bot. Magaz. montbretia securigera red. Lil.

ANTHOLYZA

- æthiopica z.

cunonia z.

GROCUS

vernus Red. Lil.
multifidus Ramond. s. Phil.
biflorus Red. Lil.
susianus Red. Lil.
luteus Red. Lil.
sativus Willd. sp.

Wachendorfia thyrsiflora L.

Pontederia cordata z.

GALAXIA

à fleurs d'ixia. cap. or. E

DIASIA

à feuilles d'iris. cap. or. Ta à feuill. de gramen. cap. or. Ta

GLAYEUL

commun. F. Z (orn.) — à grande fleur. (orn.) plissé. cap. or. w mucroné. cap. or. T à taches jaunes. cap. or. 22 ondulé. cap. or. 1 serré. cap. or. 72 velu. cap. or. Z cardinal. cap. or. \(\mathbb{V}\) (orn.) triste. cap. or. T à feuilles étroites. cap. or. W couleur de chair. cap. or. 15, à deux levres. cap. or. ¥ pointu. cap. or. 证. veiné. cap. or. T de Mérian. cap. or. 72 trompette. cap. or. 75 tubulé. cap. or. ¥

joncisorme. cap. or. 4

en doloire. cap. or. ¥

ANTHOLYZE

d'Ethiopie. cap. or. V (orn.) cunonia. cap. or. V (orn.)

SAFRAN

printanier. F. L (orn.)
découpé. pyrénées. L
à deux fleurs. L (orn.)
de Suze. orient. L (orn.)
jaune. L (orn.)
cultivé. orient. L (éc. méd.)

WACHENDORFIA

à fleurs en grappes. cap. or. ¥

à f. en cœur. Am. s. Z (orn.)

CLASSIS IV.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

MUSÆ.

Musa

sapientum L.

paradisiaca L.

— violacea. coccinea Andr. Rep.

Heliconia humilis jacq. H. sch.

RAVENALA madagascariensis encycl.

STRELITZIA reginæ H. K.

ORDO II.

CANNÆ.

CANNA

indica L.
 glauca L.
 gigantea red. zil.
 flaccida red. zil.

GLOBBA

nutans rcd. Lil.

Renealmia nutans willd.

Enum.

erecta red. Lil.

AMOMUM

_ zingiber L.

zerumbet z.

CLASSE IV.

MONOCOTYLEDONS.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

BANANIERS.

BANANIER

à petit fruit. Inde. s. ch. Z. (alim.)
à grand. fruit. Inde. s. ch. Z

(alim.)
- violet.

écarlate. chine. s. ch. ¥

HÉLICONIA

de Jacquin. caracas. s. ch. 妆]

RAVÉNAL

de Madagascar. s. ch. 5

STRÉLITZIA

de la reine. cap. s. ch. z.

ORDRE II.

BALISIERS.

BALISIER

des Indes. s. ch. ¥
glauque. caroline. or. ¥
gigantesque. s. ch. Æ
flasque. caroline. or. ¥

GLOBBA

à fleurs penchées. Inde. s. ch. 75

à fleurs droites. mde? s. ch. ¥

AMOME

cingembre. mde. s. ch. Z (écon. méd.) zérumbet. inde. s. ch. Z (écon. méd.) cardamomum z.
cranum-paradisi z.

HEDYCHIUM coronarium Bot. Magaz.

Costus arabicus z.

MARANTA arundinacea z.

Peronia stricta ned. zil.

Curcuma – longa z.

Kempferia

Galanga L.

- longa Jacq. H. sch.

angustifolia willd. Enum.

ORDO III.

OR CHIDEÆ.

ORCHIS.

1. Bulbis indivisis.

bifolia L.

pyramidalis L.

coriophora L.

morio L.

mascula L.

laxiflora Encycl.

ustulata L.

militaris L.

variegata Encycl.

simia Encycl.

hircina swartz. orch.

satyrium hircinum L.

2. Bulbis palmatis.

latifolia z.
maculata z.
conopsea z.
abortiva z.

cardamome. Inde. s. ch. 15 (écon. méd.) craine-dé-paradis. Afr. s. ch, U (méd.)

HÉDYCHIUM
à bouquets. inde. s. ch. Z

Costus d'Arabie. mde. s. ch. ψ (méd.)

MARANTA
à f. de Balisier. Ant. s. ch. W

PÉRONIA
à tige droite. s. ch. Z

CURCUMA
safran des Indes. s. ch. (écon.
méd.)

Kæmpferia Galanga. Inde. s. ch. ¥ (méd.) allongé. Inde. s. ch. ¥ à feuilles étroites. s. ch. ¥

ORDRE III.

ORCHIDÉES.

ORCHIS.

1. Bulbes entières.

à deux feuilles. F. L.

py ramidal. F. L.

fétide. F. L.

morio. F. L.

måle. F. L.

à fleurs låches. F. L.

charbonné. F. L.

militaire. F. L.

singe. F. L.

puant. F. ¥

2. Bulbes palmées.

à larges feuilles. F. L maculé. F. L à long éperon. F. L avorté. F. L

viridis swartz orch. satyrium viride L. OPHRYS anthropophora L. insectifera L. - musciflora. — arachnites. - rubiginosa. NEOTTIA elata willd. sp. spiralis swartz. orch. ophrys spiralis L. æstivalis. ophris æstivalis Encycl. MALAXIS lilifolia swartz orch. ophrys lilifolia L. Loeselii swartz. orch. ophrys Loeselii L. EPIPACTIS latifolia swartz. orch. serapias latifolia L. palustris swartz. orch. serapias longifolia L. s. veg. (pallens swartz. orch. serapias grandiflora z. J rubra swartz. orch. serapias rubra L. Nidus-avis willd. sp.) ophrys vidus-avis L. ovata willd. sp.) ophrys ovata L. LIMODORUM rankervilliæ swartz. orch. CYMBIDIUM purpureum. Limodorum purpureum.

Encycl. aloifolium swartz. orch. Epidendrum aloifolium z. sinense willd. sp. Epidendrum sinense Andr. Rep. CYPRIPEDIUM calceolus z.

1,

1 hour -11th 12.

vert. F. W OPHRYS homme. F. W insecte F. Z - mouche. - araignée. - rouillé. NÉOTTIA élancé. Antilles. s. ch. 16 enspirale. F. Y d'été. F. Z MALAXIS à feuilles de Lis. canada. W de Loesel. r. 72 EPIPACTIS à larges feuilles. F. Z des marais. F. W. à grandes fleurs. F. Z rouge. F. V Nid-d'oiseau. F. W pouble-feuille. F. 軍 LIMODORUM de Tankerville. chine. s. ch. V (orn.)

CYMBIDIUM pourpre. Antilles. s. ch. T à feuilles d'Aloès. mde. s. ch. 74 de Chine. s. ch. T

CYPRIPÉDIUM des Alpes. To Epidendrum cochleatum z. elongatum jacq. 1e.

VANILLA aromatica swartz. orch.)

Epidendrum vanilla z.

ORDO IV.

HYDROCHARIDE Æ.

VALLISNERIA spiralis L.

STRATIOTES alooides z.

Hydrocharis morsus ranæ L.

Nymphæa alba z. lutea z.

EPIDENDRUM limaçon. Antilles. s. ch. V

allongé. Antilles. s. ch. V

VANILLE

aromatique. Am. m. s. ch. 26 (écon.)

ORDRE IV.

HYDROCHARIDÉES.

VALLISNERIA
en spirale. F. L

STRATIOTES
à feuilles d'Aloès. F. Z

Moréne aquatique. F. Z

Nymphéa blanc. f. T jaune. f. T

CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA

pubera Brown. prodr.
altissima pesf. Atl.
sempervirens L.
ristolochia L.
oblongata Jacq. H. sch.
caudata L.
trilobata L.
sipho l'Her. stirp.
rotunda L.
clematitis L.
serpentaria L.

CLASSE V.

MONOCOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARISTOLOCHES.

ARISTOLOCHE

pubescente. N. Holl. or. 9
élevée. Alger. or. 9
toujours verte. orient. or. 9
crénelée. F. m. or. Iz (méd.
à f. oblong. caracas. s. ch. 9
filifère. Antilles. s. ch. 9
trilobée. Antilles. s. ch. 9
en siphon. Am. s. 9
ronde. F. m. Iz (méd.)
clématite. F. Iz (méd.)
serpentaire. Am. s. Iz (méd.)

ASARUM

europæum z. canadense z. virginicum z.

ASARUM

d'Europe. f. Z (méd.) de Canada. Z de Virginie. or. Z

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(stamina perigyna.)

ORDO I.

ELÆAGNEÆ.

I. Stamina 5, aut pauciora.

THESIUM

linophyllum z.

OSYRIS

alba L.

HIPPOPHAE

Rhamnoides L. canadensis L.

ELÆAGNUS

angustifolia z.

NYSSA

aquatica L.
denticulata H. K.
angulisans Mich. Fl.
villosa Mich. Fl.
candicans Mich. Fl.

vII. Stamina sapiùs 10.

BUCIDA

Buceras L.

. et J.

TERMINALIA

angustifolia Jacq. Hort. }
Benzoin L. f.

CLASSE VI.

DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

CHALEFS.

I. Cinq étamines, ou moins.

THÉSIUM

à feuilles de Lin. F. Y

OSYRIS .

blanc. F. b

 $H_{IPPOPHAE}$

Rhamnoïde. F. 19 de Canada. 19

CHALEF

à feuill. étroit. orient. 5 (orn.)

TUPELO

aquatique. Am. s. 9

velu. Am. s. h

ic il ell .

blanchâtre. Am. s. h

II. Ordinairement 10 étamines.

BUCIDA

cornu. Antilles. s. ch. 5

BADAMIER

à feuilles étroit. mde. s. ch. 3

ORDO II.

THYMELEÆ.

Direa palustris z.

DAPHNE.

1. Floribus lateralibus.

mezereum z.

— album.

Thymelæa z.

Tarton-raira z.

alpina z.

pontica z.

Laureola z.

" 2. Floribus terminalibus.

odora Thunb. Jap. \
sinensis Encycl. \
collina Smith. spicil.
cneorum z.
cnidium z.

PASSERINA

hirsuta z.
dioica ramond. soc. phil. \
Daphne dioica gouan. Ill. \
spicata z. f.
filiformis z.
grandiflora. L. f.

Stellera passerina L.

STRUTHIOLA
virgata L. Mant.
erecta L. Mant.
imbricata. Andr. Rep.

LACHNEA eriocephala willd. sp.

Dais cotinifolia z. laurifolia jacq. ic.

GNIDIA simplex L. Mant. pinifolia L. f.

ORDRE II.

THYMÉLÉES.

DIRCA
Bois-cuir. Am. s. h

 $D_{APHN\acute{E}}.$

1. Fleurs latérales.

Bois-gentil. F. 5 (orn.)

— à fleurs blanches.

Thymélée. F. 5 (orn.)

Tarton-raire. F. m. or. 5

des Alpes. 5

de Pont. Asie. 5

Lauréole. F. 5

2. Fleurs terminales.

odorant. japon. or. 5 (orn.)
d'Italie. or. 5
cneorum. F. 5 (orn.)
garou. F. m. 5 (méd.)

PASSERINE
cotonneuse. F. m. or. 5
dioïque. pyrénées. 5
à épis. cap. or. 5
filiforme. cap. or. 5

à grandes fleurs. cap. or. 1).

STELLERA

passerine. F. •

STRUTHIOLA

effilé. cap. or. 5
à tige droite. cap. or. 5
imbriqué. cap. or. 5

À tête laineuse. cap. or 5

DAIS

à feuilles de Fustet. cap. or. 5

à tiges simples. cap. or. b à feuilles de pin. cap. or. b

ORDO III.

PROTEACE Æ.

PROTEA

pallens L. Mant.
conifera L. Mant.
toria Thunb. Diss.
obliqua L. f.
Levisanus L. Mant.
hirta L. Mant.
prolifera Lamk. (non Thunb.)
saligna Thunb. Diss.
passerina.
conocarpa Willd. sp.
Leucospermum conocarpum
Brown. Prot.
ciliata.
Leucadendrum grandiflorum

BANKSIA

serrata L. f.

præmorsa Andr. Rep.

marcescens Brown. Prodr.

spinulosa smith. N. Holl.

ericifolia Brown. Prodr.

longifolia.

Bot. Magaz.

HAKEA

gibbosa cav. tc.
dactyloides cav. tc.
saligna Brown. prodr.
Embothrium salicifolium
vent. H. cels.
ceratophylla Brown. Prodr.
suaveolens Brown. Prodr.
epiglottis la Bill. N. Holl.
pugioniformis cav. 1c.?
acicularis vent. Malm.

EMBOTHRIUM

sericeum smith, N. Holl.
Grevillea sericea Brown.
Prodr.
speciosissimum smith, N.
Holl.
Telopea speciosiss. Brown.
Prodr.
silaifolium smith, N. Holl.

ORDRE III. PROTÉACÉES.

PROTEA

Arbre d'arg. cap. or. 5 (orn.)
pâle. cap. or. 5
conifère. cap. or. 5
tordu. cap. or. 5
oblique. cap. or. 5
Levisanus. cap. or. 5
hérissé. cap. or. 5
prolifère. cap. or. 5
à feuilles de saule. cap. or. 5
passerina. cap. or. 5

à fruits coniques. cap. or. 9

cilié. cap. or. 5

BANKSIA

à feuill, en scié. N. Holl. or. 5

tronqué. N. Holl. or. 5

épineux. N. Holl. or. 5

à f. de Bruyère. N. Holl. or. 5

à long. feuilles. N. Holl. or. 5

H_{AKEA}

gibbeux. n. Holl. or. h dactyloide. n. Holl. or. h

à f. de saule, N. Holl. or. 5

à feuill. cornues. N. Holl. or. 5 odorant. N. Holl. or. 5 épiglotte. N. Holl. or. 5 à long. pointes. N. Holl. or. 5 à feuilles grêles. N. Holl. or. 5

EMBOTHRIUM

satiné. N. Holl. or. 19

écarlate. N. ноll. ог. у (оги).

à feuill. de silaüs. N. Holl. or. b

PERSOONIA linearis Brown. Prodr.

ORDO IV.

LAURINE E.

LAURUS.

1. Folia perennantia.

- cinnamomum z.
- camphora z.

cassia z.

- persea z. Vel Serien gratessimas. nobilis z.

> indica z. Borbonia z.? caroliniensis mich. Fl. fætens H. K.

> > 2. Folia decidua.

geniculata mich. Fl. Benzoin L. sassafras L.

HERNANDIA sonora L.

an atophylle , and it ORDO V.

POLYGONE Æ.

COCCOLOBA

exceriata L. uvifera L. rheifolia. latifolia Encycl. rugosa. pubescens L. pyrifolia. excoriata encycl. var. B. fagifolia Jacq. H. sch. nitida. nivea swartz. prodr. laurifolia.

PERSOONIA

à f. linéaires, N. Holl. or. 19

ORDRE IV.

LAURINÉES.

LAURIER.

1. Feuilles persistantes.

cannellier. ceylan. s. ch. 19 (écon. méd.)

camphrier. Japon. or. 5 (écon. méd.)

cassia. inde. s. ch. n

Avocat. Antill. s. ch. b (alim.)

d'Apollon. orient. or. 5 (écon. méd.)

des Indes. canaries. or. 19

Borbonia. or. 5

de Caroline. or. h

fétide. canaries. or. h

2. Feuilles tombantes.

géniculé. caroline. or. 9 faux Benjoin. Am. s. h

sassafras. caroline. b (méd.)

HERNANDIA

sonore. inde. s. ch. 5

I NAVE a consider instant ORDRE V.

POLYGONÉES.

RAISINIER

écorcé. Antilles. s. ch. 5 à grappes. Antilles. s. ch. b à feuilles de Rhapontic. Antill. s. ch. h ridé. Antilles. s. ch. h pubescent. Antilles. s. ch. 19 à seuilles de poirier. Antilles. s. ch. b à seuilles de Hêtre. Antilles. s.ch. b à fl. blanch. Antilles. s. ch. 3 à feuilles de Laurier. Antilles.

s. ch. b

Brunnichia cirrhosa mich. Fl.

ATRAPHRAXIS undulata *t*. spinosa *t*.

POLYGONUM.

1. Foliis indivisis, floribus octandris, trigynis.

aviculare z.

maritimum L.
frutescens L.
divaricatum L.
alpinum All. Ped.
angustifolium.
diffusum Encycl.

2. Persicaria, stylo bifido, stamina minus 8.

orientale L.

Persicaria L.

— maculata.
lapathifolium L.

minus smith. Fl.

pusillum nec, Fl.

Hydropiper L.

amphibium L.

virginianum L.

3. Bistortæ, spica unica.

viviparum L.

Bistorta L.

— latifolia.

4. Folia subcordata.

tataricum L.
Fagopyrum L.
emarginatum willd. sp.
convolvulus L.
dumetorum L.
scandens L.
acetosæfolium vent. H. cels.

RUMEX.

1. Hermaphroditi, valvulis glandula destitutis.

tunaria L. vesicarius L.

BRUNNICHIA
à vrilles. Am. s. 3

ATRAPHRAXIS

ondulé. cap. or. 19
épineux. orient. 19

POLYGONE.

1. Feuilles entières, 8 étamines, 3 styles.

Renouée, centinode. F. W. (méd.)
de Bellardi. riémont. W. maritime. F. W. arbrisseau. sibérie. H. étalé. sibérie. W. des Alpes. W.

à feuilles étroites. sibérie. ¥

2. Persicaires, style bisside, moins de 8 étamines.

d'Orient. (orn.).

petsicaire. f. (orn.).

— maculée.

à feuilles de Lapatum, f. (o

nain. f. 🔾

poivre-d'eau. f. ⊙ amphibie. f. Z de Virginie. ¥

3. Bistortes, un seul épi.

vivipare. Alpes. Z Bistorte. F. Z (méd.) — à larges feuilles.

4. Feuilles en cœur ou hastées.

de Tartarie. (écon.)
sarrazin. Asie. (écon.)
échancré. chine. (écon.).
Liseron. F. Z
des buissons. F. Z
grimpant. Am. s. Z
à f. d'oseille. Brésil. s. ch. Z

RUMEX.

1. Hermaphrodites, calice sans glandes.

arbrisseau. canaries. or. ъ vésiculeux. Barbarie. ⊙ tingitanus z.
scutatus z.
glaucus.
digynus z.
bucephalophorus z.

2. Flores diclines.

abyssinicus Jacq. Hort. arifolius L. f. }
alpinus L. tuberosus Encycl. an L.?
inontanus. arifolius All. Ped. }
cordatus.
Acetosa L.
Acetosella L.
spinosus L.

3. Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.

maritimus L.

crispatulus Mich. Fl.

persicarioides Encycl.

ægyptiacus L.

dentatus L. Mant.

pulcher L.

nemolapathum L. f.

sanguineus L.

purpureus Encycl.

obtusifolius L.

crispus L.

Hydrolapathum Willd. sp.

aquaticus smith. Fl.

patientia L.

undulatus.

RHEUM

Rhaponticum L.
compactum L.
undulatum L.
Ribes L.
hybridum H. K.
palmatum L.

TRIPLARIS americana vahl. symb.

CALLIGONUM comosum pesf. Atl.

rose. Égypte. ①
de Tanger. or. ¥
en bouclier. F. ¥ (écon.)
— glauque.
à deux styles. Alpes. Æ
tête-de-Bœuf. F. ①

2. Fleurs polygames.

d'Abyssinie.s.ch. T des Alpes. T (méd.) tubéreux. or. T de montagne. Alpes. T en cœur. cap. or. T oseille des prés. F. T auriculé. F. T épineux. orient. ①

3. Fleurs hermaphrodites, valves glanduleuses.

maritime. F. ①

crispé. Am. s. ②

d'Egypte. ②

denté. Égypte. ②

violon. F. &

des bois. F. L

sanguin. Am. s. L

purpurin. L

à feuilles obtuses. F. L

crépu. F. L

des marais. F. L

patience. F. L (méd.)

ondé. sibérie. T

RHUBARBE

Rhapontic. Asie. ¥ (méd.)
compacte. chine. ¥ (méd.)
ondée. chine. ¥ (méd.)
Ribes. Asie min. Æ (écon. méd
hybride. Asie boréale. ¥
palmée. chine. Æ (méd.)

Triplaris
d'Amérique. s. ch. 5

CALLIGONUM
hérissé. Afr. sept. or. 3

PAULASIA

caspica L. f.

pallasia pterococcus pall.

noss.

calligonum pallasia willd. sp.

ERYOGONUM

tomentosum Mich. Fl.

ORDO VI

ATRIPLICE Æ.

I. Fructus baccatus.

PHYTOLAGCA

octandra È.
decandra L.
dodecandra l'Her. stirp.
icosandra L.
dioica L.

RIVINA

- humilis L.

- lævis L. mant. purpurascens willd. Enum. brasiliensis willd. sp.? tetrandra.

BOSEA

yerva-mora ż.

II. Fructus eapsularis.

PETIVERIA

alliacea L.

Polycnemum arvense *t*.

Camphorosma monspeliaca ż.

PTERANTHUS

echinatus Desf. Atl.
camphorosma pteranthus L.
mant.
Louichea cervina l'Her. stirp.

JALENIA

africana L.

PALLASIA

de la mer Caspienne. or. 4

ERYOGONUM cotonneux. caroline. or. 4

ORDRE VI.

ARROCHES

I. Une baie.

PHYTOLACCA

à 8 étamines. Mexiq. s. ch. 5 à 10 étamines. Am. s. Z à 12 étamines. Abyss. s. ch. 5 à 20 étamines. 1nde. s. ch. 5 dioïque. Am. m. s. ch. 5

RIVINA

velu. Antilles. s. ch. 5 lisse. Antilles. s. ch. 5 pourpre. s. ch. 5 du Brésil. s. ch. 5 à 4 étamines. s. ch. 5

BOSEA

yerva-mora. canaries. or. p

II. Une capsule.

PÉTIVÉRIA

alliace. Antilles. s. ch. 9

POLYCNEMUM

des champs. F. O

CAMPHRÉE

de Montpellier. or. 19

PTÉRANTHUS

hérissé. Barbarie. O

GALÉNIA

d'Afrique. cap. or. 5

III. Semen tectum calice, stamina 5.

BASELLA rubra L. alba L.

vesicaria Encycl.

SALSOLA.

1. Fruticosa.

brevifolia Desf. Atl.

{ fruticosa L. chenopodium fruticosum willd. Enum.

prostrata L. sericea Willd. Enum.

chenolea diffusa Willd. sp. oppositifolia Desf. Atl.

2. Herbacea.

sueda baccata pelile. Fl. hortensis. sueda hortensis *pelile*. Fl. hirsuta L. muricata L. Mant. laniflora Pallas. Itin. arenaria wald. et kitt. Hung. altissima L. chenopodium altissimum willd. Enum. soda L. radiata Desf. Ann. platiphylla mich. Fl. Kochia dentata willd. Hort. salsa L. Mant. Kali L. Tragus Z.

SPINACIA

oleracea L.

— lævis.

BETA

vulgaris L.

— rubra.
cycla L.
trigyna wald. et kitt. Hung.
maritima L.

HI. Graines reconvertes par le calice, 5 étamines.

BASELLE

rouge. Inde. & (écon.)
blanche. chine. & (écon.)
vésiculeuse. pérou. s. ch. 9

SoudE.

1. Tiges ligneuses.

à f. courtes. Barbarie. or. 9.

arbrisseau. F. h

couchée. sibérie. 9

satinée. cap. or. 5

à feuill. opposées. Barb. or. 5

2. Tiges herbacées.

baccifère. or. ¥

des jardins. O

velue. F. m. ①

hérissée. Égypte. or. Z

laineuse. sibérie. Z

des sables. F. ①

élevée. Italie. O

commune. F. O

rayonnée. Am. s. O

salee. sibérie. ① (arts.)

Kali. F. ① (arts.)

épineuse. F. ② (arts.)

ÉPINARD

cultivé. (alim. méd.)
— lisse.

BETTE

commune. Eur. Aust. & (alim.)
— rouge.
racine de disette. Portugal. & à 5 styles. Hongrie. & maritime. F. •

CHENOPODIUM.

ANSERINE.

1. Foliis angulatis.

Bonus-henricus L. urbicum L.

atriplicis H. K.

Quinoa willd. sp.? rhombifolium willd. Enum.

crassifolium.

opulifolium Nocca.

murale L.

hybridum L.

ficifolium smith. Fl.?

album z.

rubrum L.

ambrosioides L.

anthelminticum z.

Botrys L.

multifidum L.

fætidum willd. Enum.

glaucum L.

2. Foliis integris.

vulvaria L. lanceolatum willd. Enum. caudatum Jacq. Ic.

polyspermum L.

scoparia L.

villosum Encycl.

aristatum L.

maritimum L.

ATRIPLEX

Halimus L.

portulacoides L.

albicans willd. sp.

rosea L.

sibirica L.

microsperma willd. sp.

lacera.

hortensis L.

- rubra.

- ruberrima.

nitens willd. sp.

laciniata L.

multifida.

hastata L.

patula L.

angustifolia willd. sp.

littoralis L.

1. Feuilles anguleuses.

Bon-Henri. F. 7 (méd.)

triangulaire. F. O

à feuilles d'Arroche. chine. O

quinoa. pérou. ⊙ (alim.)

rhomboidale. Am. s. O à feuilles épaisses. O

à feuilles d'obier. O

des murailles. F. 🔾

hybride. F. 🔾

à feuilles de Figuier. F. O

blanche. F. O

rouge. F. 🔾

odorante. mexique. O

anthelmintique. Am. s. or. 5

Botrys. F (méd.)

laciniée. Buénos-Ayres. or. 19-

puante. O

glauque. F. O

2. Feuilles entières.

fétide. F. 🕝

lancéolée. Am. s. 🔾

à longues grappes. guinée. O

polysperme. F. O

Belvédère. chine. O

velue. sibérie. 🔾

barbue. sibérie. O

maritime. F. O

ARROCHE

наlime. F. 为

à feuilles de Pourpier. F. 19

blanchâtre. cap. or. 3

rose. F. O

de Sibérie. 🕥

à petit fruit. нопgrie. О

lacérée. O

des jardins. Asie. (écon.)

- rouge.

- très-rouge.

luisante. Hongrie. O

laciniée. F. 🔾

découpée. 🔾

hastée. F. 🔾

touffue. F. O

à feuilles étroites. F. O

des rivages. F. O

III. Semen tectum calice, stamina pauciora quam 5.

Axyris amaranthoides \hat{L} .

BLITUM
capitatum L.
virgatum L.
chenopodioides L. Mant.

Salicornia herbacea L. fruticosa L.

Corispermum spicatum. hyssopofolium L.

III. Graines recouvertes par le calice, moins de 5 étamines.

AXYRIS
fausse Amarante. sibérie. O

Blette
à fleurs en tête. f. ©
effilée. f. ©
fausse Anserine. Tartarie. ©

SALICORNE
herbacée. F. ①
arbrisseau. F. m. or. 5

CORISPERME

à épis. sibérie. ①

à feuilles d'hysope. tart. ①

CLASSIS VII.

CLASSE VII.

DYCOTYLEDONES DYCOTYLEDONS

APETALE.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AMARANTHI.

AMARANTHUS.

1. Flores triandri.

albus L.
græcisans L.
angustifolius Encyel.
prostratus Willd. sp.
tricolor L.
lividus L.
melancholicus L.
sylvestris.
polygonoides L.

2. Pentandri.

chlorostachys willd. sp. flavus willd. sp.

APÉTALES.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

AMARANTES.

AMARANTE

1. 3 étamines.

blanche. Am. s. O

à feuilles étroites. Am. s. O

couchée. Italie. ①
tricolore. Inde. ② (orn.)
livide. Am. s. ②
mélancholique. Inde. ②
Blette. F. ②
sauvage. F. ②
membraneuse. Antilles. ②

2. 5 étamines.

påle. ①
jaune. ②

lætus willd. sp.
paniculatus z.
hybridus z.
retroflexus encycl.

- caudatus z.
sanguineus z.
- spinosus z. vel as perax.

CELOSIA

argentea z.
margaritacea z.
trigyna z. mant.

- cristata z.
coccinea z.
castrensis z.
paniculata z.

celosioides z. herbacea.

ACHYRANTHES argentea Encycl. fruticosa Encycl. suppl. crispa Encycl. suppl. virgata Encycl. suppl. lappacea L. atropurpurea Encycl.

GOMPHRENA

— globosa L.

interrupta L.

decumbens Jacq. H. sch.

brasiliana L.

porrigens Jacq. H. sch.

lanatum. s. veget.
javanicum s. veget.
Achyranthes alopecuroides
Encycl.

PARONYCHIA

verticillata.

illecebrum verticillatum z.

echinata Desf. Atl.

vulgaris.

illecebrum paronychia z.

capitata.

illecebrum capitatum z.

d'un vert gai, ①
paniculée. ①

hybride. F. ①.

à longs épis. pérou. ① (orn.)
couleur de sang. Antilles. ①
épineuse. Inde. ①

CÉLOSIA

argenté. inde. ①

perlé. inde. ①

à 3 styles. sénégal. ①

à crétes. Asie. ① (orn.)

écarlate. inde. ① (orn.)

aigretté. inde. ①

paniculé. Antilles. ②

faux célosia. Antilles. s. ch. 5. herbacée. s. ch. 4

argenté. sicile ⊙
arbrisseau. mde. s. ch. b
crépu. s. ch. b
à longs épis. s. ch. b
hérissé. mde- s. ch. b
étalé. pérou. s. ch. b

GOMPHRÉNA
globuleux. mde. ① (orn.)
interrompu. Antilles. s. ch. v.
couché. mexique. ①
du Brésil. s. ch. p

laineax. inde. s. ch. Z.

de Java. s. ch. Z.

PARONIC

verticillé. F. ①
hérissé. Barbarie. or. ¥
commun. F. m. or. ¼
à fleurs en tête. F. ¾

ficoidea z.
Illecebrum ficoideum z. }
tenella.
sessilis.
Illecebrum sessile z. }
Achyrantha.
Illecebrum Achyrantha z. }
frutescens.
Illecebrum frutescens l'her.
stirp.

Herniaria
suffruticosa.
illecebrum suffruticosum z. fruticosa z.
glabra z.
hirsuta z.
incana encycl.

ORDO II.

PLANTAGINEÆ.

PLANTAGO.

1. Caule folioso.

rsyllium.
arenaria willd. Enum.
cynops L.
squarrosa willd. sp.
stricta schousb. maroc.

2. Caule aphyllo.

maxima Jacq. 1c. cucullata Lamk. Ill. asiatica Lamk. Ill. cordata Lamk. Ill. major L. media L. crassa willd. sp. crispa Jacq. collect. saxatilis marsch. cauc. sibirica. lanceolata z. Lagopus L. amplexicaulis cav. rc. serraria L. vaginata vent. H. cels. Virginica L.

ficoide. Antilles. s. ch. Todélicat. s. ch. Todé

HERNIOLE

sous-arbrisseau. Esp. or. Þ ligneuse. F. m. or. Þ glabre. F. ⊙ velue. F. ⊙ blanche. Alpes. ¥

ORDRE II.

PLANTAGINÉES.

PLANTAIN.

1. Tige feuillue.

Psyllium. F. O

cynops. F. ¥
rude. Égypte. ⊙
serré. maroc. ⊙

2. Tige sans feuilles.

capuchon. sibérie. Z d'Asie. Z en cœur. Am. s. Z commun. f. Z moyen. f. Z

charnu. 4.

des rochers. caucase. La de Sibérie. La lancéolé. F. Lagopus. F. O amplexicaule. Esp. or. La de Virginie. Am. s. O

albicans L.
interrupta Encycl.
alpina L.
sphærocephala Encycl.
alpina Jacq. Hort.
microcephala Encycl.
villosa Roth. cat.
holostea Lamk. Ill.
zellardi Vahl. symb.
graminea Lamk. Ill.
hirsuta Thunb. Prodr.
tenuiflora Wald. et Kitt. Hung.
maritima L.
subulata L.
coronopus L.

LITTORELLA lacustris L.

ORDO III.

NYCTAGINE Æ.

Mirabilis

Jalapa L.

— lutea.

dichotoma L.

longiflora L.

Viscosa Fl. Per.

Mirabilis viscosa cav. 1c. }

glabrifolia ortega. Dec.

aggregata ortega. Dec.

Mirabilis aggregata cav. 1c. }

BOERHAAVIA

erecta L.

diffusa L.

hirsuta L. Mant.

scandens L.

tuberosa Lamk. Ill.

arborea Vahl. sp.

Pisonia aculeata z. fragrans. nitida.

latifolia (an generis?)

blanchâtre. F. M. Z
interrompu. Am. s. Y
des Alpes. F. Z
à tête ronde. Alpes. Y
à petite tête. orient. O

holostea. Alpes. Z
à feuilles de cramen. Z
pubescent. cap. O
à petites fleurs. Hongrie. O
maritime. F. Y
en alêne. F. m. or. Y
corne-de-cerf. F. O

LITTORELLE

des marais. F. V.

ORDRE III.

NYCTAGINÉES.

MIRABILIS

Belle-de-nuit. mexiq. ⊙ (orn.)

— jaune.

dichotome. mexique. ⊙

à longues fleurs. mexiq. or. Z

(orn.)

CALYXHYMÉNIA

visqueux. pérou. s. ch. 足 à f. glabres. n. Esp. s. ch. 足 aggloméré. n. Esp. s. ch. 足

BOERHAAVIA

à tige droite. Antilles. s. ch. L.
étalé. Antilles. s. ch. L.
velu. Antilles. s. ch. L.
grimpant. Am. m. s. ch. 5
tubéreux. Pérou. s. ch. 5
arbre. N. Esp. s. ch. 5

PISONIA

épineux. Antilles. s. ch. b odorant. Antilles. s. ch. b luisant. Antilles. s. ch. b à larges feuilles. Ant. s. ch. b

ORDO IV.

PLUMBAGINE Æ.

PLUMBAGO

europæa L. scandens L.

rosea L,

STATICE.

1. Caule ramoso.

monopetala z.

— angustifolia.
suffruticosa z.
Limonium z.
latifolia smith. s. zinn.
spathulata willd. Hort.
bellidifolia Encycl.
mucronata z. f.
graminifolia willd. sp.
tatarica z.
oleæfolia scop. Insubr.
tripteris pelile. Fl.
sinuata z.
spicata willd. sp.

2. Caule simplici, nudo, floribus capitatis.

Armeria L.
maritima willd. Enum.
fasciculata vent. H. cels.
pubescens.

ORDRE IV.

DENTELAIRES.

DENTELAIRE
d'Europe. F. W (méd.)
grimpante. Antilles. s. ch. b'
rose. inde. s. ch. b

STATICÉ.

1. Tige rameuse.

monopétale. F. m. or. H.

— à feuilles étroites.
sous-arbrisseau. sibérie. H.
Limonium. F. L.

à larges feuilles. sibérie. L.
en spatule. F. or. L.

à f. de paquerette. F. m. or. L.
crépue. Maroc. or. L.

à feuilles de Gramen. sibér. L.
de Tartarie. L. (orn.)

à f. d'olivier. Italie. or. L.

à trois ailes. Égypte. or. L.
sinuée. orient. or. L.

à épis. perse. or. L.

2. Tige simple, nue, fleurs en tête.

Gazon-d'olympe. F. &

maritime. F. & (orn.).

fasciculée. sardaigne. or. p

pubescente. or. p

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES DICOTYLEDONS

MONOPETALÆ.

(corolla hypogyna.)

ORDO I.

LYSIMACHIA.

CENTUNCULUS minimus z.

MONOPÉTALES.

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDRE I.

LYSIMACHIES.

CENTENILLE naine, F. O

ANAGALLIS	Mouron
arvensis L.	des champs. F. O
— cœrulea.	— bleu.
Monelli L.	de Monelli. Esp. 🕥
latifolia z.	à larges feuilles. Esp. O
collina schousb. maroc.	•
fruticosa vent. ch. de pl.	arbrisseau. Barbarie. or. 3
tenella s. veg.	
Lysimachia tenella Z.	rampant. F. ¥
LYSIMACHIA	7
	LYSIMACHIE
vulgaris L.	commune. F. W (med.)
Ephemerum Z.	éphémère. Esp. V
orientalis Encycl.	d'Orient. or. 7.
atropurpurea murray. Goett.	
Thyrsiflora z.	en thyrse. F. X
verticillata marsch. cauc.	verticillée. caucase. 4
punctata z.	ponctuée. F. ¥
Olliata By	ciliée. Am. s. T
nemorum L.	des bois. r. 75
nummularia L.	nummulaire. F. L
Linum-stellatum L.	Lin-étoilé. F. 🔾
HOTTONIA	$H_{OTTONIA}$
palustris z.	des marais. F. L.
	tes menters of the
Coris	Coris
monspeliensis z.	de Montpellier. F. m. or. 12
Limosella	Limoselle
aguatica z.	aquatique. F. 🔾
TRIENTALIS	TRIENTALIS
europæa z.	d'Europe. F. Alpes. W
Anna	
ARETIA	ARETIA
vitaliana s. veg.	des Alpes. F. V
Androsace	ANDROSACÉ
maxima z.	à grand calice. F. 🔾
septentrionalis z.	du Nord. Russie. O
elongata s. Veg.	à longs pédoncules. F. 🔾
lactea z.	blanc. Alpes. T
carnea L.	couleur de chair. Alpes. ¥
villosa z.	velu. Alpes. T
N .	
PRIMULA	PRIMEVÈRE
veris Z.	commune.f. \psi (orn.)
elatior willd. sp.	élevée. f. ¥
— acaulis.	— sans tige.
perreiniana Flugge. Ann.	de perrein. L' (orn.)
Auricula z.	oreille-d'ours. Alp. 7 (orn.)

marginata willd. sp.
farinosa L.
viscosa All. Ped.
integrifolia L.
villosa Jacq. Aust. suppl.
auriculata Encycl.
cortusoides willd. sp.

Cortusa matthioli z.

Soldanella alpina z.

Dodecatheon meadia L.

CYCLAMEN

europæum L.

hederæfolium H. K.

Genera Lysimachiis affinia.

Alypum L.
longifolia H. K.
salicina Encycl.
vulgaris L.
nudicaulis L.
cordifolia L.

Samolus valerandi z.

UTRICULARIA
vulgaris L.
minor smith. Fl.

Pinguicula vulgaris z.

MENYANTHES trifoliata z.

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2 aut plura non didynama.

POLYGALA.

I. Cristata.

vulgaris L.

bordée. suisse. L farineuse. Alpes. L visqueuse. Alpes. L à feuilles entières. Alpes. L velue. Alpes. L auriculée. orient. or. L à feuilles de cortusa. sibér. L

Cortusa de Matthiole. Alpes. 4

Soldanelle

des Alpes. Z

Dodécathéon méadia. Am. s. Z (orn.)

CYCLAMEN

d'Europe. F. m. V (orn.)

à f. de Lierre. Italie. V (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Lysimachies.

GLOBULAIRE
Alypum. F. m. or. h

à long. feuilles. madère. or. h

commune. F. W

à tige nue. Alpes. W

à feuilles en cœur. Alpes. Z

Samolus

mouron-d'eau. F. ①

UTRICULAIRE

commune. F. V.
grêle. F. V.

GRASSETTE commune. F. V.

Ményanthe trèfle-d'eau. г. ¥ (méd.)

ORDRE II.

PÉDICULAIRES.

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

POLYGALA.

i. Fleurs barbues.

amara L.
monspeliaca L.
austriaca crantz. Austr.
myrtifolia L.
oppositifolia L. mant.
cordifolia willd. sp.

2. Imberbes.

chamæbuxus z. Heisteria z.

VERONICA.

1. Spicata.

gentianoides vahl. sp.
virginiana L.
spuria L.
maritima L.
longifolia L.
elatior.
incana L.
spicata L.
hybrida L.
pinnata willd. sp.
incisa willd. sp.

2. Corymboso-racemosa.

officinalis L. bellidioides L. fruticulosa z. alpina L. decussata willd. sp. serpyllifolia L. Beccabunga L. Anagallis L. scutellata L. Teucrium L. prostrata.L. chamædrys L. latifolia z. melissæfolia Encycl. urticæfolia Jacq. Austr. montana L. f. multifida L. austriaca L. mitida. orientalis vahl. sp.

amer. F. Z

de Montpellier. ①

d'Autriche. F. ①

à feuilles de myrte. cap. or. 5

à feuilles opposées. cap. or. 5

à feuilles en cœur. cap. or. 5

2. Fleurs sans barbes.

à feuilles de Buis. F. 5 d'Heister. cap. or. 5

VÉRONIQUE.

1. Fleurs en épi.

à f. de gentiane. orient. L'
de Virginie. L'
à feuilles ternées. sibérie. L'
maritime. Eur. L'
à longues feuilles. suisse. L'
èlevée. L'
blanche. Russie. L'
à épis. F. L'
hybride. suède. L'
pennée. sibérie. L'
incisée. sibérie. L'

2. Grappes de fleurs en corymbe;

officinale. f. \u03c4 (méd.) à f. de Paquerette. Alpes. T' fruticuleuse. Alpes. 5 des Alpes. F. T. croisette. magellan. 5 à feuilles de serpolet. F. L Beccabunga. F. Z (méd.) Anagallis. F. (med.) à seuilles linéaires. F. K à feuill. de Germandrée. F. L couchée. F. Z chamædrys. F. Z a larges feuilles. F. ¥ à feuilles de Mélisse. T à feuilles d'ortie. F. L des montagnes. F. T découpée. sibérie. L d'Autriche. 4 luisante. ¥ d'Orient, T

3. Pedunculis unifloris.

persica.
agrestis L.
arvensis L.
hederæfolia L.
triphyllos L.
verna L.
romana L.
reregrina vahl. sp.
præcox vahl. sp.
acinifolia vahl. sp.
digitata vahl. sp.
chamæpithyoides Lamk. Ill.

SIBTHORPIA europæa z. africana z.

DISANDRA prostrata L. f.

II. Stamina 4 didynams.

Erinus alpinus L.

Manulea oppositifolia vent. malm. alternifolia.

EUPHRASIA officinalis E. odontites L.

PEDICULARIS
palustris L.
sylvatica L.

RHINANTHUS

crista-galli L.

hirsuta.

MELAMPYRUM
arvense L.
cristatum L.
pratense L.
sylvaticum L.

OROBANCHE
major smith. Fl.
caryophyllacea smith. soc. Lin.
minor smith. Fl.
ramosa L.

3. Pédoncules à une fleur

de Perse. ①
agreste. F. ②
des champs. F. ②
à feuilles de Lierre. F. ③
à trois feuilles. F. ④
printanière. F. ④
romaine. F. ④
à feuilles d'Acinos. F. ④
digitée. F. m. ⑤

SIBTHORPIA

d'Europe. F. W

d'Afrique. cap. or. W

DISANDRA couchée. madère, or. 14

II. 4. étamines didynames.

ĖRINUS

des Alpes. ¥

MANULEA à feuilles opposées. cap. or. s à feuill. altern. n. Holl. or. w

EUFRAISE

officinale. F. ① (méd.)

odontitès. F. ②

PÉDICULAIRE

des marais. F. L.

des bois. F. L.

COCRÉTE

crête-de-coq. F. O.

velu. F. O

MÉLAMPYRUM

des champs. F. O.

à crête. F. O.

des prés. F. O.

des bois. F. O.

OROBANCHE
élevée. F. ¥
odorante. F. ¥
petite. F. ¥
rameuse. F. ¥

LATHRÆA clandestina z.

ORDO III.

ACANTHE Æ.

I. Stamina 4 didynama:

BARLERIA

prionitis z.

gentianoides.

Eranthemum flavum willd.

Enum, suppl.

ACHANTHUS

mollis z.
spinosus z.
spinosissimus pers. syn.

RUELLIA

blechum ż.
strepens z.

(varians vent. H. cels.
Eranthemum pulchellum'
Andr. Rep.
ovata cav. Ic.
lactea cav. Ic.
patula Jacq. Ic.
tuberosa z.

II. Stamina 2.

JUSTICIA.

1. Fruticosæ.

Adhatoda Z.
hyssopifolia Z.
orchioides L. f.
spinosa Jacq. Amer.
paniculata Vahl. sp.
nasuta L.
bracteolata Jacq. Ic.
coccinea Smith. Pict.
pulcherrima Jacq. Ic.
formosa Willd. Enum.
lucida H. K.
cristata Jacq. H. sch.
infundibuliformis L.
Ecbolium Z.

CLANDESTINE commune. F. 76

ORDRE III.

ACANTHÉES.

I. 4 étamines didynames.

BARLERIA

prionitis. Inde. s. ch. 19

à fleurs de Gentiane. s. ch. 5

ACANTHE

Branche-ursine. Ital. I (méd.)
épineuse. Italie. I
hérissée. I

RUELLIA

Blechum. Antilles. s. ch. & élastique. Virginie. or. &

bleu. inde. s. ch. 5

ovale. mexique. s. ch. Z blanc. mexique. s. ch. Z étalé. inde. s. ch. 5 tubéreux. Antilles. s. ch. Z

II. 2 étamines.

CARMANTINE.

1. Tiges ligneuses.

Adhatoda. ceylan. or. n (orn.)
à f. d'Hysope. canar. or. n
à fleurs d'orchis. cap. or. n
épincuse. Antilles. s. ch. n
paniculée. Inde. s. ch. n
tubulée. Inde. s. ch. n
bractéolée. caracas. s. ch. n
écarlate. caïenne. s. ch. n
mouchetée. Am. m. s. ch. n
élégante. s. ch. n
luisante. s. ch. n
à crêtes. s. ch. n
infundibulijorm. Inde. s. ch. n
Ecbolium. Inde. s. ch. n

- Gendarussa I. f.
quadrifida Vahl. sp.
coccinea cav. Ic.
resupitana Vahl. sp.
sexangularis cav. Ic.
Dicliptera resupinata Juss.
Ann.
bicaliculata Vahl. sp.
ligulata cav. Ic.
Dianthera malabarica L. f.

2. Herbacea.

furcata jacq. H. sch. }
peruviana cav. ic. }
ciliaris L. f.
lithospermifolia jacq. H. sch. }
ladanoides Lamk. ill.

article Thurbugia. ORDO IV.

JASMINE Æ.

I. Fructus capsularis.

SYRINGA

vulgaris z.
persica z.
— laciniata.

FRAXINUS

excelsior.

- argentea.
- verrucosa.
- jaspidea.
- horizontalis.
- pendula.
 rotundifolia Encycl.
 lentiscifolia.
 parvifolia Encycl.
 monophylla vahl. sp.

ornus L.

pubescens Encycl.

americana L.

juglandifolia *Encycl.* sambucifolia *Encycl.*

quadrangulata mich. Fl.

platicarpa mich. Fl.

nana puham. Arb. Ed. n.

atrovirens Duham. Arb. Ed. n.

gendarussa. Inde. s. ch. 5 quadrifide. N. Esp. s. ch. 5

àsl. renversées. N. Esp. s. ch. 5

caliculée. Inde. s. ch. 5

2. Tiges herbacées.

fourchue. pérou. ¥
ciliée. ceylan. ⊙
à feuilles de Gremil. pérou. ⊙

ORDRE IV.

JASMINÉES.

I. Une capsule.

LILAS

commun. Asie. 5 (orn.)
de Perse. 5 (orn.)
— laciniė.

FRÉNE

élevé. f. h

- argenté.

-- graveleux.

- jaspé.

- horizontal.

— pleureur.

à feuilles rondes. Italie. 5

à f. de Lentisque. orient. 3

à une feuille. Am. s. 5 à fleurs. italie. 5 pubescent. Am. s. 5 d'Amérique. 5 à feuilles de Nover. Am

à feuilles de Noyer. Am. s. 5 à feuilles de sureau. Am. s. 5

quadrangulaire. Am. s. p à fruit large. Am. s. p

nain. Am. s. h

veri-sombre. am. s. 5

FONTANESIA phillyreoides Bill. Decad.

II. Fruetus baccatus.

CHIONANTHUS virginica z.

OLEA

europæa z. — buxifolia. undulata Jacq. H. sch. divaricata. capensis z. americana L. mant. excelsa vahl. symb. fragrans Thunb. Jap. emarginata Lamk. Ill.

NOTELÆA longifolia vent. ch. de pl. rigida.

PHILLYREA angustifolia z. media z. latifolia Z. - lævis.

MOGORIUM

sambac. nyctanthes sambac z. Jasminum sambac vahl. sp. he well it

JASMINUM

glaucum z. f. simplicifolium vahl. sp.

multiflorum Andr. Rep. hirsutum H. K. fruticans z. humile z. odoratissimum z. azoricum L.

mauritianum. vel Flexi 6: W. officinale z.

volubile Jacq. H. sch.

grandiflorum z.

FONTANESIA à seuilles de Filaria. Asie. 3 (orn.)

II. Une baie.

CHIONANTE de Virginie. 5 (orn.)

OLIVIER

cultivé. r. m. h (écon.) — à feuilles de buis. ondulé. cap. or. 5 étalé. or. h du Cap. or. 5 d'Amérique. or. 19 élevé. canaries. or. 19 odorant. japon. or. 5 (écon.) échancré. madagascar. s. ch. p

Notéléa à long. feuilles. N. Holl. or. h à feuill. roides. N. Holl. or. 5

FILARIA à feuilles étroites. F. m. 5 moyen. F. m. b (orn.) à larges feuilles. F. m. b (orn.) -- lisse.

MOGORI

Jasmin d'Arabie. s. ch. (orn.)

JASMIN

glauque. cap. or. 19 à seuilles simples. île des Amis, s. ch. 5

à fleurs nombreuses. s. ch. 1)

cytise. F. m. h (orn.) d'Italie. or. 5 (orn.) jonquille. madère. or. n (orn.) des Açores. or. 5 (orn.) sarmenteux. inde. s. ch. 19 (orn.) de l'île de France. s. ch. 19 officinal. inde. 5 (orn.) à grandes fleurs. inde. or. 19

LIGUSTRUM

vulgare L. japonicum Thunb. Jap. lucidum H. K.

ORDO V.

VITICE E.

I. Flores opposite corymbosis

CLERODENDRUM

viscosum vent. malm. infortunatum z.? phlomitis vahl. symb.

- Which idea. (siphonanthus H. K. siphonanthus indica z. ovieda mitis L.

VOLKAMERIA

tomentosa vent. malm. aculeata L. mermis L. angustifolia Encycl.

ligustrina Jacq. coll. japonica Jacq. H. sch. clerodendrum fragranswilld.

ÆGIPHILA

martinicensis L. mant. macrophylla (an generis?). in the draw de morens

VITEX

Agnus-castus L. - albidus. incisa Encycl.

CALLICARPA

americana L.

cana vahl. symb. tomentosa willd. Enum.

CORNUTIA

pyramidata L. Hosta cœrulea Jacq. H. sch. §

TROÉNE

commun. F. b (orn.) du Japon. or. 9 luisant. chine or. 5

ORDRE

GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLÉRODENDRUM

visqueux. inde. s. ch. > à feuilles de phlomis. inde. s. ch. 5

à longues fl. inde. s. ch. 5

VOLKAMÉRIA

cotonneux. s. ch. b épineux. Antilles. s. ch. 5 sans épines. inde. s. ch. 19 à feuilles étroit. île de France. s.ch. h à f. de troêne. île de Fr. s. ch. p

du Japon. s. ch. 5 (orn.)

be france,

EGIPHILA

de la Martinique. s. ch. 19 à grand. f. Antilles. s. ch. b

VITEX

Agnus-castus. F. m. 19 (med.) - blanc. incisé. chine. 5 (orn.) - blanc.

CALLICARPA

d'Amérique. Am. s. or. 19 blanc. inde. s. ch. b cotonneux. s. ch. 5

CORNUTIA

pyramidal, Antilles. s. ch. 5

EI. Flores racemosi in racemis alterni:

villosum willd. sp.
tomentosum Encycl. suppl. }
quadrangulare s. veg.
coriaceum.
pentandrum vent. H. cels.

Duranta

plumiëri ź.

Ellisia z.

microphylla.

trifolia L.
annua L.
involucrata L.
recta H. K.
salvifolia Jacq. H. sch. (non Lin.)
violacea.
cinerea Encycl.
nivea Vent. Malm.
suaveolens.
camara L.
aculeata L.
— flava.

Spielmannia
africana willd. sp.
Lantana africana z.

ZAPPANIA
globifera.
verbena globifera l'Her. stirp.
odoratissima scop. insubr.
nodiflora pers. syn.
verbena nodiflora L.

Priva mexicana pers. syn. (verbena mexicana L.)

1.60

angustifolia vahl. sp.
verbena indica jacq. obs.
(non lin.).
mutabilis vahl. sp.
verbena mutabilis jacq. ic.
jamaicensis vahl. sp.
verbena jamaicensis l.

II. Fleurs alternes en grappes.

Bois-Guitare

velu. Antilles. s. ch. 5

quadrangulaire. Antill. s. ch. 5

à 5 étamines. Antill. s. ch. 5

Duranta

de Plumier. Antilles. s. ch. 5
lancéolé. Antilles. s. ch. 5
à petites feuill. Antill. s. ch. 5

à feuilles ternées. Ant. s. ch. p annuel. Antilles. ①
à involucre. Autilles. s. ch. p à tige droite. Antill. s. ch. p à feuill. de sauge. cap. or. p violet. s. ch. p cendré. Antilles. s. ch. p à fleurs blanch. inde. s. ch. p odorant. s. ch. p camara. Antilles. s. ch. p épineux. Antilles. s. ch. p

Spielmanne
d'Afrique. cap. or. 5

ZAPPANIA
globuleux. Antilles. s. ch. 19

nodistore. F. m. or. Z

P_{RIVA}

du Mexique, s. ch. 75

STACHYTARPHETA

à feuilles étroites. Am. m. ①

changeant. chili. s. ch. 5

de la Jamaïque. s. ch. 5

5

VERBENA triphylla l'Her. stirp. multifida Fl. Per. erinoides Lamk. Ill. Aubletia L. f. urticæfolia L. carolina L. stricta vent. H. cels. rigens mich. Fl. paniculata Lamk. Ill. diffusa. hastata L. bonariensis L. bracteosa mich. Fl. officinalis L. supina L. SELAGO corymbosa L.

ORDO VI.

LABIATÆ.

. I. Stamina 2 fertilia.

Lycopus

europæus L.

exaltatus L. f.

HEBENSTRETIA

dentatá L.

AMETHYSTEA coerulea L.

ZIZIPHORA

capitata L.

tenuior L.

cunila.

cunila capitata L. f. }

pulegioides

cunila pulegioides L. }

mariana.

cunila mariana s. veg.

Monarda
fistulosa L.
didyma L.
violacea.
clinopodia L.?
punctata s. veg.

Nerveine
à trois f. chili. or. 5 (orn.)

laciniée. Pérou. ①

à bouquets. caroline. or. of
à feuilles d'ortie. Am. s. It
de Caroline. It
fasciculée. Am. s. It
paniculée. Am. s. It
étalée. or. 5
hastée. Am. s. It
de Buénos-Ayres. or. of
à longues bractées. Am. s. ②
officinale. F. It (méd.)
couchée. F. ②

Sélago

Corymbifère. cap. or. 5

HÉBENSTRETIA

denté. cap. or. 8

ORDRE VI.

LABIÉES.

1. 2 étamines fertiles.

Lycopus
d'Europe. F. Z
pinnatifide. italie. Y

AMÉTHYSTÉA hleu. sibérie. Q

Ziziphora
à fleurs en tête. orient. Or
lancéolé. orient. O
cunila. sibérie.

de Virginie. Am. s. ¥

Monarda fistuleux. Am. s. 译 (orn.) écarlate. Am. s. 译 (orn.) violet. Am. s. 译 ponctué. Am. s. ၾ WESTERINGIA rosmarinifolia Andr. Rep.

ROSMARINUS - officinalis L.

SALVIA.

1. Fruticosa.

pomifera L. officinalis L. - tricolor. - variegata. tenuior. grandiflora vahl. sp. cretica L. sypilea Lamk. Ill. triloba L. f.? africana L. paniculata L. Mant. chamædryoides cav. 1c. aurea L. interrupta schousb. mar. canariensis L. mexicana L. formosa l'Her. stirp. leonuroides vahl. sp. s polystachya cav. 1c. melissæfolia. scorodoniæfolia. lamiifolia Jacq. H. sch. leucantha cav. 1c. fætida Desf. Atl. tingitana willd. sp. } coccinea L. f. pseudo-coccinea sacq. 1c. disermas L.

2. Caule herbacco.

pulchella Dec. cat. pinnata L. azurea vahl. sp. acuminata vent. H. cels. angustifolia mich. Fl. reptans Jacq. H. sch. angustifolia cav. 1c. s scabiosæfolia Lamk., Journ. d'Hist. nat. habliziana willd. sp.

WESTERINGIA à f. de Romarin. N. Holl. or. h ROMARIN officinal. F. 5 (méd. orn.) SAUGE.

1. Tiges ligneuses.

pomifère. crète. or. 19 officinale. F. m. b — de trois couleurs. - panachée. de Catalogne. F. m. 5 à grandes fleurs. orient. 3 de Crete. 5 du mont sypile. or. 5 d'Afrique. cap. or. 19 paniculée, cap. or. 5 chamædrys. mexique. or. 19 dorée. cap. or. 5 interrompue. maroc. or. y des Canaries. or. 19 du Mexique. or. 5 écarlate. pérou. s. ch. 9 à plusieurs épis. mexiq. or. 9 à seuilles de mélisse. or. 5 à feuill. de scorodonia.or. 5 à feuilles de Lamium. or. 5 à fleurs blanch. Mexiq. or. h fétide. Alger. or. 5

rouge. Floride. or. 5 fausse écarlate. Ant. s. ch. 19 disermas. syrie. or. 5

2. Tige herbacée.

élégante. or. Z pennée. orient. or. T

azurée. caroline. or. 14

rampante. N. Esp. s. ch. 4

à f. de scabieuse. orient. or. *

glutinosa L. amarissima rahl. sp.) circinata cav. 1c. pratensis L. sclarea L. patula Desf. Atl. præcox. spinosa Jacq. Ic. Æthiopis L. austriaca Jacq. Austr. argentea L. phlomoides vahl. sp. indica L. bicolor pesf. Atl. crassifolia Jacq. Frag.) ceratophylla L. ceratophylloides L. Mant. runcinata L. f. clandestina Encycl. (non L.) erosa. sylvestris L. nemorosa L. virgata Jacq. Hort. gigantea. nubia vahl. sp. nilotica L. f. viscosa Jacq. Ic. verticillata L. napifolia Jacq. Hort. ægyptiaca L. Horminum L. - rubens. viridis L. nepetifolia. lanceolata. verbenaca L. micrantha. serotina L. Mant. dominica L. hispanica L. tiliæfolia vahl. sp. nutans L.? pendula. nutans wald. et Kitt. Hung.

Collinsonia canadensis L.

gluante. Alpes. W amère. Mexique. or. V des prés. F. Z (méd.) sclarée. F. o (méd.) étalée. Barbarie. or. or. précoce. orient. () cotonneuse. orient. o d'Autriche. V argentée. orient. or. o phlomoide. Esp. or. 4 des Indes. W bicolore. Alger. Z (orn.) corne-de-cerf. syrie. or. & laciniée. sicile. or. o pinnatifide. cap. or. 4, clandestine. Italie. o rongée. O sauvage. Allem. T des bois. Autriche. T effilée. orient. Z gigantesque. 8 de Nubie. O du Nil. 🕥 visqueuse. Italie. T verticillée. F. m. Z à seuilles de Navet. F. 18 d'Egypte. or. u ormin. F. m. 🔾 -rouge. verte. Barbarie. 🕥 à feuilles de cataire. O lancéolée. (•) verveine. F. 3 à petites fleurs. 8 tardive. orient. o des Antilles. s. ch. T d'Espagne. 🔾 à seuilles de Tilleul. Pérou. O

Collinsonia de Canada. V

penchée. Russie. T

pendante. Russie. 4

II. Stamina 4 didynama, labium superius II. 4 étamines didynames, lèvre supérieure nullum aut brevissimum.

AJUGA

orientalis L. genevensis L. pyramidalis L. reptans L.

TEUCRIUM

canariense Encycl. heterophyllum willd. sp. J fruticans L. rosmarinifolium Encycl. betonicum l'неr. stirp. canescens Forst. Goett. maderiense Encycl. abutiloides l'Her. stirp. campanulatum L. orientale L. resupinatum Desf. Atl. chamæpitys L. pseudo-chamæpitys L. Laxmanni s. veg. votrys z. cubense L. Mant. flavum L. lucidum L. chamædrys L. - major. myrtiflorum. marum L. multifolium L. canadense L. hyrcanicum L. massiliense L. asiaticum L. Mant. scorodonia L. scordium L. montanum L. pyrenaicum L. aureum schreb. vert. flavicans Encycl. polium L. capitatum L. spinosum L.

nulle ou presque nulle.

Bugle

d'Orient. or. W de Genève. F. Y pyramidale. F. 4 rampante. F. T.

GERMANDRÉE

des Canaries. or. 19 arbrisseau. F. m. or. 19 à f. de Romarin. orient. or. 19

à f. de Bétoine. canar. or. 19

à f. d'Abutilon. canar. or. 19 campanulée. orient. Z d'Orient. or. Z renversée. Alger. or. Z chamæpitys. F. O (méd.) faux chamæpitys. Barb. or. 74 Ivetie. F. m. or (med.) de Laxmann. sibérie. & Botrys. F. (méd.) de Cuba. s. ch. T jaune. Esp. 5 luisante. F. m. 1) chamædrys. F. 5 (méd.) - élevée. à feuill. de myrte. orient. or. 19 marum. Esp. or. 5 (méd.) à fleurs nombr. Esp. or. 19 de Canada. Z d'Hyrcanie. Z de Marseille. or. b d'Asie. or. b des bois. F. & (méd.) scordium. f. 4 (méd.) de montagne. F. m. or. 5 des Pyrénées. F. 4

jaunatre. f. m. or. h

Polium. F. m. or. b à fleurs en tête. Esp. or. 9 épineuse. Esp. ?

III. Stamina 4 didynama, corolla

SATUREIA

græca L.
juliana L.
capitata L.
Thymbra L.
montana L.
hortensis L.

HYSSOPUS

officinalis L.

— myrtifolius.

angustifolius marsch. cauc.

Lophanthus L.

nepetoides L.

scrophulariæfolius willd. sp.

ocimifolius Encycl.

mentha Patrini Pallas.n. Act.

petr.

mentha ovata cav. Ic.

Elsholtzia cristata willd. En.

NEPETA

cataria L. pannonica L. marrubioides willd. Enum. incana willd. sp. nepetella L. amethystina. longiflora vent. H. cels. nuda L. -alba. violacea L. crispa willd. sp. italica L. reticulata pesf. Atl. tuberosa L. bipinnata cav. ic. botryoides willd. sp. multifida L. f. (non L. sp.) multifida L. lavendulacea L. f.

PERILLA

ocimoides s. veg.

LAVANDULA spica L. latifolia.

III. 4 étamines didynames, corolle à deux lèvres.

SARRIETTE

de Grèce. or. Z à feuill. linéair. orient. or. Z à fleurs en tête. orient. or. 3 Thymbra. orient. or. 3 de montagne. F. 3 des jardins. F. (écon. méd.)

HYSOPE

officinal. F. H (méd.)

— à feuilles de myrte.

à feuilles étroites. Ibérie. H

à fl. renversées. chine. or. E

à feuill. de cataire. Am. s. E

à f. de scrophulaire. canad. E

à grandes bractées. sibér. O

CATAIRE

Herbe-aux-chats. F. Z (méd.)
paniculée. Hongrie. Z
à feuilles de Marrube. Z
blanche. orient. Z
à feuilles étroites. F. Z
améthyste. Z
à longues fleurs. orient. or. Z
nue. suisse. Z
— à fleurs blanches.
violette. Esp. Z
crépue. orient. or. Z
d'Italie. Z
réticulée. Barbarie. Z
tubéreuse. Esp. Z

bipennée. sibérie. O

laciniée. Russie. Z

PÉRILLA

à feuill. de Basilic. inde. O

LAVANDE

spic. F. m. 5 (orn. méd.)
à larges feuilles. or. 5

stæchas L.
heterophylla.
dentata L.
multifida L.
pinnata willd. sp.
elegans.
abrotanoides willd. sp.

SIDERITIS.

1. Ebracteata.

cretica L.
candicans willd. sp.
canariensis L.
montana L.
romana L.
nigricans Encycl.
elegans willd. sp.

2. Bracteata bracteis integris.

syriaca L. perfoliata L.

3. Bracteata bracteis dentatis.

hirsuta L. (exclus. syn. Bauhini.) fætida. scordioides L. hyssopifolia L. incana L.

Bistropogon canariense l'her. sert. punctatum l'her. sert.

MENTHA.

1. Spicata.

lavandulæfolia. sylvestris L. viridis L. rotundifolia L. crispa L. piperita L.

2. Capitatæ.

aquatica z. citrata willd. sp.

stéchas. F. m. or. h (méd.) à feuilles variables. or. h dentée. esp. or. h découpée. Barbarie. O pennée. Madère. or. h élégante. canaries. or. h

SIDÉRITIS.

1. Fleurs sans bractées.

de Crète. or. 5 blanchâtre. madère. or. 5 des Canaries. or. 5 des montagnes. F. O de Rome. F. m. O

noirâtre. ()

2. Fleurs accompagnées de bractées entières.

de Syrie. or. 5
perfolié. orient. or. 7

3. Bractées dentées.

velu. F. 5

fétide. Esp. 19
à feuilles de scordium. F. Z.
à feuilles d'Hysope. F. 19
blanc. Esp. or. 5

Bistropogon

des Canaries. or. 5

ponctué. canaries. or. 5

MENTHE.

1. Fleurs en épis.

à feuilles de Lavande. or. Z sauvage. F. ¥ (méd.) verte. F. ¥ ronde. F. ¥ crépue. F. Z poivrée. Angleterre. ¥ (méd.)

2. Fleurs en tête.

aquatique. F. L' citronnelle. Europe. Z

3. Verticillatæ.

sativa L.
gentilis L.
arvensis L.
pulegium L.
cervina L.

Нуртіѕ

capitata sacq. 1c.

GLECOMA

hederacea L. hirsuta wald. et kitt. Hung.?

LAMIUM

orvala L.
hirsutum Encycl.
maculatum L.
garganicum L.
purpureum L.
amplexicaule L.
album L.

molle H. K.

GALEOPSIS

retrahit z.

Ladanum z.

villosa smith. Fl.

grandiflora willd. sp.

versicolor smith. Fl.

GALEOBDOLON

luteum smith. Fl.
Leonurus Galeobdolon willd.
sp.
Galeopsis Galeobdolon L.

BETONICA .

officinalis L.
hirsuta L. Mant.
orientalis L.
grandiflora willd. sp.
alopecuros L.

STACHYS

sylvatica L.
palustris L.
coccinea Jacq. H. sch.
lanata Jacq. Ic.
germanica L.
intermedia Willd. sp.

history to inte

3. Fleurs verticillées.

cultivée. Eur. & (méd.)

purpurine. Eur. & (méd.)

des champs. F. & (méd.)

pouliot. F. & (méd.)

fétide. F. &

HYPTIS

à seurs en tête. Antill.s.ch. Z

GLÉCOMA

Lierre terrestre. F. 华 (méd.) velu. F. 龙

LAMIUM

orvale. Italie. W
velu. F. W
maculé. F. W
à feuilles de cataire. Italie. W
pourpre. F. ①
amplexicaule. F. ①
blanc. F. Z (méd.)
à feuilles entières. W

GALEOPSIS

Tétrahit. F. ①
Ladanum. F. ①
velu. F. ①

à grandes fleurs. F. O

GALEOBDOLON

à fleurs jaunes. F. Y

BÉTOINE

officinale. F. L (méd.)
velue. F. L
d'Orient. L
à grandes fleurs. orient. L
jaune. Alpes. L

STACHYS:

des bois. F. Z
des marais. F. Z
écarlate. Mexique. or. Z
laineux. sibérie. Z
cotonneux. F. Z
intermédiaire. Z

.

scordioides.

palestina L.

alpina L.

circinata l'Her. stirp.

nepetifolia.

hirta L.

glutinosa L.

mollissima Willd. Enum.

arvensis L.

recta L. Mant.

purpurea.

annua L.

maritima L. Mant.

BALLOTA lanata z.

nigra L.

MARRUBIUM.

1. Calicibus quinquedentatis.

Alysson L.

peregrinum L.

candidissimum L.

supinum L.

rugosum.

astracanicum Marsch. cauc.

2. Calicibus decemdentatis.

vulgare L.
crispum L.
pseudo-pictamnus L.
hispanicum Encycl. (non L.)

LEONURUS

marrubiastrum. L.
sibiricus L.
cardiaca L. VA officinalis.
crispus L.
villosus.
tataricus L.

PHLOMIS

fruticosa L.

— angustifolia.

— latifolia.

italica smith. spicil.

purpurea smith. spicil.

lychnitis L.

laciniata L.

à f. de scordium. Maroc. or. Le de Palestine. or. 5
des Alpes. Le à feuilles rondes. Barb. or. Le velu. F. Le gluant. crète. or. Le velouté. Le des champs. F. O crapaudine. F. Le pourpre. or. Le annuel. F. O maritime. Le

BALLOTE
laineux. sibérie. Z
noir. f. Z

MARRUBE.

1. Calices à 5 dents.

Alysson. esp. or. The étranger. orient. The très-blanc. orient. The couché. F. m. or. The ridé. or. The d'Astracan. The

2. Calices à 10 dents.

commun. F. ¥ (méd.)
crépu. Italie. or. 5
faux dictame. crète. or. 5
d'Espagne. Z

CARDIAQUE à petites fleurs. Allem. o de Sibérie. o officinale. F. \$\psi\$ (méd.) crépue. sibérie. \$\psi\$

velue. ¥ de Tartarie. ♂

PHLOMIS

arbrisseau. sicile. 5 (orn.)

— à feuilles étroites.

— à larges feuilles.

d'Italie. or. 5

pourpre. Esp. or. 5

à feuill. de sauge. F. m. or. 5

lacinié. syrie. ¥

merba-venti L. violet. F. m. V tuberosa z. tubéreux. sibérie. 4 (orn.) Leonurus L. Léonurus. cap. or. b (orn.) nepetifolia L. f. à feuilles de cataire. mde. O zeylanica z. de Ceylan. 🔾 caribæa Jacq. 1c. des Antilles. () martinicensis willd. sp. \ MOLUCELLA MOLUCELLE lævis z. lisse. syrie. () épineuse. syrie. O spinosa Z. CLINOPODIUM CLINOPODIUM commun. f. 4 vulgare z. blanc. Am. s. V incanum z. ORIGANUM ORIGAN pictame. crète. or. 1 (orn.) Dictamnus L. commun. f. 14 (méd). vulgare L. humile. nain. V pâle. orient. T pallidum. de Smyrne. orient. or. Z smyrneum z. à coquilles. orient. or. 19 (orn.) ægyptiacum L. majoranoides willd. sp. marjolaine. orient. or. b THYMUS T_{HYM} serpolet. F. Z (med.) serpyllum z. - villosum. - velu. - citronnelle. — citratum. Piperella s. veg. piperelle. esp. or. h commun. esp 5 (orn. méd.) vulgaris Z. — à larges feuilles. - latifolius. majoranæfolius. à seuilles de marjolaine. 5 filiforme. mahon. or. 19 filiformis willd. sp. zygis z. zygis. Esp. or. h hispanicus. d'Espagne. or. 19 mastichina L. mastichine. Esp. or. b des Alpes. W alpinus z. de Padoue. or. o patavinus Jacq. obs. Acinos. F. 🔾 Acinos z. virginicus s. veg. de Virginie. T Brachystemum virginicum Mich. Fl. THYMBRA THYMBRA

spicata Z.

hirsuta.

officinalis I.

grandiflora z.

MELISSA

à épis. orient.or. 5

officinale. F. W (écon. méd.)

à grandes fleurs. Alpes. To

MÉLISSE

velue. L

nepeta L. calamintha L. cretica L.

Dracocephalum virginianum L.

canariense z.
peregrinum z.
austriacum z.
austriacum z.
sibiricum z.
moldavica z.
canescens z.
peltatum z.
nutans z.
thymiflorum z.

Melittis melissophyllum L.

Horminum

pyrenaicum L.

melissa pyrenaica willd. sp.

virginicum L.

caulescens ortega. pec.

Lepechinia spicata willd.

Enum.

fruticosus l'Her. stirp.

Germanea urticæfolia Encycl. }

punctatus l'Her. stirp.

ocimum punctatum L. f.

parviflorus Willd. Enum.

gratissimum z.

zeylanicum.

micranthum willd. Enum.

tenuiflorum z.

Basilicum z.

fimbriatum.

bullatum.

minimum z.

fruticosa.
lupulina z.
alpina z.
lateriflora z.

népéta. F. Ψ calament. F. Z de Crète. or. Ψ

DRACOCEPHALUM

de Virginie, ou cataleptique.

\$\mathbb{L}\$ (orn.)

des Canaries. or. \$\mathbb{D}\$

découpé. sibérie. \$\mathbb{L}\$

d'Autriche. \$\mathbb{L}\$

à feuilles linéaires. sibérie. \$\mathbb{L}\$

de Sibérie. \$\mathbb{L}\$

moldavique. sibérie. \$\mathbb{O}\$

blanc. orient. \$\mathbb{O}\$

en bouclier. orient. \$\mathbb{O}\$

à fleurs penchées. sibérie. \$\mathbb{O}\$

à fleurs de Thym. sibérie. \$\mathbb{O}\$

Mélittis à feuilles de mélisse. F. L

ORMIN

des Pyrénées. To de Virginie. To jaune. Mexique. or. To

arbrisseau. cap. or. 19

à petites fleurs. Pérou. s. ch. 5

suave. Inde. s. ch. 5
de Ceylan. s. ch. 5
à fleurs menues. ①
à petites fleurs. Inde. ①
cultivé. Inde. ② (orn.)
— lacinié.
— bulleux.
nain. ceylan. ①

Scutellaire
arbrisseau. perse. or. 5
jaune-pâle. sibérie. 4
des Alpes. 4
à grappes. Am. s. 4

galericulata L.
minor L.
integrifolia L.
peregrina L.
altissima L.
albida L. mant.

PRUNELLA

vulgaris L.
grandiflora willd. sp.
laciniata L.
hyssopifolia L.
ovata.

CLEONIA lusitanica L.

Prasium majus L. minus L.

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

BUDLEIA

globosa Lamk. 1ll. salvifolia willd. sp. salicifolia Jacq. H. sch.

SCOPARIA dulcis. L.

Capraria biflora L. lucida willd. sp.

HALLERIA lucida L.

Scrophularia
nodosa L.
aquatica L.
betonicifolia L. Mant.
auriculata L.
altaica Willd. sp.
scorodonia L.
scopolii pers. syn.
sambucifolia L.
mellifera Vahl. symb.

leuxia v inchatar

roque. f. L'
petite. f. L'
à feuilles entières. Am. s. L'
ètrangère. Italie. L'
élevée. orient. L'
blanche. orient. L'

BRUNELLE

commune. F. Z à grandes fleurs. F. Y (orn.) laciniée. F. Z à feuilles d'Hysope. F. m. Z à feuilles ovales. Am. s. Y

Cléonia de Portugal. O

PRASIUM

arbrisseau. F. m. or. 5

herbacé, Italie. or. ¥

ORDRE VII.

SCROPHULAIRES.

I. 4 étamines didynames.

à globules. chili. 5
à feuill. de sauge. cap. or. 5
à feuill. de saule. cap. or. 5

Scoparia doux. Antilles. O

à deux fleurs. Ant. s. ch. 5 à feuilles luisantes, cap. or. To

HALLÉRIA luisant. cap. or. 19

des bois. F. & (méd.)
aquatique. F. & (méd.)
à f. de Bétoine. Portug. or. &
auriculée. Barbarie. or. &
de Sibérie. &
scorodonia. Barbarie. or. &
de Scopoli. carniole. &
à f. de sureau. Portug. or. &
mellifère. Barbarie. or. &

trifoliata L.
appendiculata Jacq. H. sch.
orientalis L.
vernalis L.
peregrina L.
glabrata Jacq. H. sch.
lucida L.
chrysanthemifolia willd. H. Ber.
verbenæfolia.

Dodartia orientalis L.

LINARIA (Antirrhinum z.).

1. Foliis angulatis.

cymbalaria willd. Enum.
pilosa willd. Enum.
Elatine L.
spuria L.
cirrhosa willd. Enum.
ægyptiaca L.

2. Foliis inferioribus oppositis.

triphylla willd. Enum. triornithophora willd. Enum. purpurea willd. Enum. bipartita willd. Enum. versicolor willd. Enum. repens willd. Enum. marginata Desf. Atl. supina willd. Enum. arvensis L. simplex willd. Enum. pelisseriana L. multicaulis L. Juncea Encycl. Antirrhinum sparteum cav. 10 } alpina willd. Enum. elegans. origanifolia willd. Enum. minor willd. Enum. littoralis willd. Enum. pubescens.

3. Foliis alternis.

hirta L.
genistifolia willd. Enum.
vulgaris willd. Enum.
chalepensis willd. Enum.
canadensis L.

à trois folioles. Barbar. or. To d'Orient. Ze printanière. F. & étrangère. Italie. or. Ze glabre. canaries. or. & luisante. orient. or. Ze à feuill, de chrysanthême. F. Ze à feuilles de verveine. Ze

Dodartia
d'Orient. W

LINAIRE.

1. Feuilles anguleuses.

cymbalaire. f. \(\pi\) (méd.)
velue. Alpes. \(\pi\)
Élatiné. f. \(\O\)
velvote. f. \(\O\)
à vrilles. \(\mathrev{E}\)
d'Egypte. \(\O\)

2. Feuilles inférieures opposées.

à feuilles ternées. Tunis. ①
à grand. fleurs. Portugal. ②
pourpre. F. Z
à fleurs d'orchis. Maroc. ②
bigarrée. F. ②
rampante. F. ②
membraneuse. Barbarie. or. Z
couchée. F. ②
des champs. F. ②
à tiges simples. F. ③
de Pelissier. F. ③
paniculée. orient. ④

jonciforme. Esp. ①

des Alpes. A
élégante. Esp. ①
à feuilles d'origan. F. m. ①
petite. F. ①
des rivages. Autriche. ①
pubescente. ①

3. Feuilles alternes.

velue. Esp. ①
à feuilles de Genêt. suisse. Z
commune. F. ¥
à long éperon. F. ①
de Canada. ②

ANTIRRHINUM

majus L.
orontium L.
angustifolium Encycl. suppl.
molle L.
semnervirens Laneur Bur

sempervirens Lapeyr. Pyr. Asarina L.

ANARRHINUM

bellidifolium.

Antirrhinum bellidifolium z.

NEMESIA

fætens vent. malm.
chamædryfolia vent. malm.
Antirrhinum macrocarpum,
vahl. symb.

HORNEMANNIA bicolor willd. Enum.

DIGITALIS

canariensis L.

purpurea L.

minor L. Mant.

ambigua L. f.

lutea L.

aurea.

ferruginea L.

parviflora Jacq. Hort.

orientalis Encycl.

obscura L. Mant.

USTERIA

scandens cav. 1c.

maurandia semperflorens

jacq. H. sch.

. II. Stamina 2.

CALCEOLARIA pinnata L. Mant.

III. Genera scrophulariis affinia, oppositifolia.

COLUMNEA

erecta Encycl.

cyrilla pulchella l'Her. stirp.

Buchnera coccinea scop. Ins.

Gesneria coccinea swartz. Pr.

Achymenes coccinea Pers. Syn.

Trevirana coccinea willd. En.

hirsuta swartz. Prodr.?

MUFLIER

des jardins. F. & (orn.)
tête-de-mort. F. ()
à feuilles étroites. or. 5
velouté. Esp. or. 5
toujours vert. F. m. or. 5
Asarine. F. 72

ANARRHINUM

à feuilles de paquerette. F. o

Némésia fétide. cap. or. 5

à f. de chamædrys. cap. or. 7

Hornemannia bicolore. cap. or. o

bicolore. cap. or. or

DIGITALE

des Canaries. or. 5 (orn.)

pourprée. F. of (méd. orn.)

petite. Esp. or. E
ambiguë. F. E
jaune. F. E
dorée. E
rouillée. Italie. E
à petites fleurs. &
d'Orient. E
à feuilles étroites. Esp. or. 9:

USTÉRIA

sarmenteux. mexique. or. W

II. 2 étamines.

CALCÉOLAIRE pennée. Pérou. O

III. Genres qui ont de l'affinité avec le scrophulaires, feuilles opposées.

COLUMNÉA

écarlate. Antill. s. ch. Z (orn.)

velu. antilles. s. ch. h

GRATIOLA officinalis z.

Mimulus
ringens L.
glutinosus willd. sp.
aurantiacus Bot. Mag. {
guttatus Dec. cat.
luteus Bot. Mag. (non L.)}

Lindernia pyxidaria *e. mant*.

Browallia elata *L.* demissa *L*.

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

Celsia
orientalis *L.*Arcturus *s. veg.*cretica *L. f.*heterophylla *pers. syn.*

Hemiromus
fruticosus l'her. mss.
celsia linearis jacq. ic.
нетішетіs coccinea willd, sp. surticæfolia.
celsia urticæfolia вот. мад.
нетішетіs urticæfolia willd.

Thapsus L.
thapsoides L.
elongatum willd. Enum.
phlomoides L.
Lychnitis L.
— album.
nigrum L.
rugulosum willd. Enum.
floccosum willd. Enum.
pulverulentum smith. Fl.
pyramidatum Marsch. cauc.
sinuatum L.

ORATIOLE
officinale. F. Z (méd.)
MIMULUS
à deux lèvres. Am. s. Z

à deux lèvres. Am. s. Z glutineux. s. ch. b tacheté. pérou. s. ch. ¥

LINDERNIA

Pyxidaire. F. ①

Brow Alli A à tige droite. Pérou. ① à tige tombante. Am. m. ②

ORDRE VIII.

SOLANÉES.

h: 3

I. Une capsule.

Celsia
d'Orient. ①
arcturus. orient. or. &
de Crète. or. &
à feuilles variables. or. &

HÉMITOMUS

arbrisseau. pérou. s. ch. 3

à feuilles d'ortie. pérou. or. 5

MOLÉNE

commune. F. & (méd.)
thapsoïde. F. &
à longue grappe. &
phlomoïde. F. &
cunéiforme. F. &
— à fleurs blanches.
noire. F. &
ridée. &
floconneuse. Hongrie. &
pulvérulente. F. &
pyramidale. caucas. &
sinuée. F. &

phœniceum z.

Blattaria z.

— alba.

blattarioides Encycl.

spinosum z.

RAMONDA

pyrenaica Pers. syn.

verbascum myconi z

verbascum myconi z. }

niger. z.
pallidus willd. Enum.
reticulatus z.
albus z.
betæfolius Encycl.
patora Forsk. Fl.
muticus z. mant.
aureus z.
pusillus z.
physalodes z.
scopolia z. mant.
scopolia carniolica jacq. obs.

NICOTIANA

— Tabacum z.
fruticosa z.?
glutinosa z.
rustica z.

paniculata L.
plumbaginifolia willd. Enum.
crispa.
undulata vent. malm.

DATURA

stramonium L.
ferox L.
Tatula L.
fastuosa L.
Metel L.
humilis.
ceratocaula Jacq. H. sch.
lævis L. f.
arborea.
suayeolens Willd. Enum.

II. Fructus baccatus.

TRIGUERA ambrosiaca cav. piss.

bleue. carniole. &

Blattaire. F. &

- à fleurs blanches.

fausse Blattaire. &

épineuse. orient. or. 5

RAMONDA

des Pyrénées. T

Jusquiame
noire. f. & (vénén.)
pâle. Hongrie. ①
à réseau. orient. &
blanche. f. m. ①

à feuill. de Bette. Égypte. or. of

jaune. orient. or. Z grêle. orient. ① faux coqueret. sibérie. Z scopolia. Italie. Z

NICOTIANE

Tabac. Am. m. (écon. méd.)
arbrisseau. chine. or. 5
gluante. pérou. (or. 5)
rustique. Am. m. (or. 6)
méd.)
paniculée. pérou. (orépue. pérou. (orépue. pérou. (or. 6)
ondée. N. Holl. or. or

DATURA

épineux. F. (vénén.)
à grosses épin. chine. (vén.)
Tatula. Asie. (vénén.)
violet. Égypte. (vénén.)
Métel. Asie. (vénén.)
nain. (vénén.)
cornu. cuba. (vénén.)
à fruit lisse. Abyssin. (vénén.)
en arbre. Pérou. s. ch. (vénén.)

II. Une baie.

Triguéra odorant. portugal. O

Solandra grandiflora swartz. prodr. datura sarmentosa encycl.

ATROPA

mandragora L.

Belladona L,

solanacea L. Mant.

arborescens L.

cestrum campanulatum Enc.

frutescens L.

procumbens cav. Ic.

NICANDRA
- { physalodes.
Atropa physalodes L. }

PHYSALIS.

1. Perennes.

somnifera L.
arborescens L.
aristata H. K.
incana.
chenopodiifolia zamk. ill.
curassavica L.
pensylvanica L.
Alkekengi L.

2. Annua.

barbadensis L.
prostrata l'Her. stirp.
angulata L.
pubescens L.
fœtens.
philadelphica Lamk. 1ll.

SARACHA umbellata pec. cat.

esculentum punal. sol.
solanum Lycopersicum L.
cerasiforme punal. sol.
solanum pseudo - Lycopersicum jacq. hort.
Humboldtii.
solanum humboldtii willd.
H. Ber.
peruvianum punal. sol.
solanum peruvianum L.

SOLANDRA

à grandes fleurs. Ant. s. ch. 5

ATROPA

mandragore. F. 华 (méd. vén.)
Belladone. F. 华 (vénén.)
à f. de solanum. cap. or. 为
en arbre. inde. s. ch. 为
arbrisseau. Esp. or. 为
couché. mexique. ①

Nicandra du Pérou. ⊙

COQUERET.

1. Vivaces.

somnifère. Esp. or. 5
arbre. Antilles. s. ch. 5
barbu. canaries. or. 5
incane pérou. s. ch. 5
de Curação s. ch. 4
de Pensylvanie. 4
Alkékenge. F. 4 (méd.)

2. Annuelles.

de la Barbade. ①
couché. pérou. ①
anguleux. inde. ①
pubescent. inde. ①
fétîde. N. Esp. ①
à gros fruit. Am. s. ②

SARACHA
ombellifère. ①

TOMATE

cultivée. Am. m. O (écon.)

cerise. pérou. O

de Humboldt. am. m. O

du Pérou. s. ch. Z

1. Inermia.

triquetrum cav. 1c.
crassifolium Lamk. 1ll.
quercifolium L.
radicans L.
corymbosum Jacq. 1c.
nigrum L. V. A.
villosum Lamk. 1ll.
miniatum Dunal. sol.
suffruticosum Dunal. sol.
guineense Dunal. sol.
nodiflorum Jacq. 1c.
tuberosum L. "

reclinatum l'Her. stirp.)
pinnatifidum Lamk. Ill. }
laciniatum H. K.
macrocarpon L.
æthiopicum L.
zucchagnianum Dunal. sol.
diphyllum L.
pseudo-capsicum L.

aggregatum Jacq. 1c.
muricatum H. K.
scabrum Lamk. 1ll.
variegatum Fl. Per.
pubigerum Dunal. sol.
lanceolatum cav. 1c.
macrophyllum Dunal. sol.
grandiflorum Desf. Arbr.
verbascifolium L.
auriculatum Lamk. 1ll.
bonariense L.
betaceum cav. 1c.

2. Aculeata.

- esculentum Dunal. sol.
ovigerum Dunal. sol.
fuscatum L.
mammosum L.
ciliatum Lamk. Ill.
aculeatissimum Jacq. Ic.
coagulans Vahl. symb.
decurrens Balbis. H. Taur.
Balbisii Dunal. sol.

SOLANUM.

1. Point d'aiguillons.

Douce-amère. F. 5 (méd.)

triangulaire. N. Esp. s. ch. 5

à feuilles épaisses. cap. or. 5

à feuill. de chêne. pérou. or. 7

rampant. pérou. or. 7

corymbifère. pérou. or. 7

à fruit noir. F. ① (méd.)

velu. F. ②

à fruit rouge. F. ②

sous-arbrisseau. Barbarie? 7

de Guinée. ②

nodiflore. île de Fr. s. ch. 5

pomme - de - terre. pérou. 7

(alim.)

recliné. Pérou. s. ch. & lacinié. N. zél. or. 5
à gros fruit. Pérou. s. ch. L
d'Ethiopie. O
de Zucchagni. s. ch. 5
à deux feuill. Am. m. s. ch. 5
Faux-Piment. Madère. or. 5
(orn.)
aggloméré. Guinée. s. ch. 5

rude. rérou. s. ch. ¥

pubescent. s. ch. 5 lancéolé. mexique. s. ch. 5 à larges feuill. mexiq. s. ch. b à f. de molène. Antill. s. ch. 5 auriculé. île de Fr. s. ch. > à bouquets. or. 1) (orn.) à f. de Bette. pérou. s. ch. 5 2. Tiges garnies d'aiguillons. melongêne. (alim.) ovifère. O brun. Am. m. O pomme-de-teton. Antilles. 1. cilié. 🕥 très-épineux. Am. m. s.ch. b coagulant. Égypte. s.ch. 9 décurrent. île de Fr. s. ch. 5

fontanesianum Encycl. suppl.
sodomæum L.
rostratum Dunal. sol.
heterodoxum Dunal. sol.
sarmentosum Lamk. Ill.
lanceætolium Jacq Ic.

vespertilio H. K.
Nycterium cordifolium Vent.
Malm.

giganteum Jacq. 1c.
marginatum L. f.
tomentosum L.
coccineum Jacq. 1c.
polygamum Vahl. symb.
elæagnifolium cav. 1c.

leprosum ortega. Dec.
bahamense z.
igneum z.
pyracantha zamk. Ill.
polyacanthos zamk. Ill.
carolinense z.
Milleri Jacq. Ic.
ferrugineum Jacq. H. sch.
stramoniifolium zamk. Ill.
torvum swartz. Prodr.
ficifolium ortega. Dec.
indicum z. ex swartz.
glutinosum zncycl. suppl.
cuneifolium punal. sol.
lycioides z. mant.

CAPSICUM

grossum L. Mant.
— deflexum.
annuum L.
conicum.

- frutescens z.
violaceum.
cerasiforme willd. Enum.
baccatum z. mant.

LYCIUM

afrum z.
europæum z. mant.
carnosum.
rhutenicum willd. sp.
barbarum s. veg.

de Désfontaines.
hérissé, cap. or. 5
corniculé. s. ch. 5
hétérodoxe. s. ch. 5

sarmenteux. Antilles. s. ch. h

vespertilion. canaries. or. 9

gigantesque. cap. s. ch. 5
blanc. Abyssinie. s. ch. 5
cotonneux. Éthiopie. s. ch. 5
écarlate. s. ch. 5
polygame. Antilles. s. ch. 5
à feuilles de chalef. Am. m.
s. ch. 5
lépreux. chili. s. ch. 5
de Bahama. s. ch. 5
couleur de feu. Ant. s. ch. 5
polyacanthos. Antill. s. ch. 5
de Caroline. or. Z
de Miller. cap. s. ch. 5

ferrugineux. Antilles. s. ch. p

glutineux. s. ch. 5 cunéiforme. Antilles. s. ch. 5 Faux-Lycium. Pérou. or. 5 (orn.)

PIMENT

irrégulier. Inde. s. ch. &

- abaissé.

annuel. Antilles. (écon.)

conique. s. ch. &

arbrisseau. Inde. s. ch. b

violet. chine. s. ch. &

cerise. s. ch. b

baccifère. Inde. s. ch. b (écon.)

LYCIUM

d'Afrique. Esp. or. 5 d'Europe. f. m. or. 5 charnu. or. 5 de Russie. 5 lancéolé. chine. 5 chinense zamk. Ill.
boerhaaviifolium z. f.
Ehretia halimifolia l'Her. stirp.

CESTRUM

nocturnum z.
diurnum z.
laurifolium l'Her. stirp.
macrophyllum.
fœtidissimum Jacq. H. sch.
auriculatum l'Her. stirp.
salicifolium Jacq. H. sch.
vespertinum l'Her. stirp.
alaternoides.
parqui l'Her. stirp.

III. Genera solaneis affinia.

BILLARDIERA scandens smith. N. Holl.

Bontia daphnoides z.

Brunsfelsia americana z.

CRESCENTIA cujete L.

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

1. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

CORDIA

officinalis zamk. Ill.

myxa z.

crenata pelile. Ægypt.

dentata vahl. mss.

gerascanthus z.

macrophylla z.

nitida vahl. mss.

parviflora ortega. pec.

sebestena Andr. Rep.

patagonula.

" At . " U, I I'

EHRETIA
tinifolia z.
Beurreria z.

de Chine. 5 à feuilles de Boerhaavia. Pérou. or. 5

CESTRUM

de nuit. chili. s ch. 5
de jour. chili. s. ch. 5
à f. de Laurier. Am. m. s. ch. 5
à grand. feuill. Ant. s. ch. 5
fétide. Antilles. s. ch. 5
auriculé. pérou. s. ch. 5
à f. de saule. caracas. s. ch. 5
à fruit noir. Antilles. s. ch. 5
à f. d'Alaterne. Ant. s. ch. 5
Parqui. chili. 5

III. Genres qui ont de l'affinité avec les solanées.

BILLARDIERA sarmenteux. N. Holl. or. 5

BONTIA

à f. de paphné. Ant. s. ch. 3

BRUNSFELSIA
d'Amérique. Antill. s. ch. 5

CALEBASSIER

des Antilles. s. ch. 5

ORDRE IX.

BORRAGINÉES.

I. Une baie, tiges lignenses.

CORDIA

officinal. Égypte. s. ch. p
(méd. alim.)
crénelé. Égypte. s. ch. p
à feuill. dentées. Ant. s. ch. p
à f. de verveine. Ant. s. ch. p
à grandes feuill. Ant. s. ch. p
à feuill. luisant. Ant. s. ch. p
à petites fl. N. Esp. s. ch. p
sébestier. Antilles. s. ch. p
Patagonula. s. ch. p

À f. de Laurier-Tin. Ant. s. ch. b de Beurrer. Antill. s. ch. b ferruginea Lamk. Ill.
bullata L.
mirabilioides Jacq. Am.
rournefortia serrata L.
corymbosa Desvaux, Journ.
d'Hist. nat.
monosperma Jacq. H. sch.

Tournefortia
lucida
volubilis z.
humilis z.
scabra Lamk. Ill.
hirsutissima swartz. obs.
cymosa swartz. obs.
lævigata Lamk. Ill.
angulosa.
laurifolia vent. ch. de pl.
mutabilis vent. ch. de pl.

MESSERSCHMIDIA

Arguzia L. f.

fruticosa L. f.

angustifolia Lamk. Ill.

II. Fructus uni aut bicapsularis.

ELLISIA nyctelea L. mant.

Hydrophyllum
virginianum z.
canadense z.
magellanicum zamk. 1ll.

DICHONDRA caroliniensis mich. Fl. argentea willd. H. Ber.

CERINTHE

major z.

glabra pec. syn.

aspera pec. syn.

minor z.

III. Fructus gymnospermus, faux corolla nuda,

HELIOTROPIUM

peruvianum z.

grandiflorum.

indicum z.

ferrugineux. Am. m. s. ch. p
bulleux. Antilles. s. ch. p
à grandes. fl. Antill. s. ch. p
corymbifère. caracas. s. ch. p

luisant. Antilles. s. ch. p
sarmenteux. Antill. s. ch. p
nain. Am. m. s. ch. p
rude. Antilles. s. ch. p
hérissé. Antilles. s. ch. p
à longs épis. Antilles. s. ch. p
lisse. Antilles. s. ch. p
anguleux. s. ch. p
à f. de Laurier. Ant. s. ch. p
à fl. changeantes. Java. s. ch. p

Messerschmidia herbacé. sibérie. Z arbrisseau. canaries. or. 5 à feuilles étroit. canar. or. 5

II. Une ou deux capsules.

Ellisia de Virgin**i**e. 🕥

Hydrophylle de Virginie. 定 de Canada. 定 de Magellan. 华

DICHONDRA

de Caroline. or. ¥

argenté. île de fr. s. ch. ¥

MÉLINET
glabre. F. ⊙

rude. F. ⊙ à fleurs aiguës. F. ♂

III. Quatre fruits distincts, entrée de la corolle nue.

HÉLIOTROPE
du Pérou. or. 5 (orn.)
à grandes fl. s. ch. 5 (orn.)
des Indes. 0

europæum z.
parviflorum z. mant.
supinum z.
curassavicum z.

ECHIUM.

1. Herbacea.

vulgare z.

pyrenaicum Desf. Atl. }

italicum L. Var. b. }

australe Lamk. Ill.

violaceum L. Mant.

plantagineum L. Mant. }

creticum Lamk. Ill. }

prostratum.

2. Fruticosa.

giganteum L. f.
candicans Jacq. 1c.
strictum Lamk. 1ll.
virescens nec. cat.
cynoglossoides.

Arvense L.
officinale z.
purpureo-cœruleum z.
distichum jacq. Fragm.
tinctorium pec. Fl. Fr.
Anchusa tinctoria Lamk. Ill.
(non Lin.)
fruticosum z.
tenuiflorum L. f.

Pulmonaria officinalis z. angustifolia z. virginica z. sibirica z. maritima z.

ONOSMA echioides z.

IV. Fructus gymnotetraspermus, faux corollæ instructa squamis.

Symphytum
officinale L.
tauricum willd. Enum.
orientale marsch. cauc.
asperrimum marsch. cauc.

d'Europe. F. ① (méd.) à petites fleurs. Inde. ② couché. F. ② de Curação. s. ch. Z

VIPERINE.

1. Tige herbacée.

commune. F. & (méd.)

des Pyrénées. F. or. &

à fleur rouge. orient. ©

violette. F. m. ©

à feuill. de plantain. Italie. ©

couchée. Égypte. or. ¥

2. Tiges ligneuses.

gigantesque. canaries. or. 5

blanchâtre. canaries. or. 5

ramassée. canaries. or. 5

à f. de cynoglasse. canaries,

GRÉMIL

des champs. F. ①
officinal. F. ①
bleu-pourpre. F. Z
distique. or. ¥

or. h

des teinturiers. F. m. L.

arbrisseau. F. m. or. 5 à petites fleurs. Égypte. O

Pulmonaire
officinale. F. Z (méd.)
à feuilles étroites. F. Z
de Virginie. Z (orn.)
de Sibérie. Z
maritime. F. ①

Onosma à f. de viperine. F. &

IV. 4 fruits distincts, tube de la corolle couronné d'écailles.

Consoude officinale. F. Z (méd.)

d'Orient. Z

à feuilles rudes. caucase. Z

LYCOPSIS Lycopsis arvensis z. des champs. F. O ECHIOIDES ECHIOIDES nigricans Desf. Atl. à fleurs noires. Italie. à fleurs rouges. Italie. O rubra Desf. Atl. grandiflora. à grandes fleurs. 🔾 MYOSOTIS MYOSOTIS - arvensis willd. sp. des champs. F. O palustris. des marais. F. V hérissé. F. 🔾 Lappula z. ANCHUSA BUGLOSE italica Retz. obs. officinale. F. T (med.) angustifolia z.? à feuilles étroites. Italie. 14 ochroleuca marsch. cauc. jaune-pâle. caucase. T Barrelieri Dec. Fl. de Barrelier. Alpes. ¥ Buglossum Barrelieri. All. Ped. orcanette. F. m. or. 华 tinctoria z. ondulée. F. m. or. T undulata z. milleri willd. Enum. de Miller. Égypte. O toujours verte. Esp. L sempervirens L. verrucosa Lamk. 1ll. tuberculeuse, Égypte. 🕥 Asperugo ægyptiaca z. J laxiflora pec. syn. à fleurs lâches. corse. Z BORAGO BOURRACHE officinale. F. (med.) officinalis z. orientalis Z. d'Orient. L - indica z. des Indes. • africana z. d'Afrique. 0 ASPERUGO. RAPETTE procumbens L. couchée. f. O CYNOGLOSSUM CYNOGLOSSE officinale. F. o (med.) officinale L. apenninum L. des Apennins. & montanum Lamk. Ill. des Alpes. V hispidum Jacq. H. sch. à petites fleurs. Inde. O canescens willd. Enum. parviflorum encycl. suppl. cheirifolium L. à feuilles de cheiri, orient. linifolium L. . à feuilles de Lin. Esp. 🔾 nitidum willd. Enum. luisante. portugal. I omphalodes L. omphalodes. F. 4 (orn.) RINDERA RINDÉRA tetraspis pallas. Itin. ailé. Russie. cynoglossum Rindera z. f. \ MOLANA NOLANA

couché. pérou. or. &

prostrata L.

ORDO X.

CONVOLVULACE Æ.

Convolvulus.

I. Caule volubili.

- arvensis z.
sepium L.
inflatus.
panduratus z.
farinosus z. mant.

farinosus L. Mant.

- Batatas L.

nervosus Lamk. Ill.

canariensis L.

Jalapa L. Mant.

Ipomæa macrorhiza Mich. Fl.

althæoides L.

pentaphyllus L.

cairicus L.

dissectus L. Mant.

hermanniæ l'Her. Sert.

crenatus Jacq. Ic.

fruticulosus Lamk. Ill.

sibiricus L. Mant.

ebracteatus Lamk. Ill.

siculus L.

2. Caule non volubili.

pentapetaloides s. veg.
evolvuloides desf. All.
humilis Jacq. coll.
undulatus cav. Ic.
lineatus L.
cneorum L.
oleæfolius Lamk. Ill.
scoparius L. f.
cantabrica L.
pilosellæfolius Lamk. Ill.
dorycnium L.
tricolor L.
pes-capræ L.
soldanella L.
Falkia.

IPOMÆA

— quamoclit z.— coccinea z.

Vineja.

\$ 4

ORDRE X.

CONVOLVULACÉES.

LISERON.

1. Tige grimpante.

des champs. F. Z des haies. F. Z renflé. Am. s. T (orn.) sinué. Am. s. T farineux. madere. or. T Patate. Antilles. s. ch. & (alim.) à nervures. inde. s. ch. 5 des Canaries, or. b Jalap. mexique. or. z (méd.) à f. de Guimauve. F. m. or. L à cinq feuilles. Antilles. O du Caire. or. Z découpé. Antilles. 🔾 à seuill. d'Hermannia. Pérou. s. ch. T fruticuleux. canaries. or. 3 de Sibérie. 🔾

2. Tige non grimpante.

à 5 divisions. Italie.

ondulé. Barbarie. O

sans bractées.

de Sicile. ()

rayé. F. m. or. Z satiné. orient. or. 9 à feuilles d'olivier. or. 9 effilé. canaries. or. 9 à feuilles linéaires F. Z à f. de piloselle. orient. or. 9 Dorycnium. orient. or. 9 tricolore. Esp. (orn.) Pied-de-chèvre. Inde. s. ch. Z soldanelle. F. Z (méd.) de Falk. cap. or. Z

IPOMÆA -

Quamoclit. Inde. ⊙ (orn.) ésarlate. Antilles. ⊙

he was

e 1 f

m. "

— luteola Jacq. 1c. leucantha Jacq. 1c.

tuberculosa.
stipulacea Jacq. II. sch.
convolvulus tuberculosus
Lamk. Ill.

heterophylla Jacq. Fragm. triloba z.

hederacea sacq. ic.

convolvulus nil L.

ipomæa bicolor Lamk. ill.

purpurea Lamk. ill.

convolvulus purpureus L.

Evolvulus alsinoides L. linifolius L.

Cuscuta curopæa z.

ORDO XI.

POLEMONIACE Æ.

PHLOX

suaveolens H. K.
glaberrima L.
paniculata L.
divaricata L.
maculata L. Mant.
suffruticosa Willd. Enum.
ovata Bot. Mag.
subulata L.
reptans Mich. Fl.

Polemonium cœruleum z. reptans z.

CANTUA
ligustrifolia *Juss. Ann.*periphragmos fætidus *Fl. Pér.*vestia lycioides *willd. Enum.*

Bonplandia
geminiflora cav. ic.
caldasia heterophylla willd.
H. Ber.

Cobea scandens cav. 1c. jaune. Antilles. ①
à fleurs blanches. Am. m. ①
Bona-nox. Inde. s. ch. ①

tuberculeux. île de f. Z

à feuill. variabl. cuba.s. ch. za à trois lobes antilles. O à feuill. de Lierre. am. m. O

Nil. Antilles. ()

pourpre. Antilles. O (orn.)

Evolvulus
à feuilles d'Alsinė. inde. ①
à feuilles de Lin. Antilles. ②
Cuscute
d'Europe. F. ①

ORDRE XI. POLÉMONIACÉES.

 P_{HLOX}

odorant. Am. s. 平 (orn.)
glabre. Am. s. 疋 (orn.)
paniculé. Am. s. 疋 (orn.)
étalé. Am. s. 疋 (orn.)
tacheté. Am. s. 疋 (orn.)
sous-arbrisseau. Am. s. 內 (orn.)
ovale. Am. s. 疋 (orn.)
en aléne. virginie. 冱
rampant. Am. s. 疋 (orn.)

Polémoine

à fleurs bleues. Eur. Z (orn.)

rampante. Am. s. Z (orn.)

CANTUA

à f. de troêne. pérou. s. ch. Z

BONPLANDIA

à sleurs géminées. N. Esp. or. Z

Cobé A grimpant. mexiq. or. 5 (orn.)

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

CHELONE
glabra z.
obliqua willd. sp.
barbata cav. 1c.

Pentstemon
lævigata willd. sp.
pubescens willd. sp.
chelone pentstemon L. mant.}
campanulata willd. sp.
chelone campanulata cav. ic.

Sesamum orientale z.

BIGNONIA.

I., Foliis simplicibus.

catalpa L.
catalpa syringifolia H. K.
Quercus Encycl.
longissima willd. sp.
catalpa longissima H. K.
sempervirens L.

2. Foliis conjugatis.

unguis-cati L.
pseudo-unguis.
capreolata L.
crucigera L.
paniculata vahl. symb.

3. Foliis digitatis.

triphylla z? pentaphylla z.

4. Foliis pinnatis.

grandislora Andr. Rep. radicans L. stans L. pandorea Andr. Rep. australis Brown. Prodr. } chelonoides L. f.?

MARTYNIA proboscidea willd. sp.

ORDRE XII.

BIGNONES.

CHÉLONÉ
glabre. Am. s. V
oblique. virginie. V
barbue. mexique. or. V (orn.)

PENTSTÉMON
à feuilles lisses. Am. s. or. Z

pubescent. Am. s. or. Z

campanulé. Mexiq. or. Z (orn.)

SÉSÂME d'Orient. (écon.)

BIGNONE.

1. Feuilles simples.

catalpa. Am. s. 5 (orn.)

à f. de chêne. Antill. s. ch. h

toujours verte. Am. s. or. b

2. Feuilles conjuguées.

à griffes. Antilles. s. ch. 5 Fausse-Griffe. Antill. s. ch. 5 à vrilles. Antilles. s. ch. 5 crucifère. Am. s. or. 5 paniculée. Antilles. s. ch. 5

3. Feuilles digitées.

trifoliée. Antilles. s. ch. 5 à 5 feuilles. Antilles. s. ch. 5

4. Feuilles pennées.

à grand. fl. chine. or. 5 (orn.) grimpante. Am. s. 5 (orn.) droite. Antilles. s. ch. 5

pandorea. île Norfolk, or. p Faux-chelone. mde. s.ch. p

MARTYNIA
à longues cornes. Ant. O (orn.)

angulosa Encycl.
diandra Jacq. H. sch.
perennis L.
Gloxinia maculata l'Her.stirp.

ORDO XIII.

GENTIANEÆ.

I. Capsula simplex unilocularis.

GENTIANA.

1. Corollis 5 fidis, subcampanulatis.

lutea z.
asclepiadea z.
pneumonanthe z.
acaulis z.
Amarella z.

2. Corollis 4 fidis.

campestris z. cruciata z.

Swertia perennis *L*.

Chlora perfoliata s. veg.

II. Capsula simplex, bilocularis.

CHIRONIA

decussata vent. H. cels.
frutescens L.
linoides L.
baccifera L.
centaurium willd. sp.
gentiana centaurium L.
— minus.
filiformis.
gentiana filiformis L.
Exacum filiforme smith. Fl.

SAROTHRA gentianoides L.

VILLARSIA
ovata Vent. ch. de Pl.
menyanthes ovata L. f.
nymphoides Vent. ch. de Pl.
menyanthes nymphoides L.

anguleux. mexique. ⊙ (orn.)
vivace. Antilles. s. ch. ¥

ORDRE XIII.

GENTIANÉES.

I. Une capsule à une loge.

GENTIANE.

1. Corolle presque en cloche, à 5 divisions.

jaune. Alpes. * (méd.)
à feuill. d'Asclépias. Alpes. *
Pneumonanthé. F. Z
sans tige. Alpes. * (orn.)
Amarella. F. •

2. Corolle à 4 divisions.

des champs. F. ⊙ croisette. F. ¥

SWERTIA vivace. f. 华

Chlora perfolié. f. 🔾

II. Capsule simple, à 2 loges.

CHIRONIA

à feuill. en croix. cap. or. 5 arbrisseau. cap. or. 5 (orn.) à feuilles de Lin. cap. or. 5 baccifère. cap. or. 5

petite-centaurée. F. O (méd.)

- naine.

filiforme. F. 🔾

SAROTHRA filiforme. Am. s. O

VILLARSIA

ovale, cap. or. ¥

à feuilles de Nymphea. F. ¥

Spigelia Anthelmia z. marylandica s. veg.

ORDO XIV.

APOCYNEÆ.

I. Germina 2, fructus bifollicularis, semina absque pappo.

VINCA

minor L.

minor L.

herbacea wald. et kitt. Hung.

rosea L.

TABERNAMONTANA
angustifolia willd. sp.
amsonia L.
citrifolia L.
neryosa.

CAMERARIA latifolia z.

PLUMIERA
rubra z.

alba z.

II. Germen duplex, fructus bifollicularis, semina papposa.

NERIUM

oleander.
— album.
odorum willd. sp.
grandiflorum.
coronarium jacq. ic.

STAPELIA

hirsuta z.
grandiflora mass. stap.
Asterias mass. stap.
cæspitosa mass. stap.
papillosa nec. pl. gr.
variegata z.
reticulata mass. stap.

PERIPLOCA

græca z.
angustifolia Bill. Dec.

Apocynum androsæmifolium z.

SPIGELIA

anthelmia. Antilles. O de Maryland. or. Z

ORDRE XIV.

APOCYNÉES.

I. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines sans aigrette.

PERVENCHE

grande. F. Z (méd.)

petite. F. Z

herbacée. Hongrie. Z

rose. Inde. s. ch. 5

TABERNÉMONTANA

à feuilles étroites. Am. s. Z.

Amsonia. Am. s. Z.

à f. de citronnier. Ant. s. ch. p.

à grosses nerv. Antill. s. ch. p.

CAMÉRARIA
à larg. feuill. antill. s. ch. 3

PLUMIÉRA

rouge. Antilles. s. ch. b (orn.) blanc. Antilles. s. ch. b (orn.)

II. 2 ovaires, 2 capsules folliculeuses, graines aigrettées.

NÉRIUM

Laurier-rose F. m. or. 5 (orn.)

— à fleurs blanches.

odorant. inde. or. 5 (orn.)

à grande fleur. or. 5 (orn.)

à bouquets. inde. s. ch. 5 (orn.)

STAPÉLIA

velu. cap. s. ch. 5 à grandes fleurs. cap. s. ch. 5 Astérias. cap. s. ch. 5 touffu. cap. s. ch. 5 mameloné. cap. s. ch. 5 panaché. cap. s. ch. 5 à réseau. cap. s. ch. 5

PÉRIPLOCA

de Grèce. ¥
à f. étroites, orient, or. >

Apocin

à f. d'Androséme, am. s. W

cannabinum L. hypericifolium willd. sp. venetum L.

CYNANCHUM prostratum cav. Ic. acutum L. monspeliacum z. caroliniense Jacq. 1c. macrophyllum (an generis?). erectum L.

- mauritianum Encycl.

ASCLEPIAS

vincetoxicum z. nigra L.

= nivea L. Vd asthmatica.

curassavica L. incarnata L. tuberosa L. amœna L. linaria cav. 1c. angustifolia willd. H. Ber. mexicana cav. ic. carnosa Bot. Mag. fruticosa L. syriaca L. arborescens L. mant.

III. Germen simplex, fructus baccatus aut rarius capsularis.

ALLAMANDA

cathartica L. Mant. verticillata.

RAUWOLFIA nitida z. glabra cav. 1c.

OPHIOXYLON serpentinum L.

CERBERA

- Thevetia L.

- manghas L.

ARDUINIA bispinosa willd. sp.

Man of ush of whi

THEOPHRASTA americana L.

11 4

·C - , :! , es .

à fleurs vertes. Am. s. Z à f. d'hypéricum. Am. s. К denté. italie. v.

CYNANCHUM couché. mexique. s. ch. 7 aigu. f. L de Montpellier. or. T de Caroline. or. 5 à grandes feuilles. s. ch. 19

à tige droite. syrie. 9 de l'île de France. s. ch. 19

ASCLÉPIAS

Dompte-venin. F. Z (méd.) noir. f. L blanc. Am. s. or. Z de Curação. s. ch. Z incarnat. Am. s. Z tubéreux. Am. s. or. Z rose. Am. s. Z à f. de Linaire. or. T àf. étroites. mexique? s. ch. Z du Mexique. s. ch. ¥ charnu. chine. s. ch. 5 arbrisseau. Tunis. or. \$ à la ouate. Am. s. T arbre. cap. s. ch. 5

III. Ovaire simple, une baie ou plus rarement une capsule.

ALLAMANDA cathartique. caïenne. s. ch. 5 verticillé. s. ch. 5

RAUWOLFIA à f. luisantes. Antill. s. ch. 5 glabre. N. Esp. s. ch. 5

OPHIOXYLON Noix-de-serpent. inde. s. ch. 5

CERBERA Thévétia. Antilles. s. ch. 5 manghas. inde. s. ch. 19

ARDUINIA bifurqué. cap. s. ch. 5

THÉOPHRASTA d'Amérique, antilles, s. ch. 5

Indo nectified

ORDO XV.

SAPOTE.

SIDEROXYLUM

melanophleos L. Mant.) laurifolium Encycl. atrovirens Encycl. mastichodendrum jacq.coll.) Bumelia salicifolia swartz. prodr. lycioides z. tenax L. Mant. mini op dangern willd. sp.

CHRYSOPHYLLUM

glabrum z. cainito z. argenteum Jacq. Am.

ACHRAS

sapota z.

MYRSINE

africana L.

retusa vent. H. cels.

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

SIDÉROXYLUM

à f. de Laurier. inde. s. ch. 19 vert-sombre. Am. m. s. ch. b à f. de saule. Antill. s. ch. 5

à feuilles de Lycium. Am. s. b

satiné. caroline. or. 19

CAIMITIER

glabre. Antilles. s. ch. 5 cainito. Antilles. s. ch. 5 argenté. Antilles. s. ch. b.

SAPOTILLIER cultivé. ant. s. ch. 5 (alim.)

MYRSINÉ

d'Afrique. cap. or. T à feuill. obtuses. Açores. or. 19

I with each of sage till

CLASSIS IX.

CLASSE IX. N. L

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla perigyna.)

ORDO I.

GUAIACANÆ.

DIOSPYROS

- Ebenum Encycl.

virginiana L. Lotus L. Kaki L. f.

MONOPÉTALES.

DICOTYLÉDONS

(Corolle attachée au calice.)

ORDRE I.

PLAQUEMINIERS.

PLAQUEMINIER

ébénier. île de fr. s. ch. 5 (écon.)

de Virginie. 3

Lotos. orient. b

Kaki. Japon. 5 (écon.)

hirsuta pesf. Ann. Royena hirsuta L. Slycioides pesf. Ann.

ROYENA lucida z.

Visnea mocanera z. f.

Styrax
officinale z.
lævigatum cav. piss.
grandifolium willd. sp.

Halesia tetraptera L.

Hopea
tinctoria L. mant.
symplocos tinctoria willd.sp.

ORDO II.

RHODODENDRA.

KALMIA
latifolia z.
angustifolia z.
glauca H. K.

RHODODENDRON
ferrugineum z.
hirsutum z.
chamæcistus z.
minus mich. Fl.
punctatum vent. H. cels.
maximum z.
ponticum z.

AZALEA

viscosa z.

glauca z.

nudiflora z.

pontica z.

procumbens z.

Rhodora canadensis z.

LEDUM

palustre z.
latifolium Encycl.
thymifolium Encycl.

velu. cap. or. 5
à feuill. de Lycium. cap.? or. 5

Royéna luisant. cap. or. 5

Visnéa mocanéra. canaries. or. 5

STYRAX

officinal. F. m. 5 (méd.)
glabre. Am. s. 5
à grand. feuill. carol. or. 5

HALÉSIA
à 4 ailes. Am. s. 5 (orn.)

HOPÉA

des teinturiers. caroline. 3

ORDRE II.

ROSAGES.

KALMIA

à larges feuill. Am. s. h (orn.)
à feuill. étroit. Am. s. h (orn.)
glauque. Am. s. h (orn.)

RHODODENDRON

ferrugineux. Alpes. 5 (orn.)

velu. Alpes. 5 (orn.)

à feuill. de ciste. Autriche. 5

ponctué. Am. s. 5 (orn.)

d' Amérique. Am. s. 5 (orn.)

de Pont. 5 (orn.)

AZALÉA
visqueux. Am. s. h (orn.)
glauque. Am. s. h (orn.)
à fleurs nues. Am. s. h (orn.)
de Pont. h (orn.)
couché. Alpes. h

Rhodora de Canada. 5

Lédum

des marais. Alpes. 5 (écon.)
à larges feuill. Am. s. 5
à feuill. de Thym. Am. s. 5

BEFARIA

paniculata mich. Fl.
Bejaria racemosa vent. H. cels.

MENZIEZIA

poliifolia juss. Ann. }
Erica naboecii L.

ITEA

virginica z.

ORDO III.

ERICÆ.

1. Antheræ aristatæ.

a. Foliis ternis.

viridi-purpurea L.

b. Foliis quaternis.

arborea z.
Tetralix z.
abietina z.

c. Foliis senis.

mammosa L.

2. Cristata.

a. Foliis oppositis.

vulgaris z.

b. Foliis ternis.

scoparia L.
cinerea L.
australis L. Mant.

c. Foliis quaternis.

baccans z.

3. Mutica.

a. Foliis ternis.

ciliaris L. versicolor. Andr. Rep.

b. Folits quaternis aut pluribus.

curviflora L.
tubiflora L.
simpliciflora willd. sp.
cerinthoides L.
conspicua H. K.
mediterranea L.
multiflora L.

BÉFARIA

paniculé. Am. s. 5

MENZIÉZIA

à feuilles de Polium. F. h

ITÉA

de Virginie. Am. s. h (orn.)

ORDRE III.

BRUYÈRES.

1. Anthères munies d'arêtes.

a. Feuilles ternées.

vert-pourpre. portugal. 15

b. Feuilles quatre à quatre.

en arbre. f. m. or. 5 Tétralix. f. 5 à feuill. de sapin. cap. or. 5

c. Feuilles six à six.

mamelonée. cap. or. 9

2. Anthères en crête.

a. Feuilles opposées.

commune. F. h

b, Feuilles ternées.

à balais. F. h

cendrée. F. h

australe. F. m. or. h

c. Feuilles quatre à quatre. globuleuse. cap. or. 5

3. Anthères sans appendice.

a. Feuilles ternées.

ciliée. f. 5 bigarrée. cap. or. 5

b. Feuilles quatre à quatre ou en plus grand nombre.

à fieurs courbes. cap. or. 5
tubulée. cap. or. 5
à fleurs simples. cap. or. 5
à fl. de Mélinet. cap. or. 5
remarquable. cap. or. 5
de la Méditerranée. f. m. or. 5
à fl. nombreuses. f. m. or. 5

(97)
vagans L.	n
herbacea willd. sp. \	étalée. F. m. or. 19
carnea L.	précoce. suisse. 5
CYRILLA	
racemiflora z.	CYRILLA
	à grappes. caroline. 5
ANDROMEDA	ANDROMÉDA
mariana L.	de Maryland. Am. s. 5 (orn.
nitida <i>mich. fl.</i> lucida <i>Encycl.</i>	
coriacea H. K.	luisant. Am. s. 5
axillaris H. K.	amillaina
cassinefolia vent. H. cels.	axillaire. Am. s. 5
speciosa mich. Fl.	à feuill. de cassiné. Am. s. 5
pulverulenta vent. malm. paniculata L.	pulvérulent. Am. s. h
racemosa L.	paniculė. Am. s. h
arborea z.	à grappes. Am. s. 5
caliculata L.	en arbre. Am. s. 5
crispa.	caliculé. Am. s. 5
ferruginea L. f.	crépu. Am. s. 5 ferrugineux. Am. s. 5
polifolia z.	à feuill. de Polium. Am. s. 19
- angustifolia.	- à feuilles étroites.
- latifolia.	— à larges feuilles
ARBUTUS	ARBOUSIER .
unedo z.	des Pyrénées. or. 5 (orn.)
Andrachne z.	Andrachné. orient. or. 5 (orn.)
uva-ursi L.	Busserole. Alpes. 5 (med.)
alpina z.	des Alpes. 5
CLETHRA.	Cléthra
alnifolia z.	
— pubescens.	à feuill. d'Aune. Am. s. h (orn.) — pubescent.
arborea H. K.	arbre. canaries. or. 5
PYROLA	
rotundifolia z.	PYROLE
minor L.	à feuilles rondes. F. Y
maculata z.	petite. г. и maculée. am. s. ъ
EPIGÆA	
repens L.	E_{PIGEA}
	rampant. Am. s. b
GAULTHERIA	GAULTHÉRIA
procumbens z.	de Canada. Am. s. 19
VACCINIUM	$M_{YRTILLE}$
myrtillus z.	Lucet. F. b
pensylvanicum Encycl.	de Pensylvanie. 5
uligingeum z	,

uliginosum z.

des marais. F. 5

vitis-idea L.
stamineum L.
amænum H. K.
disomorphum Mich. Fl.
macrocarpon H. K.
oxycoccos L.

STYPHELIA

daphnoides smith. N. Holl.

Lissanthe daphnoides Brown.

Prodr.

Gnidium Vent. Malm.

Leucopogon lanceolatus

Brown. Prodr.

Empetrum nigrum L.

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. Antheræ distinctæ.

MICHAUXIA campanuloides l'Her. N. Gen.

Canarina campanulata L. Mant.

CAMPANULA.

1. Foliis lavibus; calicis sinubus non deflexis.

uniflora L.
hederacea L.
rotundifolia L.
carpatica L. f.
Rapunculus L.
persicifolia L. sp. ed. 1^a.
obliqua Jacq. H. sch.
pyramidalis L.
lilifolia L.
grandiflora L. f.
gentianoides Lamk. Ill. }
rhomboidalis L.
verticillata L. f.

2. Foliis asperis; sinubus calicis non deflexis.

rhutenica marsch. cauc.

ponctué. Alpes. h (méd.)
à longues étamines. Am. s. h
corymbifère. Am. s. h
à gros fruit. Am. s. h
canneberge. F. h

STYPHÉLIA

à f. de paphné. N. Holl. or. 🦻

Gnidium. N. Holl. or. 5

Empétrum
à fruit noir. Alpes. 3

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

I. Anthères distinctes.

MICHAUXIA
à fruit rude. syrie. or. o

CANARINE campaniforme. madere. or. Z.

CAMPANULE.

1. Feuilles lisses; sinus du calice non abaissés.

à une fleur. Alpes. Z
à feuilles de Lierre. F. Z
à feuilles rondes. F. Z
des monts Krapac. Z (orn.)
Raiponce. F. Z (alim.)
à feuilles de pècher. F. Z
oblique. &
Pyramidale. F. Z (orn.)
à feuilles de Lis. sibérie. Z
rhomboïdale. F. Z
verticillée. Russie. Z

2. Feuilles rudes; sinus du calice non réfléchis.

de Russie. Z

Intifolia z.

rrachelium z.

rapunculoides z.

bononiensis z.

glomerata z.

petræa z.

thyrsoidea z.

tomentosa zamk. ill.

peregrina z.

lanuginosa zamk. ill.

Erinus z.

3. Sinubus calicis deflexis.

laciniata L.
caucasica Marsch. cauc.
betonicæfolio Marsch. cauc.
lingulata Wald. et Kitt.
Medium L.
longifolia Lapeyr. Fl.
barbata L.
spicata L.
sibirica L.

4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

speculum *L*.
hybrida *L*.
perfoliata *L*.

5. Caule fruticoso.

aurea L. f.

TRACHELIUM cœruleum L.

GESNERIA tomentosa L.

PHYTEUMA

canescens wald. et kitt. Jung. spicata L. orbicularis L. hemisphærica L. pinnata L.

II. Anthera connata.

LOBELIA

fulgens willd. Enum. surinamensis L. longislora L.

d larges feuilles. Alpes. W Gantelée. F. W fausse Raiponce. F. W de Bologne. Italie. W agglomérée. F. W des rochers. Mont valdo. W en thyrse. Alpes. O. cotonneuse. orient. or. W

hérissée. orient. or. o.

Érine. F. 🔾

3. Sinus du calice abaissés.

laciniée. crète. or. Z
du Caucase. Z
à feuilles de Bétoine. cauc. Z
de Hongrie. &
des jardins. F. & (orn.)
à long. f. pyrénées. Z (orn.)
barbue. Alpes. Z
à épis. Alpes. &
de Sibérie. &

4. Capsules en colonne ou prismatiques.

miroir de Vénus. F.⊙ (orn.) hybride. F. ⊙ perfoliée. Am. s. ⊙

5. Tige ligneuse.

jaune. canaries. or. 9

TRACHELIUM à fl. bleues. Alger. or. ¥ (orn.)

GESNÉRIA
cotonneux. Antilles. s. ch. 19

PHYTEUMA
blanchâtre. Hongrie. ¥
en épi. F. ¥
orbiculaire. F. ¥
hémisphérique. F. Æ
à feuill. pennées. orient. or. ¥

II. Anthères réunies.

LOBÉLIA

éclatant. mexique.or. Z (orn.)
de Surinam. s. ch. Z
à longues fleurs. Antilles. s. ch.
¥ (vénén.)

cardinalis z.

syphilitica z.

inflata z.

cliffortiana z.

urens z.

triquetra z. mant.

Laurentia z.

pubescens Jacq. H. sch.

minuta z. mant.

GOODENIA

ovata *smith. soc. Linn.* grandiflora *Bot. mag.* lævigata *Bot. mag.*

JASIONE

montana z.

Sciend of urning.

cardinale. Am. s. Z (orn.)
syphilitique. Am. s. Y (méd.)
renflé. Am. s. O
de Cliffort. Antilles. s. ch. O
brûlant. F. O
triangulaire. cap. or. or
à longs pédoncules. Italie. O
à feuilles d'Érine. cap. O
pubescent. cap. or. Y
nain. corse. or. Y

GOODÉNIA

à feuill. ovales. N. Holl. or. Za à grandes fleurs. N. Holl. or. Za lisse. N. Holl. or. Z

Jasioné
de montagne. F. &

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES

MONOPETALÆ.

(Corolla pistillo imposita; antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOS CULOS Æ.

I. Receptaculum nudum; semen absque pappo.

LAMPSANA

communis *t*.

— crispa.

lyrata *willd*. *Enum*.

RHAGADIOLUS

stellatus willd. sp.
Lampsana stellata L.
lampsanoides.
edulis willd. sp.
Lampsana rhagadiolus L.
kolpinia.
Lampsana kolpinia L. f.

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS

MONORÉTALES.

(Corolle sur le pistil; anthères réunies.)

ORDRE I.

SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nu; graines sans aigrette.

LAMPSANE

commune. F. ①
— crépue.
en lyre. mer casp. 72

 $R_{HAGADIOLE}$

étoilée. orient. O

comestible. F. O

Kolpinia. Tartarie. O

II. Receptaculum nudum; semen II. Réceptacle nu ; graine couronnée d'une papposum. aigrette. PRENANTHES $P_{R\acute{E}NANTHES}$ muralis L. des murailles. F. o hispida willd. sp. hérissé. sibérie. ¥ viminea L. effilé. F. 72 purpurea z. pourpre. Alpes. 72 pinnata L. f. penné. canaries. or. 3 CHONDRILLA CONDRILLE juncea L. joncisorme. F. T LACTUCA L_{AITUE} perennis L. vivace. F. T tenerrima willd. sp. glauque. F. Y saligna L. lancéolée. F. 🔾 sagittata wald. et kill. Hung. sagittée. vongrie. & virosa z. vireuse. F. 🔾 — laciniata. -laciniée. maculata Horn. maculée. () scariola L. Escariole. F. O - sanguinea. -- pourpre. sativa L. cultivée. (alim. méd.) -- romana. --- romaine. - capitata. —pommée. - crispa. -crépue. intybacea Jacq. 1c. à tige nue. Antilles. O spinosa Desf. Atl. épineuse. Barbarie. or. 19 prenanthes spinosa willd. sp. Sonchus LAITRON fruticosus l'Her. stirp. arbrisseau. canaries. or. 19 pinnatus II. K. penné. madère. or. 5 congestus Decand. cat. broussonetii? aggloméré. canaries. or. 5 macranthos encycl. suppl. talaricus L. mant. de Tartarie. V. macrophyllus willd. sp. à grandes feuilles. Am. s. W plumieri L. de Plumier. Alpes. 华 alpinus L. des Alpes. 7 floridanus z. de la Floride. Am. s. & multiflorus. à fleurs nombreuses. O racemosus Encycl. oleraceus z. commun. O - asper. rude. lacerus willd. Enum. lacéré. 🕥 divaricatus nesf. Ann. étalé. Égypte. or. Z chondrilloides pesf. All. à tige de condrille. вагь. Т tenerrimus z. lacinié. f. O

palustris z.
arvensis z.
uliginosus marsch. cauc.
maritimus z.

HIERACIUM.

1. Caule folioso.

fruticosum willd. sp. umbellatum L. sabaudum z. - maculatum. - latifolium. blattarioides z. amplexicaule L. villosum L. grandiflorum wald. et kitt. Hung. pappoleucum vill. pelph. prostratum. eriophorum pec. syn. lanatum wald. et Kitt. Hung. glaucum All. Ped. lævigatum willd. H. Ber. nigrescens willd. H. Ber. alpinum z. intybaceum Jacq. Austr. albidum vill. Delph. tubulosum encycl. paludosum z. lampsanoides couan. Ill. Prenanthoides L. globosum. Jacquini vill. Delph. pumilum Jacq. Austr. humile willd. sp. murorum L. sylvaticum willd. prunellasolium all. ped. pumilum L. Mant. porrifolium z. echioides wald. et Kitt. Hung.

2. Caule nudo multifloro.

aurantiacum L. florentinum willd. sp. piloselloides vill. pelph. cymosum L.

des marais. F. W. des champs. F. O aquatique. caucase O maritime. F. W.

EPERVIÈRE.

1. Tige feuillue.

arbrisseau. Madère? or. p
ombellifère. F. Z
de Savoie. F. Z
—tachetée.
—à larges feuilles.
à feuill. de Blattaire. Alpes. Z
amplexicaule. Alpes. Z
velue. Alpes. Z

à grandes fleurs. Alpes. 14

couchée. ¥
lanugineuse. F. Z
laineuse. Hongrie. ¥
glauque. Alpes. Z
lisse. Z
à graines noires. ¥
des Alpes. Z

tubulée. Alpes. Z

des marais. Alpes. Z à f. de Lampsane. Pyrénées. Z à f. de Prénanthes. Alpes. Z globuleuse. ¥

de Jacquin. Alpes. Z

des murailles. f. L des bois. f. L

à feuill. de Brunelle. Alpes. Z à feuill. de Poireau. Alpes. Z hérissée. Hongrie. Z

2. Tige nue à plusieurs fleurs.

couleur de feu. Alpes. Z (orn.) de Florence. Z à feuill. de piloselle. Alpes. Z corymbifère. Alpes. Z.

repens. auricula L. dubium L.

3. Caule nudo unifloro.

pilosella L.
aureum willd. sp.
Leontodon aureum L.
bulbosum willd. sp.
Leontodon bulbosum L.

CREPIS

sibirica L. нieracium sibiricum willd.sp. parviflora. coronopifolia pesf. Atl. albida vill. pelph. alpina L. rubra z. pauciflora. nemausensis couan. Ill. Andryala nemausensis vill. Delph. fœtida z. pulchra L. prenanthes hieraciifolia willd. sp. hispida wald. et kitt. Hung. Dioscoridis Thuil. Fl. (non L.) patula. tectorum L. virens vill. pelph. biennis L. taurinensis willd. sp. Barkhausia taraxacisolia Dec. rigida wald. et Kitt. Hung. aspera L.

barbata.

crepis barbata L.

- pallida.

HYOSERIS.

I. Caule ramoso.

nedypnois L.

Rhagadioloides L.

cretica L.

rampante. La auriculée. F. La

3. Tige nue à une fleur.

Piloselle. F. T

orangée. Alpes. v

bulbeuse. F. ¥

CRÉPIS

de Sibérie. 74

à petites fleurs. orient. ①
à f. de corne-de-cerf. Barb. ②
blanc. Alpes. ②
des Alpes. ①
rouge. F. ② (orn.)
à fleurs rares. Égypte. ②

à tige nue. F. 🔾

félide. F. O

à feuill. de Lampsane. F. 🕥

hérissé. Hongrie. ⊙ de Dioscoride. F. ⊙ étalé. ⊙

des toits. F. ()

bisannuel. F. &

de Turin. F. 🔾

roide. ноngrie. и piquant. orient. О

DRÉPANIA

barbu. F. m. 🔾

— à fleurs pâles.

HYOSÉRIS.

1. Tige rameuse.

pormeuse. f. ①
Rhagadiole. f. ①
de Crète. ②

2. Caule nudo simplici.

radiata L.

Jucida L. Mant.
scabra L.
fœtida Gouan. Monsp.
Lampsana fœtida willd. sp.
minima L.
Lampsana minima Dec. Fl.
taraxacoides vill. Delph.
Trincia hispida Dec. Fl.

ZACINTHA

verrucosa willd. sp. lampsana zacintha z.

TARAXACUM

- { Dens-leonis Desf. Atl. }
Leontodon Taraxacum L. }
obovatum.
Leontodon obovatus Willd.sp. }
palustre Dec. syn.

APARGIA

alpina willd. sp.

Leontodon pyrenaicum

Gouan. 1ll.

autumnalis willd. sp.

Leontodon autumnale L.

hastilis willd. sp.

Leontodon hastile L.

hispida willd. sp.

Leontodon hispidum L.

crispa willd. sp.

Leontodon crispum vill.

Delph.

PICRIS

hieracioides L.
sprengeriana.

Hieracium sprengerianum L.
integrifolia.
globulifera.
crepis dioscoridis pec. 1c.

HELMINTIA

echioides willd. sp. }
picris echioides z. }

SCORZONERA

— hispanica z.

2. Tige nue simple.

rayonnée. F. ①
luisante. orient. &
rude. Italie. ①
fétide. F. ①

petite. F. 🗿

commune. F. V

ZACINTHA

tuberculeux. orient. O

TARAXACUM

pent-de-lion. F. Z

ovale renversé. Esp. W

APARGIA

des Alpes. Z

d'automne. F. 72

lancéolé. F. Y.

hérissé. F. Z

crépu. F. Z

Picris

épervière. F. ♂
de Sprenger. F. ⊙
à feuilles entières. ⊙
globuleux. F. ⊙

HELMINTIA

hérissé. F. 💿

Scorsonere d'Espagne. A (alim.)

angustifolia L.
austriaca willd. sp.
humilis L.
laciniata L.
calcitrapifolia vahl. symb.
villosa scop. carn.
eriosperma willd. sp.

vulgare pesf. Atl.
scorzonera picroides L.
sonchus picroides willd. sp.
tingitanum pesf. Atl.
scorzonera tingitana L.
sonchus tingitanus willd. sp.

TRAGOPOGON

pratensis L.

major Jacq. Austr.

undulatus Jacq. Ic.

mutabilis Jacq. Ic.

porrifolius L.

crocifolius L.

UROSPERMUM

Dalechampii.

Tragopogon Dalechampii L.

Arnopogon Dalechampii

willd. sp.

picroides.

Tragopogon picroides L.

Arnopogon picroides willd.

sp.

III. Receptaculum villosum aut paleaceum.

glaber L.

Hypochæris
maculata L.
helvetica Jacq. Ic.
glabra L.
radicata L.

Seriola æthnensis z. cretensis z.

GEROPOGON

Andryala integrifolia L.

à feuilles étroites. F. ¥
d'Autriche. ¥
petite. F. ↓
laciniée. F. ♂
à f. de chausse-trape. orient.⊙
velue. carniole. ♂
laineuse. F. m. Æ

commun. f. () (alim.)

de Tanger. O

PICRIDIUM

des prés. F. ♂ (alim.)
élevé. Autriche. ⊙
ondulé. orient. ♂
à fl. changeantes. sibérie. ♂
à feuillés de poireau. F. ♂
à feuilles de saftan. F. m. ♂

de Dalechamp. f. o

hérissé. F. O

UROSPERMUM

III. Réceptacle velu ou garni de paillettes.

Géropogon glabre. 1talie. ⊙

Hypochéris
tacheté. f. \psi
de Suisse. \psi
glabre. f. \cong
à longues racines. f. \psi

SÉRIOLA

de l'Etna. Italie.

de Crète.

ANDRYALA

à seuilles entières. F. &

sinuata L.
lanata L.
ragusina L.
cheirauthifolia l'Her. stirp.

CATANANCHE cœrulea L. lutea L.

Cichorium

intybus L.

Endivia L.

— crispa.

pumilum jacq. obs.

spinosum L.

Scolymus maculatus z. hispanicus z.

ORDO II.

FLOSCULOS Æ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum; semen papposum; flores flosculosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

CNICUS.

1. Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.

centauroides willd. sp. cernuus willd. sp. oleraceus willd. sp. tataricus willd. sp. ochroleucus willd. sp. uliginosus marsch. cauc. Erisithales willd. sp. semipectinatus Encycl. rivularis willd. sp. pratensis willd. sp. carduus anglicus encycl. § tuberosus willd. sp. serratuloides willd. sp. munitus marsch. cauc. arachnoideus marsch. cauc. ferox willd. sp. spinosissimus willd. sp.

sinué. F. & laineux. F. V. de Raguse. or. V. à f. de Giroflée. Madère. or. V.

CATANANCHÉ
bleu. f. & (orn.)
jaune. f. m. ①

CHICORÉE sauvage. F. W (méd. alim.)

Endive. ♂ (alim.)
— crépue.
naine. ⊙
épineuse. F. m. ♂

Scolymus

panaché. italie.

d'Espagne.

ORDRE II.

FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines aigrettées; tous les fleuvons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

CNICUS.

1. Feuilles sessiles ou embrassantes.

de feuilles de centaurée. F. We penché. sibérie. We des prés. F. We de Tartarie. We jaunâtre. F. We des marécages. caucase. We terisithalès. Alpes We semipectiné. Tartarie. We des ruisseaux. Autriche. We

des prés. F. ¥

tubéreux. F. Z à feuilles de sarrète. F. Z armé. caucase. Z arachnoïde. caucase. Z hérissé. Alpes. & très-épineux. suisse. Z ciliatus willd. sp.
eriophorus willd. sp.
diacantha Bill. Dec.
casahonæ willd. sp.
stellatus willd. sp.
syriacus willd. sp.
acaulis willd. sp.
fruticosus.

2. Foliis decurrentibus.

arvensis.
serratula arvensis L.
lanceolatus willd. sp.
Acarna willd. sp.
palustris willd. sp.
monspessulanus willd. sp.
pyrenaicus willd. sp.
canus willd. sp.

CARDUUS

leucographus willd. sp. arabicus willd. sp. argentatus willd. sp. candicans wald. et kitt. Hung. crispus willd. sp. rersonata willd. sp. Arctium personata L. acanthoides willd. sp. pycnocephalus willd. sp. carlinoides gouan. Ill. medius gouan. 1ll. defloratus willd. sp. nutans willd. sp. glaucophyllus. marianus willd. sp. - viridis.

ONOPORDON

Acanthium L.

— viride.

illyricum L.

arabicum L

acaulon L.

CINARA

scolymus z. cardunculus z. humilis z.

cilié. sibérie. Z
à tête laineuse. F. &
à doubles épines. syrie. &
casabon. Eur. austr. or. &
étoilé. orient.
de Syrie.
sans tige. F. Z
arbrisseau. or. 5

2. Feuilles décurrentes.

des champs. F. &

lancéolé. F. &

Acarna. Esp. O

des marais. F. &

de Montpellier. F. &

des Pyrénées. &

blanchâtre. Autriche. &

CHARDON

panaché. F. m. \odot d'Arabie. \odot argenté. Égypte. \odot blanchâtre. Hongrie. σ crépu. F. \odot

fausse Bardane. Alpes. O

à feuilles d'Acanthe. F. ①

à fleurs tombantes. F. ①

fausse carline. Pyrénées. Z

intermédiaire. Pyrénées. Z

défleuri. Alpes. Z

à tête penchée. F. ♂

à feuilles glauques. Z

Marie. F. ♂

vert.

ONOPORDON

à feuilles d'Acanthe. F. & — vert.
d'Illyrie. & d'Arabie. & sans tige. pyrénées. &

ARTICHAUT

cultivé г. т. ұ (alim.) cardon. Barbarie. द (alim.) nain. Alger. or. ұ LEUZEA

conifera pec. Fl. centaurea conifera L.

CARLINA

subacaulis Dec. Fl.
chamæleon Vill. Delph.
caulescens Encycl.
acanthifolia All. Ped.
lanata L.
corymbosa L.
aggregata Willd. sp.
vulgaris L.

Atractylis cancellata L.

CARTHAMUS

- tinctorius L.
lanatus L.
creticus L.
cœruleus L.
mitissimus L.
corymbosus L.
Brotera corymbosa willd. sp.
salicifolius L. f.
carlowisia salicifolia Dec.
Ann.

ARCTIUM

Lappa L.

— tomentosa.
grandiflora.

STÆHELINA
dubia L.
chamæpeuce s. reg.
serratula chamæpeuce L.

SERRATULA

centauroides L.
tinctoria L.
quinquefolia marsch. cauc.
coronata L.
heterophylla pesf. Atl.
pinnatifida.
carduns radiatus wald. et
kitt. Hung.
alata.

LEUZÉA

conifere. Alpes. Z

CARLINE

à tige courte. Alpes. Z

à f. d'Acanthe. Alpes. ¥ (alim.)
laineuse. F. m. ①
corymbifère. Italie. or. 华
fasciculée. croatie. 华
commune. F. 3

ATRACTYLIS

chardon-prisonnier. F. m. O

CARTHAME

des teinturiers. Égypte. O
laineux. F. O
de Crète. O
bleu. Esp. Z
sans épines. F. Z
corymbifère. Tunis. or. Z

à f. de saule. canaries. or. 5

BARDANE

officinale. F. & (méd.)
— cotonneuse.
à grandes fleurs. F. &

Stéhélina

à f. de Romarin. F. m. or. 3)
chamepeucé, orient, or. 3)

SARRETTE

laciniée. sibérie. Z
des teinturiers r. Z
à cinq folioles. perse sept. Z
couronnée. sibérie. Z
à feuilles variables. Alpes. Z
pinnatifide. Hongrie. Z

punatifide. Hongrie. L'ailée. L'

II. Receptaculum setosum aut paleaceum; flosculi steriles in ambitu; semen papposum. (Polygamia frustranea.)

Zoegea L. mant.

CENTAUREA:

1. Squamæ calicinæ læves, nec ciliatæ, nec spinosæ.

crupina L.
Lippii L.
Amberboi Encycl.
suaveolens willd. sp. moschata L.
rhutenica Encycl.
centaurium L.
alpina L.

2. Squamæ calicinæ serrato-ciliatæ.

africana Encycl.

phrygia L.
Jacea L.
nigra L.
nigrescens willd. sp.
uniflora L. Mant.
pullata L.
montana L.
axillaris willd. sp.
seusana vill. pelph.
variegata Encycl.

- cyanus L.
 paniculata L.
 spinosa L.
 ragusina L.
 candidissima Encycl.
 cinerea Encycl.
 dealbata willd. sp.
 decumbens Pers. syn.
 scabiosa L.
- 3. Squamæ calicinæ aridæ, scariosæ, ciliato-serratæ.

atropurpurea wald. et kitt.

Hung.

orientalis L.

Balsamita Encycl.

II. Réceptacle garni de soies ou de paillettes; graines couronnées d'aigrettes; fleurons stériles à la circonférence. (Polygamie frustranée.)

ZoégéA d'Orient. ⊙ (orn.)

CENTAURÉE.

1. Ecailles du calice lisses, ni ciliées, ni épineuses.

à f. de condrille. F. m. ⊙
de Lippi. Egypte. ⊙

odorante. orient. ⊙ (orn.)

musquée. orient. ⊙ (orn.)
de Russie. ¥
grande. Italie. ¥
des Alpes. ¼
d'Afrique. Barbaric. ¼

2. Ecailles du calice dentées et ciliées.

plumeuse. Alpes. Z Jacée. F. W noire. F. W brune. Autriche. Z à une fleur. F. m. W à collerette. F. m. W de montagne. Alpes. Z

axillaire. Alpes. 72

Bluet. F. ① (orn.)

paniculée. F. ①

épineuse. orient. or. 5

de Raguse. orient. or. 5

très-blanche. Italie. or. ½

cendrée. Italie. or. 5

blanchâtre. Ibérie. ½

couchée. Alpes. ¼

scabieuse. F. ¼

3. Ecailles du calice desséchées, ciliées, dentées en scie.

noire-pourpre. Hongrie. ¥

d'Orient. or. ¥
à f. de Balsamite. orient. ⊙

4. Squamæ calicinæ scariosæ, integræ vel laceræ.

glastifolia L.
alata Encycl.
alba L.
picris Willd. sp.
splendens L.
Rhapontica L.
macrocephala Willd. sp.

5. Spinæ calicinæ palmatæ.

sonchifolia L.
ferox Desf. Atl.
seridis L.
aspera L.
napifolia L.
sphærocephala L.
prolifera Vent. H. cels.
straminea Willd. sp.
melitensis L.
sicula L.
solstitialis L.

6. Spinæ calicinæ compositæ.

verutum L. apula Encycl. eriophora L. benedicta L. calcitrapa L.

7. Squamæ calicinæ ciliatæ, spinâ terminatæ.

diffusa *Encycl*.

nultifida *Pers. syn.* }

pubescens *willd. sp.* }

collina *L*.

diluta *H*. *K*.

8. Squamæ calicinæ integræ; spinæ simplices.

salmantica L.

pumila L.

crocodylium L.

muricata L.

Galactites L.

Galactites tomentosa Dec.

Ann.

4. Ecailles du calice desséchées, entières ou déchirées.

à f. de Pastel. orient. Zz ailée. Tartarie. Zz blanche. Esp. Zz Picris. orient. or. Zz luisante. suisse. & Rhapontic. Alpes. Zz à grosse tête. 1bérie. Zz

5. Épines du calice palmées.

à feuilles de Laitron. F. m. O hérissée. Alger. L à feuilles de chicorée. Esp. L rude. F. m. L à feuilles de Navet. orient. O à tête ronde. Barbarie. O

prolifère. égypte. O

de Malte. ⊙ de Sicile. ⊙ du solstice. F. ⊙

6. Épines du calice rameuses.

à longues épines. orient. ①
de la Pouille. ①
à tête laineuse. Alger. ①
chardon·bénit. F. m. ② (méd.)
chausse=trape. F. ♂

7. Écailles du calice ciliées, terminées par une épine.

etalée. orient. Z

laciniée. Z

des collines. F. Z

rose-pâle. Eur. m. ①

8. Écailles du calice entières; épines simples.

de Salamanque. F. m. Z naine. Égypte. or. & à f. de vulnéraire. Égypte. O à fleurs de Bluet. Esp. O

panachée. F. m. o

III. Flosculi calice proprio cincti. (Polygamia segregata.)

ELEPHANTOPUS scaber L.

Sphæranthus indicus z.

LAGASCEA mollis willd. Enum.

OEdera prolifera L.

Echinops
sphærocephalus L.
Ritro L.
strigosus L.

IV. Receptaculum nudum; semina absque pappo; flosculi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

BALSAMITA

ageratifolia.

chrysanthemum flosculo
sum z.

suaveolens.

ranacetum Balsamita z.

annua.

ranacetum annuum z.

FLAVERIA

contrayerba willd. Enum.

milleria contrayerva. Encycl.

Conyzoides z.

Humea

elegans smith. Exot. Bot. calomeria amaranthoides vent. malm.

V. Receptaculum nudum, villosum aut paleaceum; semina nuda; flosculi fæminei in ambitu. (Polygamiu superflua.)

HIPPIA frutescens L. f.

Gymnostyles anthemisolia juss. Ann.

III. Fleurons entourés d'un calice partiel; (Polygamie sépacee.)

ELÉPHANTOPUS rude. inde. s. ch. ¥

BOULETTE

des Indes. s. ch. ψ

Lagascéa velouté. cuba. ⊙

OEDÉRA prolifère. cap. s. ch. 5

Echinops

à grosse tête. F Z

azuré. F. m. Z

à feuilles rudes. Esp. •

IV. Réceptacle nu; graines sans aigrettes; tous les fleurons hermaphrodites. (Polyganie égale.)

BALSAMITE

à f. d'Ageratum. crète. or. 5

odorante. F. m. Z

annuelle. Esp. O

FLAVÉRIA

contrayerva. pérou. O

ETHULIA

fausse conyse. inde.

HUMÉA

élégant. N. Holl. or. &

V. Réceptacle nu, velu ou garni de paillettes; graines nues; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamic superflue.)

HIPPIA
arbrisseau. cap. or. 9

GYMNOSTYLE à f. d'Anthémis. N. Holl. ⊙ TANACETUM
suffruticosum z.
vulgare z.
— crispum.
sibiricum z.

Carpesium cernuum z. abrotanoides z.

latifolia encycl. suppl.
maderaspatana encycl.suppl.
Artemisia maderaspatana z.
cotula maderaspatana willd.
sp.
minima encycl. suppl.
Artemisia minima z.
cotula minima willd. sp.

ARTEMISIA.

1. Herbacea; calices oblongi.

capillifolia Encycl.
vulgaris L.
palmata Encycl.
maritima L.
suaveolens Encycl.

2. Herbacea; calice hemispharico.

austriaca Jacq. Austr. annua L. leucanthemifolia. campestris L. neglecta willd. Enum. pracunculus L. inodora willd. Enum. biennis willd. sp. zeelandica Encycl. pectinata Pallas, Itin. sivertiana willd. sp. violacea. tanacetifolia L. glacialis z. rupestris L. insipida vill. pelph. Absinthium Z. pontica L.

TANAISIE

sous-arbrisseau. cap. or. 5
commune. f. \$\psi\$ (méd.)
— crépue.
de Sibérie. \$\pi\$

CARPESIUM

penché. F. &
à st. d'Aurone. chine.s.ch. Z

GRANGÉA

à larges feuilles. 1nde. ⊙

à feuilles sinuées. Inde. O

petit. inde. O

ARMOISE.

1. Tiges herbacées; calices oblongs.

capillaire. chine. or. Z commune. F. ¥ (méd.) palmée. Esp. or. Z maritime. F. Z odorante. F. Z

2. Tiges herbacées ; calice hémisphérique.

d'Autriche. T annuelle. sibérie. O à f. de Leucanthème. T des champs. F. T de Sprengel. sibérie. T Estragon. Tartarie. T (écon.) inodore. Daourie. T

bisannuelle. N. zélande. or. o.

pectinée. Daourie. ①
fausse Absinthe. sibérie. ②
à fleur violette. Z
à feuill. de Tanaisie. Alpes. Z
des glaciers. Alpes. Z
des rochers. Alpes. Z
insipide. Alpes. Z
Absinthe. F. Z (méd.)
de Pont. Z (méd.)

3. Fruticosa.

cœrulescens L.
corymbosa Encycl.
valentina Encycl.
Abrotanum L.
afra willd. sp.
chinensis L.
argentea l'Her. sert.
arborescens L.

Micropus

erectus *L*.
supinus *L*.
pygmæus.
Filago pygmæa *L*.

VI. Receptaculum nudum, rariùs paleaceum; semina papposa; flosculi fæminei in ambitu. (Polygamia superflua.)

FILAGO

montana z.
germanica z.
gallica z.
pyramidata z.
Leontopodion z.

Xeranthemum annuum z. inapertum z.

fulgidum willd. sp.
xeranthemum fulgidum z.f.)
retortum willd. sp.
xeranthemum retortum z.
bracteatum willd. enum.
xeranthemum bracteatum
vent. malm.

GNAPHALIUM.

1. Chrysocoma.

stæchas L.

— minor.
crassifolium Encycl. (non L.)
ovatum.
crassifolium L. Mant.
cymosum L.
orientale L.

1 12 3.

3. Tiges ligneuses.

bleuâtre. Italie. 5
corymbifère. Italie. 5
de Valence. Esp. or. 5
citronnelle. F. ni. 5 (méd.)
d'Afrique. cap. or. 5
moxa. chine. or. 5 (méd.)
argentée. canaries. or. 5
en arbre. F. ni. or. 5

Micropus à tige droite. F. ① couché. F. ①

nain. F. 🔾

VI. Réceptacle nu , rarement garni de paillettes ; graines aigrettées ; fleurons femelles à la circonférence. (Polygamie superflue.)

FILAGO

de montagne. F. ①
dichotome. F. ①
de France. ①
pyramidal. F. ①
Pied-de-lion. Alpes. ¥

XÉRANTHÈME annuel. F. ① (orn.) fermé. F. ①

ELICHRYSUM

éclatant. cap. or. & (orn.)

contourné. cap. or. 5

à grandes bractées. N. Holl. or.
& (orn.)

IMMORTELLE.

1. Fleurs jaunes.

stéchas. F. m. or. h (méd.)
— naine.
à feuilles épaisses. or. h
à feuilles ovales. cap. or. h
corymbifère. cap. or. h
d'Orient. or. h (orn.)

→ luteo-album L.

- feetidum L

- fætidum z. patulum z.

2. Argyrocoma.

diosmæfolium vent. Malm.
teretifolium L.
undulatum L.
spathulatum Encycl.
glomeratum.
serpyllifolium Encycl.
margaritaceum L.
dioicum L.
leyseroides Desf. Atl.
supinum L.
alpinum L.
sylvaticum L.
uliginosum L.

CONYZA et BACCHARIS neriifolia. Baccharis neriifolia z. ivæfolia. Baccharis ivæfolia L. halimifolia. Baccharis halimifolia z. pioscoridis. Baccharis dioscoridis z. odorata L. candida L. asteroides. Gouani. Erigeron Gouani L. thapsioides marsch. cauc. paniculata. ægyptiaca willd. sp. Erigeron ægyptiacum z. squarrosa L. rupestris L. Mant. sordida L. Mant.

Tussilago
alpina L.
Farfara L.
alba L.
Petasites L.
fragrans vill. pelph.

saxatilis L.

des sables. Allem. O jaune-blanche. F. O fétide. cap. O étalée. cap. or. 5

2. Fleurs blanches.

à f. de Diosma. cap. or. 5
à feuill. cylindriq. cap. or. 5
ondulée. Antilles. ©
en spatule. ©
agglomérée. N. Holl. or. L
à f. de serpolet. cap. or. 5
des jardins. Am. s. L (orn.)
Pied-de-chat. F. L (méd.)
à feuill. de Leysera. Tunis. ©
petite. Alpes. L
des Alpes. L
des bois. F. &
des marais. F. ©

CONYSE

à f. de Nérium. cap. or. 5
à feuilles d'Iva. Am. s. or. 5
à feuilles d'Halime. Am. s. 5
de Dioscoride. syrie. or. 5
odorante. Antilles. s. ch. 5
blanche. candie. or. 5
à feuilles d'Aster. s. ch. 5
de Gouan. canaries. or. 4
à feuill. de Molêne. caucase. 4
paniculée. ①

d'Egypte. or. L

rude. F. & des rochers. Barbarie. or. 5 à fleurs ternées. F. m. or. 5 à une fleur. F. m. or. 5

TUSSILAGE

des Alpes. ¥
pas-d'âne. F. ¼ (méd.)
blanc. F. ¥
pétasite. F. ¥
odorant. ¥ (orn.)

VII. Receptuculum nudum; semen papposum; flosculi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

CACALIA.

. I. Fruticosa.

laciniata Jacq. 1c. }
articulata z. f. }
papillaris z.
Anteeuphorbium z.
kleinia z.
Ficoides z.
cylindrica Encycl.
repens z. mant.
odorata.
reticulata vahl. symb.

2. Herbacea.

linaria cav. Ic.
Porophyllum L.
suaveolens L.
senecioides.
Petasites Encycl.
tomentosa Encycl.
alliariæfolia Encycl.
atriplicifolia L.
sagittata willd. sp.

CHRYSOCOMA

dichotoma L. f.

coma-aurea L.

cernua L.

biflora L.

dracunculoides Encycl.

Linosyris L.

juncea.

graminifolia L.

VERNONIA
novæboracensis willd. sp.
serratula novæboracensis z. }
præalta willd. sp.
serratula præalta z. }
anthelmintica willd. sp.
conyza anthelmintica z

LIATRIS

spicata willd. sp.
serratula spicata z.
squarrosa willd. sp.
serratula squarrosa z.

VII. Réceptacle nu; graine aigrettée; tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

CACALIA.

1. Tiges ligneuses.

mamelonné. cap. s. ch. p à feuilles ovales. cap. s. ch. p kleinia. canaries. s. ch. p Ficoïde. cap. s. ch. p cylindrique. cap. s. ch. p rampant. cap. s. ch. p odorant. N. Holl. or. p à réseau. Ile de F. s. ch. p

à f. linéaires. N. Esp. s. ch. ¼ à f. poreuses. Antilles. s. ch. Þ. suave. Am. s. ¼ à fleurs de seneçon. ¼ à f. de Tussilage. Alpes. ¼ cotonneux. Alpes. ¼ à f. d'Alliaire. Alpes. ¼ à f. d'Arroche. Am. s. ¼ à f. hastées. Java. ⊙ (orn.)

CHRYSOCOME

dichotome. canaries. or. b;
dorée. cap. or. b

penchée. cap. or. b

à deux fleurs. sibérie x

Linosyris. f. x

jonciforme. x

à f. de Gramen. Am. s. Z

VERNONIA

de Newyork. ¥ (orn.)

gigantesque. Am. s. 4 (orn.)

anthelmintique. Inde. s. ch. 14

LIATRIS

à épis. Am. s. 7

rude. Am. s. 75

EUPATORIUM.

1. Calix imbricatus, 3 ad 9 florus.

Houstonis L.

mikania Houstonis Willd. sp. delea L.

scandens L.

mikania scandens Willd. sp. deltissimum L.

cannabinum L.

syriacum Jacq. Ic.

sessilifolium L.

purpureum L.

maculatum L.

2. Calix imbricatus, decemflorus et ultrà.

atriplicifolium vahl. symb.
deltoideum jacq. H. sch.
perfoliatum L.
aromaticum L.
cœlestinum L.
ageratoides L. f.
fruticosum.

STEVIA

serrata cav. Ic.

Ageratum punctatum ortega,

Dec.

ivæfolia willd. Enum.

purpurea willd. Enum.

Eupatoria willd. Enum.

pedata cav. Ic.

Ageratum pedatum ortega,

Dec.

KUHNIA

rosmarinifolia vent. H. cels. Eupatorium canescens ortega, Dec.

Piqueria cav. ic.

AGERATUM conyzoides z. cœruleum.

CEPHALOPHORA glauca cav. Ic.

EUPATOIRE.

1. Calice imbriqué, renfermant 3-9 fleurs.

de Houston. Am. s. s. ch. b

de la Jamaïque. s. ch. b

grimpante. Am. s. or. ¥
élevée. Am. s. or. ¥
à f. de chanvre. f. ¼ (méd.)
de Syrie. ¥
à feuilles sessiles. Am. s. ¼
pourpre. Am. s. ¼
maculée. Am. s. ¼

2. Calice imbriqué, renfermant 10 ou un plus grand nombre de fleurs.

à f. d'Arroche. Ant. s. ch. b deltoïde. s. ch. II perfoliée. Am. s. II aromatique. Am. s. II à f. de scorodonia. Am. s. II agératoïde. Am. s. II ligneuse. or. b

STÉVIA

à f. en scie. mexique. or. Z

à f. d'Iva. mexique. or. Z

pourpre. mexique. or. Z

fausse Eupatoire. mexiq. or. Z

en pédale. cuba. O

KUHNIA

à f. de Romarin. cuba.s.ch. p

PIQUÉRIA à trois nervures. Mexiq. s. ch. Z

AGÉRATUM
fausse conyse. Antilles.
à fleurs bleues. Antilles.

CÉPHALOPHORA
glauque. chili. or. ¥

VIII. Receptaculum villosum aut paleaceum; semen nudum aut subnudum.

Calea aspera Jacq. 1c.

TARCHONANTHUS camphoratus z.

ATHANASIA

annua L.

trifurcata L.

crithmifolia L.

parviflora L. Mant.

tricuspis.

DIOTIS

maritima Desf. Atl.

Athanasia maritima L.

chamæcyparissus L.
rosmarinifolia L.
tomentosa.
eriosperma pers. syn.
pinnata viv. Fragm.

Anacyclus aureus L. mant.

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum; pappus nullus.

aurea z.
anthemoides z.
coronopifolia z.
turbinata z.
zidbeckia turbinata willd.

Bellis annua z. perennis z.

MATRICARIA

parthenium L.

parthenioides.

VIII. Réceptacle velu ou garni de paillettes; graines sans aigrette.

CALÉA
à feuilles rudes. Antilles. O

TARCONANTE camphré, cap. or. 5

ATHANASIA

annuel. f. m. ①

trifurqué. cap. or. b

à f. de Bacelle. cap. or. b

à petites fleurs. cap. or. b

à trois pointes. cap. or. b

Diotis

maritime, f. m. or. Z

SANTOLINE

commune. F. m. h

à f. de Romarin. Esp. or. h

cotonneuse. Esp. or. h

à tête laineuse. Italie. or. V

ANACYCLUS jaune. F. m. 🔾

ORDRE III.

RADIÉES.

1. Réceptacle nu ; graines sans aigrette.

COTULA

jaune. Esp. ①

à feuilles d'Anthémis. Esp. ①

corne-de-cerf. cap. ①

conique. cap. ①

PAQUERETTE
annuelle. F. ②
vivace. F. Z (orn.)

MATRICAIRE
officinale. F. ¥ (méd.)
inodore. ¥

chamomilla z.
suaveolens z.
capensis z. mant.

CHRYSANTHEMUM.

1. Leucanthema.

Fruticosa.

frutescens L.

Pyrethrum frutescens willd.

sp.

pinnatifidum L. f.
grandiflorum.

Pyrethrum grandiflorum

willd. Enum.

asteroides.

Herbacea.

præaltum vent. H. cels. ryrethrum partheniifolium willd. Enum. pulverulentum. Pyrethrum pulverulentum willd. Enum. corymbosum L. pyrethrum corymbosum willd. sp. tenuifolium. pyrethrum tenuifolium willd. coccineum willd. sp. Pyrethrum roseum willd. Enum. serotinum L. pyrethrum serotinum willd. Leucanthemum L. maximum Ramond. Bull. pyrethrum latifolium willd. grandiflorum Lapeyr. Pyr. ceratophylloides All. Ped. arcticum L. montanum L. Balsamita L. pyrethrum Balsamita willd.

camomille. F. ⊙ odorante. F. ⊙ (méd.) du Cap. ⊙

CHRYSANTHÈME.

I. Fleurs blanches ou roses.

Tiges ligneuses.

arbrisseau. canaries. or. 5

pinnatifide. canaries. or. 5

à grandes fl. canaries. or. 5

astéroïde. s. ch. 5

Tiges herbacées.

à f. de matricaire. caucase.

pulvérulente. ibérie. T

corymbifere. F. Z

à feuilles menues. caucase. Z

rose. Ibérie. 7

d'automne. Am. s. Z

grande Marguerite. F. Z

à larges feuilles. pyrénées. 76

à feuilles cornues. Alpes. Za du Caucase. Za des montagnes. F. ¥

Balsamite. or. T

multifidum.

pyrethrum pinnatifidum

willd. sp.

matricaria tanacetifolia En
cycl. Excl. syn. Tourn.

monspeliense L.

alpinum L.

pyrethrum alpinum willd.

sp.

carinatum schousb. maroc.

2. Chrysanthema.

miconis L.

segetum L.

coronarium L.

Roxburghii.

pyrethrum indicum H. K.

CALENDULA

arvensis L.

- officinalis L.

stellata cav. 1c.

hybrida L.

pluvialis L.

fruticosa L.

chrysanthemifolia vent. malm.

flaccida vent. malm.

MADIA

viscosa cav. Ic.

OSTEOSPERMUM

moniliferum L. Vel pis Herum.

spinosum L. pinnatifidum l'Her. stirp.

MILLERIA

quinqueslora z.

ERIOCEPHALUS africanus L.

II. Receptaculum nudum; semina papposa.

BELLIUM

bellidioides L. mant.

HELENIUM

autumnale L. quadridentatum Bill. soc. nat.

PECTIS

prostrata cav. ic.

lacinié. v

de Montpellier. F. W

des Alpes. T

caréné. Maroc. 🕥

2. Fleurs jaunes.

à feuilles entières. F. ①

des moissons. F. ②

des jardins. F. m. ①

de koxburgh. inde. O

Souci

des champs. F. ①
cultivé. F. ② (écon.)
étoilé. Esp. ②
hybride. cap. ②
des pluies. cap. ②
arbrisseau. cap. s. ch. 5
à f. de chrysanthême. cap.
or. 5
à fleurs rougeatres. cap. or. 5

MADIA

visqueux. chili. O

Ostéosperme à colliers. cap. or. 5 épineux. cap. or. 5 pinnatifide. cap. or. 5

MILLÉRIA
à cinq fleurs. Am. m. 🔾

ERIOCÉPHALE
d'Asrique. cap. or. 5

II. Réceptacle nu ; graines aigrettées.

BELLIUM

fausse paquerette. Italie.

HÉLÉNIUM

d'automne. Am. s. ¥ à quatre dents. Am. s. ¥

PECTIS

couché. N. Esp. s. ch. ¥

SCHKUHRIA SKURIA abrotanoides noth. cat. pectis multifida ortega, pec. à f. d' Aurône. mexique. O rectis bipinnata Lamk. Journ. d'Hist. nat. TAGETES TAGÉTÈS erecta L. OEillet-d'inde. Mexiq. O (orn.) patula L. touffu. mexique. (orn.) lucida cav. 1c. luisant. N. Esp. or. Z tenuifolia cav. rc. à feuilles étroites. Pérou. O minuta z. à petites fleurs. chili. O BOEBERA BOEBÉRA chrysanthemoides willd. sp.) à f. de chrysanthême. Am. s.O Tagetes papposa vent. H. cels. DORONICUM DORONIC pardalianches z. Pardalianches. Alpes. 女 plantagineum L. à feuilles de Plantain. F. W Arnica Arnica. F. 4 (med.) Arnica montana L. Bellidiastrum L. Arnica Bellidiastrum willd. à fleurs de Paquerette. Alpes. Z GORTERIA GORTÉRIA ringens L. à grandes fl. cap. or. 4 (orn.) pectinata willd. sp. à f. pennées. cap. or. 4 (orn.) GRINDELIA GRINDÉLIA inuloides willd. Enum à fleurs d'Aunée. Mexiq. or. 5 INULA AUNÉE Helenium L. officinale. f. L (méd.) verbascifolia. à feuilles de molène. Y bifrons z. décurrente. F. 72 oculus-christi Encycl. (non L.) OEil-de-christ. F. Z britannica z. britannique. F. Z dysenterica L. dysentérique. F. Z pulicaria z. pulicaire. F. O arabica L. mant. d'Arabie. or. ¥ gnapholodes vent. H. cels. crépue. Égypte. O Aster crispus Forsk. Fl. squarrosa L. rude. F. Z spiræifolia Encycl. salicina L. à feuilles de saule. F. 75 ensisolia z. ensiforme. F. T crithmoides L. criste marine. F. h hirta L. velue. F. T montana L. de montagne. F. 😮

	vaillantii All. Ped.	cendrée. F. Z
	viscosa. Erigeron viscosum L.	visqueuse. F. m. or. ¥
	graveolens.	fétide. F. ⊙
	tuberosa.	tubéreuse. F. m. or. Z
•	glutinosa.	glutineuse. mexique. or. b
-	Aster glutinosus cav. 1c.	
ER	IGERON	ERIGERON
	canadense L.	de Canada. F. 🕥
	siculum L.	de Sicile. F. m. 🕥
0	bonariense.	à feuilles de Lin. 🔾
4	longifolium.	à longues feuilles. Am. s.
	annuum. Aster annuus L .	à fleurs blanches. Am. s. O
	delphinifolium willd. Hort.	à f. de Delphinium. Am. m. s. ch. o
	philadelphicum z	de Philadelphie. ¥
	amplexicaule.	amplexicaule. Am. s. T
	alpinum L.	des Alpes. K
	villarsii Bellardi, App. } atticum vill. Delph.	de Villars. Alpes. T
,	acre L.	ácre. F. 🔾
	fætidum L.	fétide. cap. or. &
	(viscosum.	
	Psiadia glutinosa Jacq. H.	visqueux. Antilles. s. ch. 3
	sch.	,
7D _	*	BOLTONIA
றம	LTONIA	
- 4	asteroides l'Her. sert.	à fleurs d'Aster. Am. s. V
	glastifolia l'Her. sert.	à feuilles de Pastel. Am. s. ¥
As	TER	ASTER
	liratus Bot. Magaz.	sillonné. N. Holl. or. h
	argophyllus Bill. n. Holl.	blanchätre. N. Holl. or. b
	tomentosus willd. sp.	cotonneux. N. Holl. or. 5
	dentatus Andr. Rep. \(\) cymbalariæ H. K.	cymbalaire. cap. or. 19
	fruticosus L.	arbrisseau. cap. or. 5
	argenteus Mich. Fl.	•
	sericeus Vent. H. cels.	satiné. Am. s. b
	lithospermifolius.	à feuilles de grémil. Z
	tenellus L.	fragile. cap. ①
	chrysocomoides.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	conyza chrysocomoides. pesf.	changeant. Barbarie. or. 9
	Atl.	5 control Bully and a cont
	,	

Tripolium L. alpinus L. pyrenæus. Amellus L. amygdalinus Encycl. leucanthemus. carolinianus willd. sp. linifolius z.? acris L. trinervis. æstivus willd. sp. punctatus willd. sp. dracunculoides Encycl. diversifolius mich. Fl. adulterinus willd. Enum. amplexicaulis Encycl. decorus. novæ-angliæ L. cordifolius L. corymbosus willd. sp. patulus Encycl. rubricaulis Encycl. lævigatus Encycl. longifolius Encrel. amoenus Encycl. concinnus willd. Enum. novi-belgii L. paniculatus Encycl. salignus willd. sp. versicolor willd. sp. subulatus mich. Fl. inflexus. salicifolius Encycl. strictus. Tradescanti L. macrophyllus z. coridifolius mich. Fl. ericoides z. vimineus Encycl. tenuifolius z. fragilis willd. sp. rigidulus. grandiflorus L. chinensis z.

miser z.

Solidago.

maritime. F. o des Alpes. V des Pyrénées. Z Amelle. F. T (orn.) å f. d'Amandier. Am. s. T à fleurs blanches. T de Caroline. Z à feuilles de Lin. Am. s. V acre. F. m. V à trois nervures. T d'été. Am. s. T ponetué. Hongrie. T à feuilles d'Estragon. E à feuilles variables. Am. s. T adultérin. Am. s. Z amplexicaule. Am. s. ¥ (orn.) d'ornement. L de la Nouv.-Anglet. w (orn.) à f. en cœur. am. s. \u03c4 (orn.) corymbifere. Am. s. W étalé. Am. s. Z (orn.) à lige pourpre. Am. s. T glabre. Am. s. T (orn.) à feuilles longues. Am. s. T luisant. Am. s. T à grappes serrées. Am. s. Z paniculé. Am. s. T

de Hongrie, & bigarré. Am. s. ¥ en alêne. Am. s. K courbé. To à feuilles de saule. Am. s. L ramassé. Z de Tradescant. Am. s. Z à larges feuilles. Am. s. Z à fauilles de coris. Am. s. T. à feuill. de Bruyère. Am. s. L flexible. Am. s. 72 à feuilles minces. Am. s. T fragile. Am. s. T à feuilles rudes. Z à grandes fl. Am. s. V (orn.) Reine - marguerite. chine. O (orn.) grêle. am. s. T

FERGE-D'OR.

y. Ramuli secundi patuli.

sempervirens L.
elliptica Encycl. (an Willd.?)
canadensis L.
glabra.
nutans.
procera H. K.
aspera H. K.
conferta Encycl.

2. Racemi erecti.

integrifolia.
multiflora.
mexicana L.
latifolia L.
bicolor L. Mant.
flexicaulis L.
virga-aurea L.
alpestris wald. et Kitt. Hung.
corymbosa.
minuta L.
rigida L.
petiolaris willd. sp.
hirta willd. Enum.?
arenaria.
gracilis Encycl.

geifolia L. lobata l'Her. sert. alpina willd. sp. amelloides L. maritima L. populifolia l'Her. sert. appendiculata L. f. aurita l'Her. sert. lanata l'Her. sert. cruenta l'Her. sert. alliariæfolia. præcox cav. 1c.

SENECIO.

1. Flores flosculosi.

- { cernuus L. f. rubens Jacq. Hort. }

hieracifolius L.

vulgaris L.

1. Grappes unilatérales étalées.

toujours verte. Am. s. Ze elliptique. Am. s. Ze de Canada. Ze (orn.). glabre. Am. s. Ze (orn.) à tête penchée. Am. s. Ze (orn.) élevée. Am. s. Ze (orn.) rude. Am. s. Ze (orn.) à grappes serrées. Ze

2. Grappes redressées.

à feuilles entières. Am. s. L'
à fleurs nombreuses. L
du Mexique. L
à larges feuilles. Am. s. L'
de deux couleurs. Am. s. L
tortueuse. Am. s. L
des bois. F. L
des rochers. Hongrie. L
corymbifère. L
petite. L.
à feuilles dures. Am. s. L
à feuilles pétiolées. Am. s. L
velue. Am. s. L
des sables. L
grêle. L

CINÉRAIRE

à feuilles de geum. cap. or. E
lobée. cap. or. 5
des Alpes. T
à fleurs d'Amelle. cap. or. 5
maritime. F. E
à f. de peuplier. canar. or. E
auriculée. canaries. or. 5
laineuse. canaries. or. 5
pourpre. or. T
à feuilles d'Alliaire. or. E
précoce. Mexique. s. ch. 5

SENEÇON.

1. Fleurs flosculeuses.

à fleurs penchées. inde. O
à f. d'épervière. Am. s. O
commun. F. O

arabicus L. Mant.
reclinatus l'Her. stirp.
discolor.
glomeratus.

2. Flores radiati; ligulis revolutis.

ægyptius L.
sylvaticus L.
viscosus L.
coronopifolius pesf. Atl.

3. Flores radiati; radio patente; foliis pinnatifidis.

chrysanthemifolius Encycl. elegans L.

Jacobæa L.
erucifolius L.
lycopifolius.
tenuifolius s. reg.
parviflorus All. red.
incanus L.
nebrodensis L.

4. Flores radiati; radio patente; foliis indivisis.

paludosus L.
saracenicus L.
nemorensis L.
Doria L.
coriaceus H. K.
Doronicum L.
longifolius L.
halimifolius L.
rigidus L.

OTHONNA

cheirifolia L.

coronopifolia L.

pectinata L.

III. Semina non papposa; receptaculum paleaceum.

ANTHEMIS.

1. Floribus radio albo.

cota-L.
altissima L.
rigescens willd. Enum.
maritima L.

d'Arabie. Égypte. ⊙
recliné. cap. or. ¥
de deux couleurs. or. 为
aggloméré. N. Holl. ⊙

2. Fleurs radiées; demi-fleurons réfléchis.

d'Egypte. ①
des bois. f. ①
visqueux. f. ①
corne-de-cerf. Barbarie. ②

3. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles pinnatissides.

à f. de chrysanthême. sicile. violet. cap. (orn.)
Jacobée. F. W
à feuilles de Roquette. F. Z
à feuilles de Lycopus. Z
à feuilles menues. F. Z
à petites fleurs. Alpes. Z
blanc. Alpes. Z
à feuill. de Paquerette. Esp. ()

4. Fleurs radiées; demi-fleurons horizontaux; feuilles entières.

> des marais. F. T traçant. F. T des forêts. F. T Doria, F. M. T à f. de Limonium. orient. T Doronic. Alpes. T à feuilles longues. cap. or. 5 à feuill. d'Halime. cap. or. 5 rude. cap. or. 5

OTHONNA

spatule. Tunis. Z

corne-de-cerf. cap. or. 5

pectiné. cap. or. 5

III. Graines sans aigrette; réceptacle garni de paillettes.

ANTHÉMIS.

r. Demi-fleurons blancs.

piquante. Italie. ①
élevée. F. m. ①
à feuilles rudes. caucase. ¥
maritime. F. 4,

mixta L.
montana L.
arvensis L.
clavata Desf. Atl.
cotula L.
nobilis L.
austriaca Jacq. Austr.

tinctoria L.
valentina L.
— bicolor.
arabica L.
grandiflora Ramatuelle,
Journ d'Hist. nat.
artemisiæf lia Willd. sp.
chrysanthemum indicum
Bot. Magaz. (non L.)
ovalifolia ortega, Dec.
bupthalmoides Willd. sp.
globosa ortega, Dec.
triloba ortega, Dec.

ACHILLEA.

1. Corollis radio luteo.

santolina L.
falcata L.
tenuifolia Encycl.
Ageratum L.
ægyptiaca L.
bipinnata L.
Tanacetum myriophyllum
willd. sp.
pubescens L.
pauciflora Encycl.
decumbens Encycl.
abrotanifolia L.

semipectinata.
filipendulina Encycl.
partheniifolia.
velutina.
pectinata willd sp.
ochroleuca wald. et kitt.
Hung.
flosculosa Pers. syn.

2. Corollis radio albo aut purpureo. macrophylla L.

corne-de-cerf. F. ⊙

des montagnes. Alpes. ¥

des champs. F. ⊙

en massue. Barbarie. ⊙

fétide. F. ⊙

camomille. F. ¾ (méd.)

d'Autriche. ¥

2. Demi-fleurons jaunes ou violets.

des teinturiers. Alpes.

de Valence. F. m.

— de deux couleurs.

d'Arabie. Alger.

à grandes fleurs. chine. 5 (orn.)

à f. ovales. pérou. s. ch. Z globuleuse. mexique. or. Z à trois lobes. N. Esp. or. Z

MILLEFEUILLE.

1. Demi-fleurons jaunes.

santoline. orient. or. It
falciforme. orient. or. It
à f. menues. orient. or. It
Eupatoire. F. m. It (méd.)
d'Egypte. orient. or. It

bipennée. orient. ¥

pubescente. orient. Z
à fleurs rares. orient. Z
tombante. Z
à feuill. de citronnelle. orient.
or. Z
semipectinée. Z
à f. de Filipendule. orient. Z
à feuilles de Parthenium. Z
veloutée. Z

pectinée. Hongrie. ¥

flosculeuse. T

2. Demi-fleurons blancs on pourpres.
à grandes feuilles. Alpes. T

sambucifolia. chrysanthemum macrophylà feuill. de sureau. Hongrie. Z lum wald. et Kitt. Hung. dracunculoides. Leucanthema Pers. syn. s à f. d'Estragon. caucase. ¥ clavennæ L. corne-de-cerf. Alpes. ¥ Herba-rota L. cuneifolia Encycl. cunéiforme. Alpes. & serrata Retz. obs. à feuilles en scie. decolorans willd. Enum. décolorante. Z speciosa willd. Enum. élégante. ¥ Ptarmica L. sternutatoire. F. Z (méd.) alpina L. des Alpes. T sibirica. de Sibérie. L impatiens L. pectinée. sibérie. 4 magna All. Ped. compacta Encycl. § compacte. Alpes. w nana L. naine. Alpes. Z lanata Encycl. nobilis z. odorante. Alpes. T ligustica All. Ped. fasciculée. Alpes. Z setacea wald. et Kitt. Hung. sétacée. нопgrie. Т millefolium L. commune. F. Z (méd.) - purpureum. -pourpre. (orn.) rose. Am. s. Z (orn.) aspleniifolia vent. H. cels. PARTHENIUM PARTHENIUM - hysterophorus z. lacinié. Antilles. O - integrifolium L. à feuill. entières. Am. s. or. # BUPHTALMUM BUPHTALMUM frutescens L. arbrisseau. Am. s. or. 1) arborescens, L. arbre. Antilles. s. ch. 5 sericeum L.f. satiné. canaries. or. h cordifolium wald. et kitt. à feuilles en cœur. Hongrie. Z inula caucasica pers. syn. aquaticum z. aqualique. F. O maritimum z. maritime. F. L spinosum L. épineux. f. O grandiflorum L. à grandes fleurs. F. V. procumbens. couché. v SIGESBECKIA SIGESBECKIA orientalis L. d'Orient. mde. O flosculosa l'Her. stirp. flosculeux. Pérou. O ECLIPTA ECLIPTA erecta s. veg. à tige droite. Inde O prostrata L. Mant. couché. Inde. ()

E.

BALTIMORA BALTIMORA à tige droite. Am. s. 💿 erecta L. Mant. DYSODIUM DYSODIUM divaricatum pers. syn. étalé. Am. m. 🕥 ALCINA perfoliata cav. 1c. persolié. mexique. O DAHLIA DAHLIA superflua. Georgina superflua Dec. Ann. superflue. mexique. 4 (orn.) Georgina variabilis willd. Enum. -pourpre. - purpurea. -rouge. - rubra. —lilas. -lilacina. -pâle. - pallida. - flavescens. — jaunâtre. frustranea. frustranée. mexique. Z (orn.) Georgina frustranea Dec. Ann. - safranée. - crocea. - flava. - jaune. MÉLAMPODIUM MELAMPODIUM à feuill. longues. mexique. O longifolium willd. Enum. POLYMNIA POLYMNIA à larges feuilles. Am. s. 4: uvedalia L. ENCÉLIA ENCELIA halimifolia cav. Ic. à f. d'Halime. N. Esp. s. ch. ъ pallasia grandiflora willd.sp. canescens cav., Ic. à f. blanches. mexiq. s. ch. 5 pallasia halimifolia willd. sp. s XIMÉNÉSIA XIMENESIA à f. d'encélia. mexique. O encelioides cav. Ic. SCLEROCARPE SCLEROCARPUS d'Afrique. 0 africanus Jacq. 1e. SILPHIUM > SILPHIUM laçiniatum z. lacinié. Am. s. Z (orn.) terebinthinaceum Jacq. Hort. à f. en cœur. Am. s. 4 (orn.) perfoliatum L. perfolié. Am. s. Z à feuilles réunies. Am. s. L connatum L. Mant. à feuilles ternées. Am. s. Z trifoliatum L. trifolié. Am. s. T ternalum. à feuilles rudes. Am. s. Z scabrum. COREOPSIS COREOPSIS

auriculata z.

auriculé, Am. s. 74

tripteris L.
verticillata L.
— delphinifolia Encycl.
ferulæfolia Jacq. H. sch.
alternifolia L.
alata cav. 1c.

Cosmos

bipinnata cav. 1c.

RUDBECKIA

laciniata L.

— angustifolia.

pinnata vent. H. cels. }

digitata willd. sp.

aspera.

chrysomela mich. Fl. }

triloba L.

hirta L.

purpurea L.

amplexicaulis Bosc. soc. nat. }

perfoliata cav. 1c.

SANVITALIA

villosa cav. 1c.

Lorantea atropurpurea or
tega, Dec.

IV. Semina papposa; receptaculum paleaceum.

HELIANTHUS

annuus L. - multiflorus z. tuberosus L. mollis Encycl. pubescens vahl. symb. canescens mich. Fl. tubæformis Jacq. H. sch. atrorubens Encycl. (non L.) altissimus L. virgatus Encycl. giganteus L. angustifolius L. strumosus encycl. (an L.?) divaricatus L. lævis L. Buphtalmum helianthoides L. Heliopsis lævis Pers. syn. procumbens pers. syn. dentatus cay. 1c.

à trois ailes. Am. s. Z verticillé. Am. s. Z à f. de Delphinium. Am. s. Z à f. de Férule. Mexiq. or. Z à feuilles alternes. Am. s. Z ailé. Mexique. or. Z

Cosmos

bipenné. mexique. O

lacinié. Am. s. Z (orn.)

— à feuilles étroites.

à feuilles pennées. Am. s. Z

rude. Am. s. &

trilobé. Am. s. &

velu. Am. s. &

pourpre. Am. s. or. & (orn.)

amplexicaule. Mexique. ©

SANVITALIA

velu. N. Esp. 🕥

IV. Graines aigrettées; réceptacle garni de paillettes.

SOLEIL

cultivé. pérou. (orn.) à fleurs nombr. Am. s. 4 (orn.) Topinambour. Brésil. 4 (alim.)

cotonneux. Am. s. T

rensté. mexique. ①
noir-pourpre. Am. s. 华 (orn.)

élevé. Am. s. T

gigantesque. Am. s. T à feuilles étroites. Am. s. T fusiforme. Am. s. T étalé. Am. s. T

lisse. Am. s. T

couché. pérou. or. 26 denté. mexique. or. 4

GALARDIA

pulchella Fougeroux, Acad. \
virgilia helioides l'Her. Gen. \

GALINSOGA

GALINSOGA parviflora *cav. ic.* triloba *cav. ic.*

Paschalia glauca ortega, pec.

BALBISIA
elongata willd. sp.
Amellus pedunculatus ortega, pec.

Amellus Lychnitis L.

ZINNIA

pauciflora L.

multiflora L.

verticillata Andr. Rep.

{ violacea cav. Ic. }

elegans Jacq. Ic. }

revoluta cav. Ic.

tenuiflora Jacq Ic. }

VERBESINA
gigantea Jacq. Ic.
atriplicifolia Encycl.
fruticosa L.
serrata cav. Ic.
alata L.
nodiflora L.
synedrella nodiflora Gærtn.
Fruct.
mutica L.
wedelia carnosa Persoon. syn.
Buphtalmum repens willd.

Heterosperma pinnata cav. 1c.

BIDENS
tripartita L.
cernua L.

frondosa L.
pilosa L.
bullata L.

GALARDIA

élégante. Louisiane. O (orn.)

à petites fleurs. pérou. ⊙
à trois lobes. N. Esp. ⊙

PASCHALIA
glauque. chili. s. ch. и

BALBISIA

à longs pédoncules. mexiq. O

Amellus bleu. cap. or. 5

ZINNIA

à fleurs rares. pérou. ① (orn.)
à fleurs nombr. Louis. ② (orn.)
verticillé. mexique. ②

violet. mexique. ② (orn.)
à fleurs renversées. mexiq. ②
(orn.)

gigantesque. Antilles. s. ch. p à feuilles d'Arroche. s. ch. p arbrisseau. Antilles. s. ch. p à f. en scie. mexiq. s. ch. p ailée. curação. s. ch. ¥

nodiflore. Am. m. O

rampante. Antilles. s. ch. 4

HÉTÉROSPERME à feuilles pennées. N. Esp. O

BIDENS

trifolié. F. ①

penché. F. ①

feuillu. Am. s. ①

velu. Antilles. ①

bulleux. Italie. ①

mivea z.

melananthera hastata mich.

fl.

bipinnata z.

multifida.

pauciflora encycl. suppl. {

serrulata.

coreopsis serrulata encycl.

suppl.

heterophylla orteg. pec.

SPILANTHUS

- oleracea s. veg. fusca.
Alcinella z. mant.

AGRIPHYLLUM

spinosum.
Gorteria spinosa z.
Berckeya incana willd. sp.
Rohria incana Thunb. prodr.
ciliare.
Gorteria ciliaris z.
Berckeya ciliaris willd. sp.
Rohria ciliaris Thunb. prodr.

ARCTOTIS

tristis z.
plantaginea z.
reptans Jacq. H. sch.
aspera z.
grandiflora Jacq. H. sch.
revoluta Jacq. H. sch.

à fleurs blanches. Am. s. O

bipenné. Am. s. ①
lacinié. ①

à feuilles en scie. O

à feuilles var. n. esp. or. 4

SPILANTHUS

cresson de Para. Inde. (méd.)
brun. Am. m. (méd.)
Alcmella. Inde. ()

AGRIPHYLLUM

épineux. cap. or. 5

cilié. cap. or. 3

ARCTOTIS

à fleurs pâles. cap. ⊙
à f. de Plantain. cap. or. ↓
rampant. cap. or. ↓
à feuilles rudes. cap. or. ゥ
à grandes fleurs. cap. or. ゥ
recourbé. cap. or. ⊙

CLASSIS XI.

DICOTYLEDONES

MONOPETALE.

(Corolla epigyna; antheræ distinctæ.)

ORDO I.

DIPSACEÆ.

MORINA persica L.

CLASSE XI. DICOTYLÉDONS

MONOPÉTALES.

(Corolle sur le pistil; anthères distinctes.)

ORDRE I.

DIPSACÉES.

MORINE
de Perse. & (orn.)

DIPSACUS
sylvestris willd. sp.
fullonum willd. sp.
laciniatus L.
pilosus L.

SCABIOSA.

1. Corollis quadrifidis.

alpina L.
tatarica L.
rigida L.
syriaca L.
dichotoma Encycl. }
centauroides Encycl.
corniculata wald. et kitt.
Hung.
leucantha L.
succisa L.
arvensis L.
sylvatica L.
miontana Marsch. cauc.
integrifolia L.

2. Corollis quinquefidis.

columbaria L. ochroleuca L. banatica wald. et kitt. Hung. suaveolens Dec. Fl. lucida vill. pelph. setifera Encycl. uniseta savi. urceolata Desf. All. rutæsolia valh. symb. divaricata Encycl. argentea L. sicula L. Mant. divaricata Jacq. Austr. stellata L. parviflora Desf. Atl. dichotoma cirillo, pec. prolifera L. atropurpurea L

- atropurpurea L
africana L.
caucasica marsch. cauc.
cretica L.
graminifolia L.
palæstina L. mant.

A Day

DIPSACUS

sauvage. F. & chardon-bonnetier. F. & (arts.) lacinié. F. & velu. F. O

SCABIEUSE.

1. Corolles à 4 divisions.

des Alpes. F. Z
de Tartarie. &
à feuilles dures. cap. or. 5
de Syrie. ©
fausse centaurée. F. m. Z
cornue. Hongrie. Z
à fleurs blanches. F. m. Z

à fleurs blanches. F. m. Z tronquée. F. Z (méd.) des champs. F. Z (méd.) des bois. F. Z (méd.) de montagne. caucase. & à feuilles entières. F. O

2. Corolles à 5 divisions.

colombaire. F. V jaune-pâle. F. & de Hongrie. & odorante. F. V luisante. Alpes. V sétifère. Italie. O à une soie. Italie. V

urcéolée. Barbarie. Z

argentée. orient. or. 74

de Sicile. 🔾 🖟

étoilée. F. m. 🔾

à petites fleurs. Barbarie. O

prolifère. orient. ①
des jardins. inde? ① (orn.)
d'Afrique. or. 为
du Caucase. Z (orn.)
de Crète. or. 为
à feuilles de Gramen. F. Alpes.
de Palestine, or. 其

1.1.1 1.

KNAUTIA
orientalis z.
plumosa z. mant.

ORDO II.

VALERIANEÆ.

- Valeriana
- rubra z.
angustifolia All. ped.
calcitrapa z.
dioica z.
officinalis z.
phu z.
tripteris z.
montana z.
tuberosa z.
celtica z.
saxatilis z.
pyrenaica z.

FEDIA

cornucopiæ vahl, sp.
olitoria vahl, sp.
vesicaria vahl, sp.
coronata vahl, sp.
echinata vahl, sp.
sibirica vahl, sp.

ORDO III.

RUBIACEÆ.

J. Fructus dicoccus dispermus; stamina sæpè 4.

SHERARDIA arvensis L. muralis L.

ASPERULA

arvensis L.
odorata L.
galioides Marsch. cauc.
taurina L.
cynanchica L.
tincteria L.
calabrica L. f.

KNAUTIA
d'Orient. ⊙
plumeux. orient. ⊙

ORDRE II.

VALÉRIANÉES.

rouge. F. V (orn.)
à feuilles étroites. F. V
chausse-trape. orient. ()
dioïque. F. V
officinale. F. V (méd.)
Phu. F. V
à feuilles ternées. Alpes. V
de montagne. Alpes. V
tubéreuse. Alpes. V
Nard-celtique. Alpes. V
des rochers. Alpes. V
des Pyrénées. V

FÉDIA

corne-d'abondance. Barb. O

mâche. F. O (alim.)

vésiculeuse. orient. O

couronnée. F. O

hérissée. F. O

ORDRE III.

RUBIACÉES.

I. 2 graines accolées; ordinairement 4 étamines.

SHÉRARDIA

des champs. F. O

des murailles. F. O

de Sibérie. 3

ASPÉRULE

des champs. F. ©
odorante. F. Z
à f. de caillelait. caucase. Z
de Turin. Alpes. Z
à l'esquinancie. F. Z
des teinturiers. F. Z
de Calabre. or. 5

1. Fructu glabro.

palustre L. uliginosum z. læye Dec. Fl. umbellatum Encycl. Bocconi All. Ped. nitidulum Thuil. Fl. verum L. rubrum L. purpureum Dec. Fl. (non L.) rubrum nec. fl. purpureum L. mollugo L. provinciale Encycl. lucidum pers. syn. (excl. syn.) megalospermum pec. Fl. arenarium Lois. Fl. tyrolense willd. Enum. spurium L. glaucum z. rubioides L. sylvaticum L. linifolium Encycl. pumilum Encycl. trichophyllum All. ped. anglicum smith, Fl.

2. Fructu hispido aut aspero.

divaricatum Encycl.

tricorne smith, Fl.

rotundifolium L.

Aparine L.
hispidum willd. Enum.
scaberrimum Horn. cat.
vaillantii Dec. Fl.
parisiense L.
litigiosum Dec. Fl.
maritimum L.
villosum Encycl.
boreale L.

CRUCIANELLA

angustifolia z.

latifolia z.

ciliata encycl,

maritima z.

1. Fruit glabre.

des marais, f. Y aquatique, f. Z

lisse. F. 76

de Boccone. F. W

jaune. F. 华 (méd.) pourpre. F. 龙

TOUGO E Te

rouge. F. Z

blanc. f. ¥
de Provence. ¥
luisant. f. ¥

des sables. F. T

du Tyrol. & faux gratteron. F. O glauque. F. Z à feuilles de garence. F. Z des bois. F. & à feuilles de Lin. F. &

nain. Alpes. O

d'Angleterre. f. ⊙ étalé. f. ⊙ à trois cornes. f. ⊙

2. Fruit hérissé ou rude.

à feuilles rondes. F. ¥ Gratteron. F. ⊙

hérissé. Égypte. O

de Vaillant. F. O

de Paris. F. O

maritime. f. Z velu. esp. Z du Nord. f. Z

CRUCIANELLE

à feuilles étroites. F. ①

à larges feuilles. F. ②

ciliée. orient. ①

maritime. F. or. 9

MALANTIA

muralis L.

hispida L.

glabra L.

articulata L.

Aparine L.

Galium saccharatum Dec. Fl.

cruciata L.

Rubia
tinctorum L.
lucida s. veg.
angustifolia L. mant.
cordifolia L. mant.

Anthospermum æthiopicum z,

'II. Fructus dicoccus dispermus; stamina 4, rariùs 5 aut 6.

Houstonia
coccinea Andr. Rep.
ixora americana Jacq. H.
sch.
Bouvardia triphylla H. K.

Verticillata L.
tenuior L.
rubra Jacq. H. sch.

PHYLLIS Nobla Z.

III. Fructus monocarpus bilocularis polyspermus; stamina 5.

Randia aculeata L.

PINCKNEIA pubens mich. Fl.

Rondeletia triflora vahl. symb. americana L.

florida L.

rhunbergia H. K.

spinosa Thunb. Diss.

radicans Thunb. Diss.

longiflora H. K.?

VALANTIA

des murailles. F. ①

velu. F. ①

glabre. F. ①

articulé. orient. ①

à gros fruit. F. ①

croisette. F. %

des teinturiers. F. L (arts.)
luisante. Barbarie. or. B
à f. étroites. Minorque or. B
à feuilles en cœur. Russie. L

ANTHOSPERMUM
d'Ethiopie. s. ch. 5

II. 2 graines accolées; 4 étamines, rarement 5 ou 6.

Houstonia

écarlate. mexiq. s. ch. b (orn.)

Spermacocé
verticille. Antilles. s. ch. p
grêle. Am. m. ①
à fleurs rouges. ①

PHYLLIS

à f. ternées. canaries. or. 5

III. Un fruit à denx loges polyspermes ; 5 étamines.

RANDIA épineux. Antilles. s. ch. 5

PINCKNÉIA
pubescent. Am. s. or. 5

RONDÉLÉTIA
à trois fleurs. Antilles. s. ch. 19
d'Amérique. Antilles. s. ch. 19

de Thunberg. cap. s. ch. 5
épineux. chine. s. ch. 5
rampant. japon. s. ch. 5
à long. fl. sierra-Leona. s. ch. 5

IV. Fructus monocarpus bilocularis dispermus; stamina 4.

IXORA

coccinea L.alba L.

V. Fructus monocarpus bilocularis dispermus; stamina 5.

SERISSA

fætida.

Lycium fætidum L. f.

Lycium indicum Retz. obs.

Lycium japonicum Thunb.

Jap.

Buchosia coprosmoides l'Her.

Gen.

CHIOCOCCA

racemosa L.

Psychotria undulata jacq. H. sch.

COFFEA

arabica z.

PEDERIA

- fætida L. Mant.

VI. Fructus monocarpus multilocularis; loculis monospermis; stamina 4, 5, aut plura.

GUETTARDA

scabra vent. ch. de pl.)
matthiola scabra z.

PLOCAMA

pendula H. K.

VII. Fructus monocarpus multilocularis; loculis polyspermis; stamina 5.

HAMELLIA

patens z. lucida?

VIII. Flores aggregati supra receptaculum commune.

MITCHELLA

repens L.

OPERCULARIA

ligustrifolia juss. Ann.

CEPHALANTHUS

occidentalis L.

in tall ded to

IV. Un fruit à deux loges monospermes; 4 étamines.

IXORA

écarlate. inde. s. ch. 19 (orn.) blanc. inde. s. ch. 19

V. Un fruit à deux loges monospermes; 5 étamines.

SÉRISSA

fétide. japon. s. ch. b

CHIOCOCCA

à grappes. Antilles. s. ch. 19

PSYCHOTRIA

ondulé. Antilles. s. ch. 5

CAFÉ

d'Arabie. s. ch. b (écon.)

PÉDÉRIA

fétide. Inde. s. ch. y

VI. Un fruit à plusieurs loges monospermes; 4,5 ou un plus grand nombre d'étamines.

GUETTARDA

rude. Antilles. s. ch. b

PLOCAMA

incliné. canaries. or. 19

VII. Un fruit à plusieurs loges polyspermes; 5 étamines.

HAMELLIA

étalé. Antilles. s. ch. 5 à feuilles luisantes. s. ch. 9

VIII. Fleurs aggrégées sur un réceptacle commun.

MITCHELLA

rampant. Am. s. 5

OPERCULARIA

à f. de troêne. N. Holl. or. T

CÉPHALANTE

d'Occident. Am. s. b (orn.)

ORDOIV.

CAPRIFOLIA.

I. Calix caliculatus aut bracteatus; stylus 1; corolla monopetala.

LINNÆA borealis z.

TRIOSTEUM perfoliatum z.

Symphoricarpos parviflora.

Lonicera symphoricarpos L.

DIERVILLA lutea.
Lonicera Diervilla L.

LONICERA.

1. Caule volubili.

parviflora Encycl. dioica H. K. }
caprifolium L.
periclymenum L.
sempervirens L.
japonica Thunb. Jap.

2. Caule recto; pedunculis bifloris.

tațarica L.
pyrenaica L.
nigra L.
cœrulea L.
xylosteum L.
alpigena L.

II. Calix caliculatus aut bracteatus; stylus 1; corolla subpolypetala.

Viscum album z.

III. Calix bracteatus; stylus o; stigmata 3; corolla monopetala.

VIBURNUM

Tinus L.

— latifolius.

rigidum vent. malm.

ORDRE IV.

CHÈVREFEUILLES.

I. Calice caliculé ou accompagné de bractées; 1 style; corolle monopétale.

LINNÉE boréale. Alpes. 5

Triosteum
perfolié. Am. s. Z.

SYMPHORINE

à petites fl. am. s. b (orn.)

Diervilla,
jaune. Am.s. 5 (orn.)

CHÈVREFEUILLE.

1. Tige sarmenteuse.

des jardins. F. m. b (orn.)

des bois. F. b (orn.)

toujours vert. Am. s. b (orn.)

du Japon. or. b

2. Tige droite; pédoncules à deux fleurs.

de Tartarie. 5 (orn.)
des Pyrénées. F. 5 (orn.)
à fruit noir. Alpes. 5 (orn.)
à fruit bleu. Alpes. 5 (orn.)
velu. Alpes. 5 (orn.)
des Alpes. 5 (orn.)

II. Calice caliculé ou accompagné de bractées; I style; corolle presque polypétale.

GUI

blanc. F. 1 (méd.)

III. Calice accompagné de bractées ; style o; 3 stigmates ; corolle monopétale.

VIORNE

Laurier-rin. Esp. 5 (orn.)

— à larges feuilles.

à feuilles rudes. madère. or. 5

nue. Am. s. b (orn.) nudum L. luisante. Am. s. 5 (orn.) Lentago L. prunifolium L. à feuill. de Prunier. Am. S. 3 pyrifolium Encycl. à feuill. de poirier. Am. s. 9 à f. de cassiné. Am. s. or. 9 cassinoides L. punicifolium à f. de grenadier. Am. s. or. 9 cotonneuse. F. b Lantana L. -- canadensis. — de Canada. dentée. Am. s. h dentatum L. — à longues feuilles. - longifolium. à f. d'érable. Am. s. 5 (orn.) acerifolium L. obier. F. b (orn.) opulus L. - Boule-de-neige. (orn.) - sterilis. SUREAU SAMBUCUS нièble. F. V (méd.) Ebulus L. de Canada. 1) canadensis L. noir. F. 5 (méd.) nigra L. — à fruit vert. - virescens. — lacinié. - laciniata. à grappes. F. (orn.) racemosa L. IV. Calice simple; 1 style; corolle presque IV. Calix simplex; stylus 1; corolla polypétale. subpolypetala. CORNUS CORNOUILLER sanguinea L. sanguin. F. 5 (orn.) alba L. Mant. blanc. Am. s. h (orn.) stricta l'ner. corn. élancé. Am. s. b (orn.) paniculata l'Her. corn. paniculé. Am. s. h. (orn.) racemosa Encycl. sericea l'Her. corn. Amomum miller. Dict. à fruit bleu. Am. s. 5 (orn.) cœrulea Encycl. circinata l'Her. corn. à f. rondes. Am. s. 19 (orn.) rugosa Encycl. florida L. à grandes fl. Am. s. b (orn.) måle. f. b (orn.) mas L. - à fruit jaune. - flava. alternifolia L. f. à f. alternes. Am. s. b (orn.) HEDERA LIERRE

commun. F. h (méd. écon.)

Helix L.

CLASSIS XII. DICOTYLEDONES

POLYPETALE.

(Stamina epigyna.)

ORDO I.

ARALIÆ.

Cussonia thyrsoidea Thunb. Diss.

ARALIA

capitata swartz. prodr.

Hedera capitata smith. ic.

pict.

arborea L.

spinosa L.

racemosa L.

bignide wiel.

hispida mich. Fl.
nudicaulis L.
PANAX

quinquefolium z.
quinquefolium z.
aculeatum H. K.
zanthoxylum trifoliatum z.
fruticosum z.

ORDO II.

UMBELLIFER Æ.

ÆGOPODIUM Podagraria z.

PIMPINELLA
saxifraga z.
magna L. Mant.
— rubens.
dissecta Retz. obs.
peregrina z.
dioica z. Mant.
villosa schousb. Maroc.
bubonoides Brotero, Fl.

CLASSE XII.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Etamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARALIES.

Cussonia
à fleurs en thyrse. cap. or. 191
ARALIA

à fl. en tête. antilles. s. ch. 5

arbre. Antilles. s. ch. p épineux. Am. s. p à grappes. Am. s. 72 velu. Am. s. p à tige nue. Am. s. V

PANAX
Ginseng. Am. s. T (méd.)
épineux. chine. or. 5
lacinié. Amboine. s. ch. 13

ORDRE II.

OMBELLIFÈRES.

Podagraire. F. W
BOUCAGE
saxifrage. F. W
élevé. F. W
— rouge.
lacinié. suisse. W
étranger. Italie. W
dioïque. F. W

EGOPODIUM

glauca willd. sp. glauque. F. & Anis. orient. (écon. méd.) anisum L. C_{ARVI} CARUM cultivé. F. & (écon. méd.) carvi I. APIUM APIUM persil. sardaigne. & (écon.) petroselinum L. - crépu. - crispum. — tubéreux. - tuberosum. des marais. F. 8 graveolens L. - céleri. (écon.) - celeri. couché. N. Holl. or. Z prostratum Bill. N. Holl. ANET ANETHUM des moissons. portugal. O segetum z. mant. fetide. Esp. 🕤 graveolens z. Fenouil. F. Z (écon. méd.) rœniculum L. MACERON SMYRNIUM à seuilles ternées. F. & olusatrum z. perfolié. orient. o perfoliatum z. non denté. Am. s. Z integerrimum L. PASTINACA cultivé. F. & (alim. méd.) sativa z. étalé. 🗸 divaricata. opopanax. sicile. ¥ (méd.) opopanax L. luisant. mahon. & lucida L. Mant. THAPSIA THAPSIA velu. F. m. V villosa z. lisse. F. m. Z garganica L. Mant. SÉSÉLI SESELI de montagne. F. V montanum L. annuel. F. o annuum z. à feuilles d'Ammi. portugal.⊙ ammoides z. tuberculeux. F. V. elatum L. à graines blanches. нопдт. И leucospermum wald. et Kitt. Hung. des rochers. caucase. 4 petræum marsch. cauc. tortueux. F. m. or. Z tortuosum I. IMPERATORIA IMPÉRATOIRE des Alpes. 华 (méd.) ostruthium I. sylvestris. des prés. f. V Angelica sylvestris z. verticillata Encycl. Angelica verticillata Jacq. verticillée. F. L Hort.

CHEROPHYLLUM sylvestre z.

MYRRHIS sauvage. F. 76 bulbosum z.
temulum z.
aromaticum z.
aureum z.
hirsutum z.
celoratum z. mant.
tuberculosum.

odorata L.

pecten L.

australis L.

pinnatifida vent. H. cels.

cerefolium L.

Authriscus L.

CORIANDRUM
-sativum z.
testiculatum z.

ETHUSA

cynapium z.

meum s. veg.

Athamanta meum z.

Bunius s. veg.

CICUTA
virosa z.
maculata z.

PHELLANDRIUM aquaticum z. mutellina z.

OENANTHE
fistulosa z.
crocata z.
prolifera z.
globulosa z.
peucedanifolia pollich. pal.
pimpinelloides z.

Cuminum cyminum z.

Bubon

macedonicum z.

Galbanum z.

gummiferum z.

Sison segetum z.

bulbeux. F. &
tacheté. F. &
aromatique. Autriche. Z
jaune. F. Z
velu. F. Z
coloré. Illyrie. &
tuberculeux. Y

Cerfeuil

musqué. Alpes. &

peigne-de-Vénus. f. ①

austral. f. m. ①

pinnatifide. perse. ②

cultivé. f. ② (écon. méd.)

hérissé. f. ②

CORIANDRE cultivée. orient. (écon. méd.) bilobée. Eur. austr. (

ETHUSA.

Petite ciguë. F. ⊙ (vénén.)

Meum. Alpes. Z (méd.)

à feuilles de coriandre. F. ♂

CIGUE

aquatique. F. Z (vénén.)

tachetée. Am. s. 4 (vénén.)

PHELLANDRIUM
aquatique. F. \psi (vénén.)
des Alpes. \psi

OENANTHÉ
fistuleux. F. ¥
à feuilles de Persil. F. ¥
prolifère. sicile. ¥
globuleux. F. ♂
à f. de Peucedaņum. Allem. ¥
à feuilles de Boucage. F. Æ

CUMIN
officinal. orient. ⊙ (méd.)

Bubon

de Macédoine. &

calbanum. cap. or. 5 (méd.)

gommifère. cap. or. 5

Sison

des moissons. F. 7

Amomum L. canadense z. Ammi Z. inundatum z. verticillatum z.

SIUM

angustifolium Jacq. Austr. latifolium z. nodiflorum z. repeus L.f. sisarum L. Falcaria L. siculum L.

ANGELICA

Archangelica L.

lucida z. aquilegifolia. Laserpitium aquilegifolium Jacq. Austr.

LIGUSTICUM Levisticum L.

> peloponense z. pyrenæum gouan. Ill. selinum seguieri Willd. sp. § apiifolium Encycl. cicutæfolium vill. pelph. austriacum Jacq. Austr. peregrinum s. veg.

HERACLEUM

sphondylium z. longifolium Jacq. Austr. alpinum z. pumilum vill. pelph. laciniatum. sibiricum z. Mant. amplifolium Lapeyr. Fl. pyrenaicum Dec. Fl.

LASERPITIUM

latifolium, z. gallicum z. - crispum. siler L. triquetrum Vent. H. cels.

Amomum. F. o de Canada. L "Ammi. orient. O aquatique. F. O verticillé. F. 75

BERLE

à feuilles étroites. F. V. à feuilles larges. F. T. nodiflore. F. Z rampante. F. Z chervi. F. Z (alim.) falciforme. F. Z de Sicile. V

ANGÉLIQUE

de Bohême. Alpes. & (écon. méd.) luisante. Am. s. o

à feuill. d'Ancolie. Autriche. T

LIVÈCHE

officinale. Alpes. Z (écon. méd.) cicutaire. carniole. T des Pyrénées. F. Z à feuilles de Persil. Alpes. Z d' Autriche. F. 76 à feuill. de céleri. Portugal. o

BERCE

des prés. f. & (écon. méd.) à feuilles longues. F. Z. des Alpes. L naine. Alpes. T. laciniée. sibérie. Z de Sibérie. L à grandes feuilles. Pyrénées. प

LASER

à larges feuilles. F. Z. cunéisorme. F. L - crépu. lancéolé. F. Y. triangulaire. Asie. or. Z

Ferula communis L. Ferulago L. tingitana L. nodiflora L. sibirica. peucedanum sibiricum wald. et kitt. Hung. Peucedanum officinale L.

PEUCEDANUM officinale L. italicum L. gallicum. parisiense Dec. Fl. album. minus Encycl. (an L.?) tenuifolium Encycl. silaus L. tauricum Marsch. cauc. alsaticum L.

CACHRYS

tomentosa *pesf. Atl.*panacisfolia *vahl*, *symb.*Libanotis *L.*sicula *z.*

CRITHMUM maritimum z.

ATHAMANTA Libanotis z. condensata z. sibirica L. Mant. cervaria z. latifolia viviani Frag. oreoselinum z. matthioli Jacq. Ic. sicula z. cretensis z.

Selinum chabræi Jacq. Austr. sylvestre Dec. Fl. Athamantha flexuosa H. Par. palustre L. pyrenæum Gouan, Ill. seseli pyrenæum L. peregrinum Willd. Enum. peucedanoides.

FÉRULE commune. Eur. austr. L' luisante. Barbarie. L'

de Tanger. Z
nodiflore. orient. Z

de Sibérie. Z

PEUCÉDANUM officinal. F. Z d'Italie. Z des bois. F. Z

à fleurs blanches. The des prés. F. The de la Tauride. The d'Alsace. F. The de la Tauride. The d'Alsace. F. The d'Alsace. F. The d'Alsace. F. The d'Alsace. F. The d'Alsace. The d'Alsac

CACHRYS

cotonneux. Barbarie. or. Z Libanotis. sicile. or. Z de Sicile. or. Z

CRITHMUM maritime. F. Z (écon.)

ATHAMANTA Libanotis. Allem. Z à fleurs serrées. sibérie. Z de Sibérie. Z à feuilles luisantes. F. Z à larges feuilles. F. Z oréosélinum. F. Z de Mutthiole. carinthie. Z de Sicile. or. Z de Crète, Alpes. Z

SÉLINUM de Chabréus. F. Z tortueux. F. Y des marais. F. Y des Pyrénées. Y étranger. Y à feuilles de peucédanum. Y

austriacum Jacq. Austr.
carvifolia Jacq. Austr.
monnieri L.
elegans Balbis.
latifolium Marsch. cauc.
decipiens Willd. sp.

Conium maculatum L.

Bunium

Bulbocastanum ż.

Аммі

majus z.
visnaga.

Daucus visnaga z.

Daucus

meoides.

Ammi meoides pers. syn.

Ammi anethifolium encycl.

carota L.

crinitus pesf. Atl.

CAUCALIS

grandiflora L.
daucoides L.
latifolia s. veg.
platicarpos L.
humilis Jacq. Hort.
maritima cav. Ic.
hispida.
orientalis willd. sp.
Anthriscus willd. sp.
rordylium anthriscus L.
arvensis willd. sp.
nodosa willd. sp.
rordylium nodosum L.

TORDYLIUM

syriacum L.
officinale L.
apulum L.
maximum L.

Buplevrum.

1. Herbacea.

rotundifolium z.
longifolium z.
stellatum z

d'Autriche. ¥
à feuilles de carvi. F. ¥
de le Monnier. F. m. ⊙
à feuilles menues. ¥
à larges feuilles. caucase. ¥
arbrisseau. or. ¼

CONIUM

ciguë des jardins. F. & (vén.)

BUNIUM

Terre-noix. F. Z

AMMI

officinal. F. O (méd.)

Bisnágre. F. 🔾

CAROTTE

à feuilles de méum. ¥

cultivée. r. & (alim. méd.) chevelue. Barbarie. or. 1

CAUCALIS

à grandes fleurs. F. ①
à feuilles de carotte. F. ①
à larges feuilles. F. ①
à gros fruit. F. ①
à feuilles menues. F. ①
maritime. F. ①
hérissée. ①
d'Orient. or, Z
Anthriscus. F. ②
des champs. F. ②

TORDYLIUM

de Syrie. \odot officinal. $F. m. \odot$ d'Italie. \odot lancéolé. $F. m. \odot$

BUPLÈVRE.

1. Tige herbacée.

à feuilles rondes. F. O à feuilles longues. Alpes. F étoilé. Alpes. L petræum z.
ränunculoides z.
falcatum z.
semicompositum z.
odontites z.
junceum z.
tenuissimum z.
rigidum z.

2. Fruticosa.

spinosum z. f.
fruticosum L.
coriaceum l'Her. stirp.
gibraltaricum Encycl.
obliquum Vahl, symb.
arborescens Jacq. 1c.

Echinophora tenuifolia z.

ASTRANTIA
major L.
minor L.
caucasica Fischer.
heterophylla Marsch. cauc.

Sanicula europæa L. marylandica L.

Panum L.
aquaticum L.
dichotomum Desf. Atl.
pusillum L.
alpinum L.
asperifolium Laroche, Eryng.
oliverianum Laroche, Eryng.
spina-alba Vill. Delph.
campestre L.
dilatatum Encycl.
Bourgati Gouan. Ill.
maritimum L.
tenue Desf. Atl.
corniculatum Encycl.

Hydrocotyle
vulgaris L.
sibthorpioides Encycl.

des rochers. Alpes. Z

Renoncule. Alpes. Z

falciforme. F. Z

demi-composé. F. m. ①

odontitès. F. m. ②

jonciforme. F. ②

filiforme. F. ②

å feuilles dures. F. m. or. Z

2. Tiges ligneuses.

épineux. Esp. or. 5 arbrisseau. F. m. 5 (orn.)

coriace. Barbarie. or. 5

Echinophora
à petites feuilles. orient. ¥

ASTRANTIA

à grandes fl. Alpes. Z (orn.);
à petites fleurs. Alpes. Z
du Caucase. Z
à feuilles variables. cauc. Z

SANICLE

d'Europe. F. 74 (méd.)

de Maryland. ¥

ERYNGIUM

à feuilles planes. F. &
aquatique. Am. s. L
dichotome. Alger. ©
petit. Barbarie. or. L
des Alpes. L (orn.)
à feuilles rudes. L
d'olivier. orient. or. L
à épines blanches. Alpes. L
des champs. F. L (méd.)
dilaté. Maroc. L
Bourgati. F. m. L
maritime. F. L
filiforme. Alger. ©
cornu. Portugal, or. L

HYDROCOTYLÉ

Ecuelle-d'eau. F. ¥

à f. de sibthorpia. île de Fr.:
s. ch. ¥

spananthe willd. sp. spananthe paniculata Jăcq.

LAGOECIA cuminoides L. barbu. caraças. O

LAGOÉCIA à feuilles de cumin. F. m. O

CLASSIS XIII.

DICOTYLÉDONS

CLASSE XIII.

POLYPETALÆ.

DICOTYLEDONES

POLYPÉTALES.

(Stamina hypogyna.)

(Etamines attachées sous le pistil.)

ORDO I.

ORDRE I.

RANUNCULACEÆ.

RENONCULACÉES.

I. Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

I. Capsules monospermes, ne s'ouvrant pas.

CLEMATIS.

CLÉMATITE.

1. Scandentes.

1. Tiges sarmenteuses.

viorna L. viticella z. crispa L. florida Thunb. Jap. orientalis L. vitalba z. virginiana L. Flammula L. cirrhosa L. triternata. calicina H. K. balearica Encycl. 2. Erecta.

viome. Am. s. b bleue. Esp. 5 (orn.) crépue. caroline. 5 à grandes fl. sap. or. 5 (orn.) d'Orient. 5 brûlante. F. b (vénén.) de Virginie. 5 odorante. F. m. b (orn.) à vrilles. Alger. 5 (orn.) triternée. b

erecta L. integrifolia z. à grand calice. Mahon. 5 De (1 1) 100 (1)

2. Tiges droites.

ATRAGENE alpina z. - flava. indica.

droite. F. m. 72 à feuilles entières. Autr. 4

THALICTRUM saxatile vill. pelph. ATRAGÉNÉ des Alpes. 5 -jaune. des Indes. s. ch. y

PIGAMON des rochers. Alpes. V.

IO

fætidum z. sibiricum L.? minus z. majus Jacq. Austr. nigricans Jacq. Austr. angustifolium z. crenatum. flavum L. angulosum. glaucum. speciosum Encycl. rugosum. elatum Jacq. Hort. cinereum. medium Jacq. Hort. atropurpureum Jacq. Hort. aquilegifolium z.

ANEMONE

nepatica L. vernalis L. pulsatilla L. alpina L. apiifolia willd. sp. coronaria L. pavonina Encycl. stellata Encycl. hortensis L. sylvestris L. virginiana L. dichotoma L. trifolia L. nemorosa L. ranunculoides L. narcissiflora L. Thalictroides L.

ADONIS

æstivalis L.
autumnalis L.
vernalis L.

ANAMENIA

coriacea vent. malm. donis capensis L.

RANUNCULUS.

1. Foliis simplicibus.
Flammula L.

fétide. F. V

de Sibérie. V

des bois. F. V

élevé. Autriche. V

noirâtre. Autriche. V

à feuilles étroites. F. V

crénelé. V

des prés. F. V

anguleux. V

glauque. V

ridé. V

élevé. Hongrie. V

cendré. V

moyen. Hongrie. V

à feuill. d'Ancolie. Alpes. V

ANÉMONE

Hépatique. Eur. ¥ (orn.)
printanière. F. ¥
Pulsatille. F. ¥
des Alpes. ¼
à feuilles de Persil. Alpes. ¥
des jardins. orient. ¼ (orn.)
OEil-de-paon. orient. ¼ (orn.)
étoilée. F. m. ¼ (orn.)

sauvage. F. ¥
de Virginie. ¥
dichotome. canada. ¥
à trois feuilles. F. ¥
des bois. F. Æ
Renoncule. F. Æ
à fleurs de Narcisse. Alpes. Æ
à f. de Pigamon. Am. S. ¥

ADONIS

d'été. f. O d'automne. f. O printanier. Alpes. Z

ANAMÉNIA

à feuilles coriaces. cap. or. F

RENONCULE.

1. Feuilles simples.

petite Douve. F. Z.

ringua L.
gramineus L.
nodiflorus L.
ophioglossoides vill. Delph.
pyrenæus L. Mant.
amplexicaulis L.
parnassifolius L.
ricaria L.
Thora L.

2. Foliis dentatis et divisis.

creticus L lacerus Bellardi, App. auricomus L. sceleratus z. pensylvanicus L.f. canadensis Jacq. 1c. 5 aconitifolius L. platanifolius z. mant. asiaticus L. glacialis L. abortivus L. nivalis L. alpestris L. hirsutus curt. Fl. pallidior vill. pelph. philonotis retz. obs. iuberosus Lapeyr. Fl. bulbosus z.

repens L.
acris L.
lanuginosus L.
polyanthemos L.
chærophyllos L.
arvensis L.
muricatus L.
trilobus Desf. Atl.
parviflorus L.
falcatus L.
hederaceus L.
aquatilis L.
— circinatus.
peucedanifolius Desf. Atl.
fluviatilis Willd. sp.

Myosurus minimus z. lancéolée. F. W
à feuilles de Gramen. F. W
nodiflore. F. W
à f. d'ophioglosse. Alpes. W
des Pyrénées. W
amplexicaule. Alpes. W
à feuill. de Parnassia. Alpes. W
petite chélidoine. F. W (méd.)
Thora. Alpes. W-(vén.)

2. Feuilles dentées et découpées.

de Crète. L (orn.)
lacéréc. Alpes. L
printanière. F. L
scélérate. F. L (vén.)

de Pensylvanie. v

à feuilles d'Aconit. Alpes. The à feuilles de Platane. Alpes. The d'Asie. The des glaciers. Alpes. The arbortive. canada. The des neiges. Alpes. The des Alp

velue. f. 🔾

tubéreuse. Pyrénées. Z
bulbeuse. F. ¥
rampante. F. ¥
åcre. F. ¥
lanugineuse. F. ¥
multiflore. F. ¥
à feuilles de cerfeuil. F. Z
des champs. F. ⊙
hérissée. F. ⊙
trilobée. Alger. ⊙
à petites fleurs. F. ⊙
falciforme. F. M. ⊙
à feuilles de lierre. F. ¥
aquatique. F. Z
— arrondie.

à feuill. de Peucédanum. F. L.

Myosurus

Queue-de-souris, v. ⊙

II. Capsulæ polyspermæ.

Trollius asiaticus z.

europæus L.

HELLEBORUS

hyemalis z.
niger z.
viridis z.
fœtidus z.
lividus H. K.

Isopyrum thalictroides z. fumarioides z.

NIGELLA

- damascena L.
sativa L.
arvensis L.
hispanica L.
orientalis L.

GARIDELLA nigellastrum L.

AQUILEGIA
vulgaris L.
alpina L.
viridiflora H. K.
canadensis L.

DELPHINIUM.

1. Unicapsularia.

consolida L.

2. Capsulæ 3 ad 5.

ambiguum L.
peregrinum L.
grandiflorum L.
puniceum L. f.
revolutum.
elatum L.
hirsutum.
staphisagria L.

ACONITUM.

1. Corolla flava.
lycoctonum z.

II. Capsules polyspermes

TROLLIUS

d'Asie. Z (orn.)

d'Europe. Alpes. Z

HELLÉBORE
d'hiver. Alpes. 化
noir. Alpes. 化 (orn.)
vert. F. 化
Pied-de-Griffon. F. 化 (méd.)
livide. corse. 化

Isopyrum à feuilles de Pigamon. F. O

à feuilles de Fumeterre. F. ①

NIGELLE

à involucres. F. m. ① (orn.)
cultivée. orient. ②
des champs. F. ②
d'Espagne. ①
d'Orient. ①

Garidelle de Provence. 🔾

Ancolie

des jardins. F. Z (orn.)

des Alpes. Z

à fleurs vertes. sibérie. Z

de Canada. Z (orn.)

DELPHINIUM.

. I. Une capsule.

des moissons. F. O d'Ajax. suisse. O (orn.)

2. 3 à 5 capsules.

de deux couleurs. Maroc. ①
étranger. Barbarie. ②
à grandes fleurs. sibérie. ¥
ponceau. sibérie. Æ
à feuilles recourbées. Æ
élevé. sibérie. ¥ (orn.)
—velu.
staphisaigre. F. m. ♂ (vén.
méd.)

ACONIT.

1. Corolle jaune.
Tue-loup. Alpes. \$\psi\$ (v\u00e9n.)

pyrenaicum z.
Anthora z.

2. Corolla carulea.

Napellus L. cammarum L.

CALTHA palustris L.

PEONIA

Moutan Bot. Mag.

mascula L.

corallina Retz. obs. }

feemina L.

officinalis Retz. obs. }

villosa.

humilis Retz. obs. }

lobata.

ZANTHORHIZA apiifolia l'her. stirp.

anomala L. Mant.

III. Germen 1; bacca unilocularis, polysperma.

albiflora Pallas, Ross.

ACTEA

spicata L.
— alba.
— rubra.
racemosa L.

Podophyllum peltatum L.

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

I. Stamina indefinita; antheræ filamentis adnatæ.

SANGUINARIA canadensis L.

Argemone — mexicana L.

PAPAVER.

1. Capsulis hispidis. hybridum L. des Pyrénées. ¥ (vén.)
Anthora. Alpes. Z

2. Corolle blene.

napel. Alpes. Z (vén.)
à grandes fleurs. F. Alpes. (vén.)

CALTHA

des marais. F. ¥ (orn.)

PIVOINE en arbre. chine. or. 5 (orn.)

femelle. Alpes. \$\psi\$ (orn. méd.)

måle. suisse. ¥ (orn. méd.)

velue. Esp. ¥ (orn.)

lobée. ¥
à fl. blanches. sibérie. Z (orn.)
laciniée. sibérie. ¥ (orn.)
à f. menues. sibérie. ¥ (orn.)

ZANTHORHIZA

à seuilles de persil. Am. s. 19

III. Un seul ovaire; baie à une loge polysperme.

Acté A

des Alpes. & (méd.)

— à fruit blanc.

— à fruit rouge.

à grappes. Am. s. &

PODOPHYLLUM en bouclier. Am. s. ¥

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

I. Etamines indéfinies; anthères attachées le long du bord des filets.

Sanguinaire
de Canada. Z

Argémone du Mexique. 💿

PAVOT.

1. Capsules hérissées, hybride. F. ①

Argemone z. alpinum z. nudicaule z.

2. Capsulis glabris.

Rhæas L.
dubium L.
cambricum L.
orientale L.
somniferum L.
— nigrum.

CHELIDONIUM
Glaucium z.
corniculatum z.
hybridum z.
majus z.
— quercifolium.

II. Stamina definita.

Bocconia frutescens L. cordata willd. sp.

Hypecoum procumbens z.

cucullaria L.
bulbosa L.
solida smith, Fl.
nobilis s. veg.
fungosa H. K.
sempervirens L.
aurea willd. Enum.
lutea L. mant.
vesicaria L.
parviflora Encycl.
officinalis L.
capreolata L.
claviculata L.
spicata L.

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

I. Siliquosa.

RAPHANUS sativus L.

Argémone. F. ①
des Alpes. W
à tiges nues. Alpes. Z

2. Capsules glabres.

coquelicot. F. ① (méd.)
à long fruit. F. ②
jaune. Alpes. ¥
d'Orient. ¥ (orn.)
des jardins. F. ② (orn. méd.)
— à graines noires.

Chélidoine
glauque. F. &
cornue. F. m.
hybride. F. m.
officinale. F. % (méd.)
a feuilles de chêne.

II. Etamines définies.

Bocconia
arbrisseau. Antilles. s. ch. 5
à f. en cœur. chine? s. ch. 5

Hypécoum tombant. f. 🔾

Fumeterre
capuchon. Am. s. %
bulbeuse. f. % (orn.)
solide. f. % (orn.)
odorante. sibérie. %
fongueuse. Am. s. %
toujours verte. Am. s. ©
dorée. canada. &
jaune. Barbarie. %
vésiculeuse. cap. ©
à petites fleurs. f. ©
officinale. f. © (méd.)
à vrilles. f. m. ©
claviculée. f. m. ©

ORDRE III.

CRUCIFÈRES.

I. Siliqueuses.

RAIFORT cultivé. chine. (alim.)

	- rotundus.		-radis.
	- niger.		—noir.
	Raphanistrum Z.		des moissons. F. O
	tenellus pallas, Itin.		141: at aibánia
	chorispermum tenellum H.K.	9	délicat. sibérie. O
	Choriopermania	71/10	
SIN		1110	UTARDE
-	arvensis L.		des champs. r. O
	alba z.		blanche. F. O
	nigra L.		noire. f. (écon.)
	incana L:		incane. F. o
	pubescens L. Mant.		pubescente. sicile. or. ¥
	pyrenaica L.		des Pyrénées. F. T
	hispida schousb. maroc.		hérissée. maroc. O
	hastata.		à seuilles hastées. N. Holl. O
	integrifolia willd. Hort.		à feuilles entières. O
			lisse. Esp. O
	lævigata L.		jonciforme. chine. O
	juncea L.		fausse Roquette. F. O
	erucoides L.	0	
BRA	SSICA	C_{H}	
	cheiranthus vill. Delph.		à fleur de cheiri. Alpes. d'
	FERUCA L.		roquette. F. O
3.	rucastrum L.		fausse roquette. F. O
	Tournefortii Gouan, Ill.		de Tournesort. F. O
2	alpina L. Mant.		des Alpes. T
	vesicaria L.		vésiculeux. Esp. O
	oleracea L.		commun. F. o (alim.)
			-sauvage.
	— sylvestris. — sabellica.		—frisé.
			- rave.
	— gongliodes.		— fleur.
	— botrytis.		-vert.
	— viridis.		- pommé.
	— capitata.		- rouge.
	rubra.		Turneps. F. of (alim.)
	Rapa L.		nauet E & (alim)
G.	Napus L.		navet. F. & (alim.)
	asperifolia sylvestris Encycl.		navette. F. (écon.)
	arvensis L. Mant.		violet. F. ¥
	campestris L.		des champs. F. O
	orientalis L.		d'Orient. F. 🔾
PHT . T.	RRITIS	To	URETTE
£U.	glabra L.		glabre. F. &
	hirsuta L.		
	Arabis hispida Encycl.		velue. F. o
	hispida. Arabis hispida z. f.		hérissée. Alpes. 4
	bellidifolia.		à f. de paquerette. Alpes. 75
	Arabis bellidifolia L. Mant.		

verna. Arabis alpina z. } — minor. saxatilis. Arabis saxatilis All. ped. } Thaliana. Arabis Thaliana z. } pendula. Arabis pendula z. } Hesperis matronalis z. tristis z. lyrata encycl. africana z. laxa encycl. verna z. maritima.	printanière. Alpes. & — à petites fleurs. des rochers. Alpes. paniculée. f. pendante. Alpes. Julienne cultivée. Alpes. à fleurs brunes. Autriche. à feuilles en lyre. sibérie. à fleurs lâches. Tartarie. printanière. f. m. o
cheiranthus maritimus z. schia. cheiranthus chius z. scheiranthus chius z. syn. Heliophila pendula willd. sp.	de Mahon. ⊙ (orn.) de Chio. orient. ⊙ à feuilles de Lin. Esp. or. Z HÉLIOPHILA
Cheiri L. mutabilis l'Her. stirp. longifolius vent. malm. semperflorens schousb. Maroc. scoparius willd. Enum. fenestralis L. sinuatus L. incanus L. annuus L. græcus. Hesperis æstiva Encycl.var. B. littoreus L. tristis L. cuspidatus Marsch. cauc. parviflorus willd. sp. tricuspidatus L.	à balais. canaries. or. b Fenestrelle. & (orn.) sinuée. F. ① incane. Esp. Z quarantain. Eur. austr. ① (orn.) grecque. orient. ② (orn.) des rivages. F. m. & brune. F. m. or. Z à long style. caucase. & à petites fleurs. maroc. ② à trois pointes. F. m. ②
ERYSIMUM officinale L. Barbarea L. præcox smith, Fl. Alliaria L.	Errsimum officinal. F. O (méd.) à feuilles en lyre. F. & printanier. F. & Alliaire. F. & (méd.)

repandum L. cheiranthus paniculatus Encheiranthoides L. hieracifolium L. helveticum. cheiranthus helveticus Jacq. Hort. sylvestre. cheiranthus sylvestris Encycl. cheiranthus erysimoides L. alpinum. cheiranthus alpinus L. quadrangulum. cheiranthus quadrangulus l'Her. stirp. cheiranthus cornutus Encycl.)

SISYMBRIUM.

1. Siliquis declinatis, brevibus.

palustre willd. sp.
terrestre smith, fl.
sylvestre L.
amphibium L.
pyrenaicum L.
tanacetifolium L.
tenuifolium L.
erysimifolium.
Allioni Pers. syn.

2. Siliquis sessilibus, axillaribus.

polycerastium z. supinum z. bursifolium z.

3. Caule nudo.

murale L.

Erucastium Gouan, Ill.

vimineum L.

arenosum L.

4. Foliis pinnatis.

nitidum zea.
sophia L.
altissimum L.
asperum L.
rio L.

festonné. F. O

à petites fleurs. F. O à feuilles d'épervière. F. &

d'Helvétie. Z

sauvage. F. Z

des Alpes. Z

à long style. sibérie. 12

CRESSON.

1. Siliques courtes et abaissées.

de fontaine. F. & (alim. méd.)

des marais. F. 🔾

sauvage. F. ①
amphibie. F. ¥
des Pyrénées. Z
à feuill. de Tanaisie. Alpes. Z
fausse roquette. F. ¥

à feuilles de vélar. F. &

2. Siliques sessiles, axillaires.

à siliques nombreuses. F. ①
couché. F. ①
à seuilles de Tabouret. F. ①

3. Tige nue.

des murailles. f. 🔾

grêle. f. O des sables. Alpes. O

4. Feuilles pennées.

à feuilles luisantes. ⊙
sophia. F. ⊙
élevé. F. ⊙
à fruit rude. F. ↓
Irio. F. ⊙

columnæ Jacq. Austr. Læselii L. obtusangulum willd. sp.

5. Foliis integris.

strictissimum z.
junceum.
Erysimum junceum willd. sp.

CARDAMINE.

1. Foliis simplicibus.

alpina willd. sp.
bellidifolia All. ped.
asarifolia z.

2. Foliis ternatis.

resedifolia s. veg. trifolia z.

3. Foliis pinnatis.

chelidonia z.
impatiens z.
hirsuta z.
parviflora z.
pratensis z.

DENTARIA

enneaphylla L.
pinnata Encycl.
heptaphyllos vill. pelph.
pentaphyllos L.

II. Siliculosæ.

RICOTIA

ægyptiaca z.

LUNARIA

rediviva z.

annua L.

BISCUTELLA

auriculata L.
lævigata L. Mant.
apula L. Mant.
depressa Willd. Enum.
leiocarpa Dec. Ann.
obovata Dec. Ann.
raphanifolia Desf. Atl.
cichoriifolia Dec. Ann.

CLYPEOLA jonthlaspi z.

de Colomna. F. ①
de Loesel. F. ①
à angles obtus. Alpes. ①

5. Feuilles entières.

ramassé. Alpes ⊙ jonciforme. Hongrie. ♂

CARDAMINÉ.

1. Feuilles simples.

des Alpes. W

à feuilles d'Asarum. Alpes. 75

2. Feuilles ternées.

à feuilles de réséda. Alpes. Z à feuilles ternées. F. Y

3. Feuilles pennées.

à feuilles de chélidoine. F. Célastique. F. & velu. F. O à petites fleurs. F. O des prés. F. L

DENTAIRE

à neuf feuilles. Alpes. O

pennée. Alpes. Z

à cinq feuilles. Alpes. Z

II. Siliculeuses.

Ricotia
d'Egypte.

 $d^{\prime}Egypte. \bigcirc LUNAIRE$

vivace. F. ¥ (orn.)
annuelle. F. ⊙ (orn.)

BISCUTELLE

auriculée. F. ①
à fruit lisse. F. ①
à fruit rude. F. ①
d'Egypte. ②
à petit fruit. F. ①
ovale renversé. F. ②
à feuilles de Raifort. F. ②
à f. de chicorée. pyrénées. ¥

Clypéola jonthlaspi. F. m. 🔾 maritima *L. Mant*.

Alyssum maritimum willd.

sp.

alliacea.

peltaria alliacea *L*.

ALYSSUM.

1. Fruticulosa.

spinosum *L*.
saxatile *L*.
alpestre *L*. *Mant*.

2. Herbacea.

argenteum willd. sp.
incanum L.
montanum L.
campestre L.
calicinum L.
clypeatum L.

3. Siliculis inflatis.

deltoideum L. sinuatuin L. utriculatum L. Mant.

DRABA.

1. Caule nudo.

aizoides *L. Mant.* alpina *L.* verna *L.* pyrenaica *L.*

2. Caule folioso.

muralis L. hirta L. incana L.

Cochlearia
officinalis L.
danica L.
Armoracia L.

praba L. glastifolia L.

Coronopus vulgaris. cochlearia coronopus L.

maritime. F. &

à odeur d'Ail. Autriche. W.

ALYSSON.

1. Tige ligneuse.

épineux. F. m. 5
des rochers. orient. 5
des Alpes. 5

2. Tige herbacée.

argenté. Alpes. L'
blanc. F. &
des montagnes. Alpes. L'
des champs. F.

à petites fleurs. F.
en bouclier. Liban. or. &

3. Silicules renflées.

deltoïde. syrie. or. V sinué. esp. & à utricules. orient. V

DRABA.

1. Tige nue.

aizoïde. Alpes. ¥
des Alpes. F. ¥
printanier. F. ⊙
des Pyrénées. F. Æ

2. Tige feuillue.

des murailles. Alpes. The hérissé. F. The blanc. Alpes. The

Cochléaria
officinal. F. & (méd.)
de Danemarck. &
cran de Bretagne. F. & (écon.
méd.)
praba. F. &
à feuilles de pastel. F. &

CORONOPUS

commun. f. O

SENEBIERA SENEBIERA. pinnatisida Dec. soc. Phil. pinnatifide. Asie. & Lepidium didymum L. Mant. TEERIS IBÉRIS semperflorens L. de tous les mois. sicile. or. 5 sempervirens L. toujours verte. Alpes. 5 saxalilis L. des rochers. Alpes. h gibraltarica L. de Gibraltar. or. 19 rotundifolia L. à feuilles rondes. Alpes. & amara L. amère. F. (orn.) umbellata z. ombellifere. Esp. (orn.) pinnata L. pennée. F. m. 🔾 linifolia L. à feuilles de Lin. F. m. o nudicaulis z. à tige nue. F. O THLASPI THLASPI arvense z. à grandes siliques. F. O campestre z. pubescent. F. & alliaceum L. alliacé. f. () montanum L. de montagne. Alpes. Z perfoliatum L. perfolié. Alpes. o alpestre L. des Alpes. O hirtum z. velu. f. m. o ceratocarpon L. f. à fruit cornu. sibérie. 🔾 Bursa-pastoris. Bourse-à-berger. F. O sativum. cresson alénois. (écon.) Lepidium sativum z. - latifolium. - à larges seuilles. - crispum. - crépu. nudicaule. à tige nue. F. 💿 repidium nudicaule z. ruderale. sans pétales. F. 🔾 Lepidium ruderale z. LEPIDIUM LÉPIDIUM perfoliatum z. perfolié. orient. () subulatum L. en alêne. Esp. h procumbens L. couché. F. () alpinum z. des Alpes. F. 75 petræum L. des rochers. F. O latifolium L. Passerage. F. Z iberis L. Ibéris. F. Z cardamines z. à feuilles ly rées. Esp. & vesicarium L. vésiculeux. orient. 🔾

ANASTATICA

Rose de Jériko. orient. O

ANASTATICA

Hierochuntica L.

VELLA

pseudocytisus L. annua L.

MYAGRUM

perenne L.
orientale L.
rugosum L.
perfoliatum L.
sativum L.
paniculatum L.
saxatile L.

BUNIAS

spinosa L. Mant.

Erucago L.

ægyptiaca L.

balearica L. Mant.

orientalis L.

syriaca Willd. sp.

Anastatica syriaca L.

CAKILE

maritima.

Bunias cakile z.

CRAMBE

maritima L.
tataria Jacq. 1c.
cordifolia Fischer.
hispanica L.
filiformis Jacq. 1c.

ISATIS

tinctoria z. lusitanica z.?

ORDO IV.

CAPPARIDEÆ.

CLEOME

gigantea L. Mant.

pentaphylla L.
spinosa L.
dodecandra L.
icosandra L.
arabica L. Dec.
viscosa L.
ornithopodioides L.

WELLA

faux cytise. orient. or. 5 annuel. Barbarie. O

CAMELINE

vivace. F. &
d'Orient. O
ridée. F. m. O
amplexicaule. F. O
cultivée. F. O
paniculée. F. O
des rochers. Alpes. &

BUNIAS

épineux. Égypte. & tétragône. F. m. © d'Egypte. © de Mahon. © d'Orient. \psi

CAKILÉ

maritime. F. 🔾

CRAMBÉ

maritime. F. V (écon.)

de Tartarie. V

à feuilles en cœur. Russie. V

d'Espagne.

filiforme. V

PASTEL

des teinturiers. F. of (arts.) de Portugal. ①

ORDRE IV.

CAPRIERS.

CLÉOMÉ

gigantesque. Guinée. s. ch. 1)
à cinq feuilles. Inde. ①
épineux. Antilles. ①
à douze étamines. Inde. ①
à vingt étamines. ceylan. ①
d'Arabie. Égypte. ②
visqueux. ceylan. ①
Pied-d'oiseau. orient. ②

CRATEVA

fragrans Bot. Magaz. capparoides Andr. Rep.

CAPPARIS

spinosa L.
longifolia swartz.
saligna wahl, symb.
glandulosa.
frondosa L.
cynophallophora L.
tenuisiliqua sacq. Am.

RESEDA

Luteola L.
glauca L.
sesamoides L.
alba L.
lutea L.
undata L.
mediterranea L. Mant.
phyteuma L.
odorata L
canescens L.

Drosera rotundifolia z. longifolia z.

PARNASSIA palustris z.

ORDO V.

" muitar

SAPINDI.

CARDIOSPERMUM Halicacabum L.

Paullinia pinnata z.

Serjania triternata willd. sp. paullinia triternata z. mant.

Koelreuteria paulinioides l'Her. sert.

Kœlreuteria pauliculata En-

Sapindus Puate, saponaria L.

CRATÉVA

odorant. sierra-Leona. s. ch. 5

CAPRIER

épineux. F. m. h (écon. orn.)
à long. feuill. Antilles. s. ch. h
à f. de saule. Antilles. s. ch. h
glanduleux. s. ch. h
feuillu. Antilles. s. ch. h
à long fruit. Antilles. s. ch. h
à fruit grêle. Antilles. s. ch. h

RÉSÉDA

Gaude. F. & (teint.)
glauque. Pyrénées. &
sésamoïde. F. ①
blanc. Esp. ②
jaune. F. L
à trois styles. Esp. L
de la Méditerranée. orient. ③
à grand calice. F. ②
odorant. Alger. ②
velu. orient. or. L

Rossolis à feuilles rondes. F. ① à feuilles longues. F. ②

PARNASSIA

des marais. F. Z

ORDRE V. W.S.

SAVONNIERS.

CARDIOSPERME

pois-de-merveille. inde. ①

PAULLINIA
à f. pennées. Antilles. s. ch. 5
SERJANIA

triterné. Antilles. s. ch. 9

Koelreutéria

paniculé. chine. 19

SAVONNIER commun. inde. s. ch. p (écon.)

rigida vahl, symb.

ALLOPHYLUS

racemosus swartz. prodr.
smidelia occidentalis swartz.

Fl. Ind.

EUPHORIA

Lit-chi.
sapindus edulis vahl, symb.
Dimocarpus Lit-chi willd. sp.

AMIROLA

nitida pers. syn.
Lagunea nitida Fl. per.

CUPANIA

glabra swartz. Prodr.

ORDO VI.

A CERA.

Æsculus

нірросаstanum z.

flava H. K.

Pavia L.

macrostachya mich. Fl.

parviflora H. K.

oiotensis mich. Arbr.

ACER

Negundo L. pensylvanicum L. striatum Encycl. montanum H. K. spicatum Encycl. tataricum z. rubrum z. eriocarpon mich. Fl. saccharinum z. Platanoides z. - laciniosum. Pseudo-Platanus L. campestre L. opalus willd. sp. opulifolium vill. pelph. monspessulanum L. creticum z.

à f. roides. Antilles. s. ch. D. des Indes. s. ch. p

ALLOPHYLUS

à grappes. Antilles. s. ch. 5

EUPHORIA

Lit-chi. chine. s. ch. 5 (alim.)

AMIROLA

à f. luisantes. pérou. s. ch. 5

CUPANIA
glabre. Antilles. s. ch. 3

ORDRE VI.

ÉRABLES.

Esculus

Marronnier d'Inde. Asie. 5

(orn.)

Pavia jaune. Am. s. 5 (orn.)

Pavia rouge. Am. s. 5 (orn.)

à long. grappes. Am.s. 5 (orn.)

de l'Oio. Am. s. 5 (orn.)

ERABLE

à f. de Frêne. Am. s. 5 (orn.)
jaspé. Am. s. 5 (orn.)

de montagne. Am. s. h

de Tartarie. 5 (orn.)
rouge. Am. s. 5 (orn.)
à fr. cotonneux. Am. s. 5 (orn.)
à sucre. Am. s. 5 (écon.)
Plane. F. 5 (orn.)
—lacinié.
sicomore. F. 5 (orn.)
champêtre. F. 5
opale. Alpes. 5
à feuilles d'obier. Alpes. 5
de Montpellier. 5 (orn.)
de Crète. 5

HIPPOCRATEA volubilis L.

Jaka ORDO VII.

MALPIGHIACEÆ.

BANISTERIA

laurifolia z.
ciliata Encycl.
tomentosa.
periplocæfolia.

GYROCARPOS.

gyrocarpos Jacquini, Roxb.

TRIOPTERIS

jamaicensis z.?

MALPIGHIA

glabra z.
punicifolia z.
myrtifolia.
urens z.
nitida z.

macrophylla.

coccifera z.

low "dicrove,

aquifolia z. glandulifera Jacq. 1c.

ERYTHROXYLUM

- hypericifolium Encycl.

ORDO VIII.

HYPERICA.

Ascyrum hypericoides z.

as tolows in

HYPERICUM.

1. Trigyna.

ægyptiacum z.
scabrum z.
coris z.
nummularium z.
pulchrum z.
tomentosum z.

HIPPOCRATÉA sarmenteux. Antilles. s. ch. 19

ORDRE VII.

MALPIGHIACÉES.

BANISTÉRIA

à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5 cilié. Brésil. s. ch. 5 cotonneux. Antilles. s. ch. 5 à f. de Périploca. Ant. s. ch. 5

GYROCARPOS

de Jacquin. mde. s. ch. 5

TRIOPTÉRIS

de la Jamaique. s. ch. 3

MALPIGHTA

glabre. Antilles. s. ch. p
à f. de Grenadier. Ant. s. ch. p
à f. de Myrte. Antilles. s. ch. p
brûlant. Antilles. s. ch. p
luisant. Antilles. s. ch. p
à grandes f. Antilles. s. ch. p
à f. de Kermès. Ant. s. ch. p
à f. de Houx. Antilles. s. ch. p
glanduleux. Antilles. s. ch. p

ERYTHROXYLUM

à f. d'Hypéricum, île de Fr.

ORDRE VIII.

MILLEPERTUIS.

ASCYRUM

à f. de millepertuis. Am. s. D

MILLEPERTUIS.

1. 3 styles.

d'Egypte. or. 5
rude. orient. or. 5
verticillé. Alpes. 5
à f. de Nummulaire. Alpes. L'élégant. F. L'
cotonneux. F. m. or. L

elodes L.
crispum L. Mant.
humifusum L.
montanum L.
hirsutum L.
perforatum L.
quadrangulare L.
delphinense vill. Delph.
dubium smith, Fl.
canariense L.
Androsæmum L.
hircinum L.
elatum Encycl.
prolificum L. Mant.

2. Styli 5.

micheri vill. pelph. fimbriatum encycl. famplexicaule encycl. calicinum z. mant. chinense encycl. monogynum z. balearicum z.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

CLUSIA

rosea L. flava L.

MAMMEA

- americana L.

ORDO X.

Bruse wht ...

AURANTIA.

I. Fructus monospermus.

BALANITES

ægyptiaca *pelile*, *fl.* xymenia ægyptiaca *z.* }

COOKIA

- punctata willd. sp.

des marais, f. L crépu. Alger. L couché. f. O de montagne. f. L velu. f. L officinal. f. L (méd.) tétragône. f. L

du Dauphiné. Z

des Canaries. or. 5
Androsême. F. 5 (méd.)
fétide. orient. 5
élevé. Am. s. 5
prolifique. Am. s. 5 (orn.)

2. 5 styles.

de Richer. Alpes. #

amplexicaule. #
à grand calice.orient. 5 (orn.)

de Chine. or. 5 (orn.)

de Mahon. or. 5

ORDRE IX.

GUTTIERS.

CLUSIA

rose. Antilles. s. ch. p jaune. Antilles. s. ch. p

MAMMÉA

d'Amérique. Antilles. s. ch. 5 (écon.)

ORDRE X.

ORANGERS.

I. Fruit monosperme.

BALANITE

d'Egypte. s. ch. 5

COOKIA

ponctué. île de fr. s. ch. 5

II

II. Fructus polyspermus baccatus.

II. Une baie polyspermed

MURRAYA

exotica L. mant. chalcas paniculata L. Mant. marsana buxifolia sonn. Itin.)

MURRAYA

CITRONNIER

méd.) — aigre.

- Poncire.

-Balotin.

- amer.

- violet.

- turc.

(orn.)

- Lime douce.

-de Florence.

méd. écon.)

- de Portugal.

- Bergamotte.

de Chine. or. h

hérissé. s. ch. 5

échancré. s. ch. p

- Riche dépouille.

-cédra.

Buis de Chine. s. ch. 5

commun. inde. or. 5 (écon.

oranger. Asie. or. 5 (orn.

pampelmouse. Inde. or. 3

CITRUS

medica z.

- acida.
- cedra.
- tuberosa.
- -- balotina.
- Limon.
- florentina. Aurantium L.
- amarum.
- olyssiponense.
- violaceum.
- multiflorum.
- -- lunatum.
- bergamium.

decumana L.

sinensis. triptera. hystrix Dec. cat. emarginata.

LIMONIA

à f. ternées. inde. s. ch. 3

à feuilles ternées. s. ch. 5

III. Une capsule polysperme.

LIMONIA

trifoliata L.

III. Fructus polyspermus capsularis.

TERNSTROMIA

elliptica swartz, prodr. meridionalis z. f.?

THEA

bohea L.

CAMELLIA

japonica L.

bou. chine. or. 5 (écon. méd.)

elliptique. Antilles. s. ch. 3

d'Amérique. Antilles. s. ch. 5

CAMELLIA

TERNSTROMIA

du Japon. or. 5 (orn.)

ORDO XI.

MELIACEÆ.

I. Folia simplicia.

WINTERANIA canella L. f.

AYTONIA capensis L. f.

II. Folia composita.

Portesia
ovata cav. piss.
rrichilia pallida swartz,
prodr.

TRICHILIA spondioides swartz, prodr.

Melia

— Azedarach z.

SWIETENIA mahogoni L.

CEDRELA odorata z.

ORDO XII.

VITES.

Cissus

orientalis Lamk. Ill. acida L.

- quadrangularis L. Mant.
sicyoides L.
quinquefolia.
vitis hederacea Willd. sp.
Hedera quinquefolia L.
Ampelopsis quinquefolia
Mich. Am.
antarctica Vent. ch. de pl.
vitiginea L.

Vitis vinifera z.

ORDRE XI.

AZÉDARACS.

I. Feuilles simples.

WINTÉRANIA cannelle blanche. Antill. s. ch. 5 (méd.)

AYTONIA

du Cap. or. 5

II. Feuilles composées.

PORTÉSIA

à feuilles ovales. Ant. s. ch. 3

TRICHILIA
à f. de Monbin. Ant. s. ch. 5

Mélia azėdarac. inde. or. 5 (orn.)

Swiéténia mahogoni. acajou à meubles. Antilles. s. ch. 5 (arts.)

CÉDRÉLA
odorant. Acajou à planches.
Antilles. s. ch. 5 (arts.)

ORDRE XII.

VIGNES.

Cissus
d'Orient. perse. or. 5
acide. Antilles. s. ch. 5
quadrangulaire. inde. s. ch. 5
à f. dentées. Antilles. s. ch. 5

vigne vierge. Am. s. b (orn.)

antarctique. N. Holl. or. 5 cotonneux. Inde. s. ch. 5

VIGNE cultivée. Asie. 5 (écon. méd.)

laciniosa L.
vulpina L.
Labrusca L.
cordifolia mich. Fl.
virginiana.
arborea L.
Ampelopsis bipinnata mich.
Fl.

laciniée. h (écon.)
de renard. Am. s. h
cotonneuse. Am. s. h
à feuilles en cœur. Am. s. h
de Virginie. Z

à f. de persil. Antilles. s. ch. b

ORDO XIII.

GERANIA.

PELARGONIUM fulgidum willd. sp.

inquinans willd. sp. - roseum. hybridum willd. sp. flabellatum. zonale willd. sp. - variegatum. acetosum willd. sp. glaucum willd. sp. Geranium lanceolatum cav. diversifolium willd. sp. tomentosum Andr. Rep. peltatum willd. sp. grandislorum willd, sp. cortusæfolium willd. sp. melananthon willd. sp. sanguineum. pilosum H. K. hirtum willd. sp. hamatum. echinatum Bot. Mag. tetragonum willd. sp. reniforme Bot. Mag. papilionaceum willd. sp. australe willd. sp. vitisolium willd sp. acerifolium willd. sp. penicillatum willd. H. Ber. beaufortianum. cucullatum willd. sp. ribifolium willd. sp.

ORDRE XIII.

GÉRANIUM.

PÉLARGONIUM

couleur de feu. cap. or. 5

(orn.)

écarlate. cap. or. 5 (orn.)

rose.

hybride cap. or. 5

en éventail. cap. or. 5

à zônes. cap. or. 5 (orn.)

panaché.
acide. cap. or. 5

glauque. cap. or. b à feuilles var. cap. or. 3 à feuill. blanches. cap. or. 5 en bouclier. cap. or. b à grandes fleurs. cap. or. n à f. de cortusa. cap. or. b à fleurs brunes. cap. or. 15 sanguin. cap. or. 5 velu. cap. or. T hérissé. cap. or. Z à crochets. cap. or. 5 tétragône. cap. or. b réniforme. cap. or. 5 papilionacé. cap. or. 5 austral. N. Holl. or. h à feuilles de vigne. cap. or. 5 à feuilles d'Erable. cap. or. 9 moucheté. cap. or. 5 de Beaufort. cap. or. 5 capuchon. cap. or. n à feuill. de Ribés. cap. or. 19

tomentosum willd. sp. rigidum willd. sp. cordatum willd. sp. blattarium willd. sp. tricolor willd. sp. geranium violarium Jacq. 1c. betulinum willd. sp. formosissimum. capitatum willd. sp. jatrophæfolium *pec. cat.* glutinosum l'Her. Ger. geranium viscosum cav. Diss. quercifolium willd. sp. terebinthinaceum. graveolens l'Her. Ger. Radula willd. sp. . scabrum willd. sp. tricuspidatum l'Her. Ger. bicolor willd. sp. quinquevulnerum Andr. Rep. carnosum willd. sp. gibbosum willd sp. ceratophyllum l'Her. Ger. exstipulatum willd. sp. crispum willd. sp. fragile willd. sp. ternatum willd. sp. trifidum Jacq. H. sch. tripartitum willd. sp. adulterinum l'Her. Ger. incisum willd. sp. suaveolens. tabulare willd. sp. Geranium elongatum cav. Diss. alchimilloides willd. sp. odoratissimum willd. sp. astragalifolium. pinnatum H. K. multicaule. Geranium multicaule Jacq. 1c. coriandrifolium willd. sp. rapaceum willd. sp. Geranium selinum Andr. Rep. S myrrhifolium willd. sp. lacerum willd. sp. grossularioides willd. sp. carneum willd. sp.

drapé. cap. or. 5 à feuilles dures. cap. or. 5 à feuilles en cœur. cap. or. 5 Blattaire. cap. or. 5 tricolore. cap. or. 5 (orn.) à f. de Bouleau. cap. or. 5 élégant cap. or. b (orn.) à fleurs en tête. cap. or. 5 à f. de Jatropha. cap. or. 19 glutineux. cap. or. 5 à feuilles de chêne. cap. or. b, térébinthinacé. cap. or. 9 Radula. cap. or. 19 rude. cap. or. b à trois pointes. cap. or. 5 bicolore. cap. or. 5 à cinq taches. cap. or. 9 charnu. cap. or. 5 gibbeux. cap. or. 5 à seuilles cornues. cap. or. 5 sans stipules. cap. or. 19 crépu. cap. or. 1). fragile. cap. or. 19 trilobé. cap. or. 5 trifide. cap. or. 5 adultérin. cap. or. 5 incisé. cap. or. 5 suave. cap. or. b à longs pédoncules. cap. or. Z à f. d'Alchimille. cap. or. 9 odorant. cap. or. b à f. d'Astragale. cap. or. Z à tiges nombreuses, cap. or. W à f. de coriandre. cap. or. Z Rave. cap. or. Z à f. de myrris. cap. or. ¥ lacéré. cap. or. 14 à f. de groseillier, cap. or. # à petites fleurs. cap. or. \square

Iobatum willd. sp.
triste willd. sp.
daucifolium.
flavum willd. sp.
abrotanifolium willd. sp.
tenuifolium willd. sp.

ERODIUM

alpinum willd. sp. petræum willd. sp. cicutarium willd. sp. romanum willd. sp. moschatum willd. sp. hirtum willd. sp. laciniatum willd. sp. maritimum willd. sp. pulverulentum willd. sp.? malacoides willd. sp. glaucophyllum willd. sp. ciconium willd. sp. gruinum willd. sp. geifolium. hymenodes willd. sp. Geranium triphyllum cav. Diss. pusillum. geranium pusillum L. chamædryoides willd. sp. Geranium Reichardi syst. incarnatum willd. sp.] punctatum cav. piss.

GERANIUM

tuberosum L.

macrorhizum L. Mant.
anemonæfolium l'Her. Ger.
Geranium palmatum cav.
Diss.
phæum s. Veg.
roseum l'Her. Mss.
reflexum L. Mant.
lividum l'Her. Ger.
nodosum L.
striatum L.
aconitifolium l'Her. Ger.
sylvaticum L.
maculatum L.
maculatum L.

pyrenaicum L. mant.

in de carotte. cap. or. \(\text{t} \)

a f. de carotte. cap. or. \(\text{t} \)

a f. d' Aurone. cap. or. \(\text{t} \)

a feuilles menues. cap. or. \(\text{t} \)

ERODIUM

des Alpes. &
des rochers. pyrénées. &
cicutaire. F. Z
romain. F. ①
musqué. F. ①
pubescent. Egypte. or. Z
lacinié. Alger. ②
maritime. F. Z
pulvérulent. Esp. or. &
malacoïde. F. m. ②
à f. glauques. Égypte. or. ②
Bec-de-cigogne. F. ②
Bec-de-grue. F. ②

à f. de géum. Barbarie. or. 7

petit. F. O

à f. de chamédrys. corse. or. T

incarnat. cap. or. b

GÉRANIUM

des Pyrénées. ①
tubéreux. italie. Z
à grosses racines. italie. Z

à f. d'Anémone. madère. or. 5

brun. Alpes. Z
rose. Alpes. Z
réfléchi. Alpes. Z
livide. Alpes. Z
noueux. Alpes. Z
réticulé. Italie. Z (orn.)
à feuilles d'Aconit. Alpes. Z
des bois. Alpes. Z
maculé. Am. s. Z

pratense L. varium l'Her. Ger. cineraceum Lapeyr. Fl. S incanum L. argenteum L. robertianum L. lucidum L. bohemicum L. divaricatum willd. sp. carolinianum L. lanuginosum Jacq. H. sch. molle t. columbinum L. dissectum L. rotundifolium L. sibiricum L. sanguineum L.

Monsonia speciosa s. Veg.

Genera Geraniis affinia.

TROPÆOLUM

— majus L.

— multiplex.

minus L.

IMPATIENS

Balsamina L.

Noli-tangere L.

OXALIS.

1. Foliolis binatis.

crispa Jacq. ox.
asinina Jacq. ox.
leporina Jacq. ox.?

2. Foliolis ternatis; scapo unifloro.

fabæfolia Jacq. ox.

Acetosella L.

purpurea Jacq. ox.

— laxula.

breviscapa Jacq. ox.

speciosa Jacq. ox.

— sigillata.

— rigidula.

des prés. f. ¥

cendré. pyrénées. Æ

incane. cap. or. ¥

argenté. f. m. ¥

Herbe-à-Robert. f. & (méd.)

luisant. f. ①

de Bohême. ②

étalé. Hongrie. ②

de Caroline. ②

velouté. f. ②

colombin. f. ②

découpé. f. ②

à feuilles rondes. f. ②

de Sibérie. ②

Monsonia élégant. cap. or. ψ

sanguin. F. L

Genres qui ont de l'affinité avec les Géranium.

CAPUCINE
cultivée. pérou. (orn. écon.)
— à fleurs doubles. s. ch. Z
à petites fleurs, pérou. ()

BALSAMINE

des jardins. inde. (orn.)

des bois. F. ()

OXALIS.

1. Folioles deux à deux.

crépu. cap. or. V cartilagineux. cap. or. V pied-de-lièvre. cap. or. V

2. Folioles ternées; hampe à une fleur.

à feuilles de Féve. cap. or. La des bois. F. Upourpre. cap. or. Upourpre. cap. or. Upourpre. cap. or. La à hampe courte. cap. or. La à grandes fleurs. cap. or. La — sigillé. — hérissé.

3. Foliolis ternatis, rariùs quaternis; scapo multifloro.

compressa jacq. Fragm.
tetraphylla cav. ic.

- violacea z.
maculata.
cernua jacq. ox.
quinquepunctata.

4. Caulescentes; foliis ternatis; pedunculis unifloris.

versicolor jacq. ox.
— gracilis.
elongata jacq. ox.
rubella jacq. ox.
polyphylla jacq. ox.
multiflora jacq. ox.
rosacea jacq. ox.
incarnata z.

5. Foliolis ternatis; pedunculis multifloris.

corniculata z. stricta z.

6. Foliis digitatis,

pectinata jacq. ox. flava jacq. ox. flabellifolia jacq. ox. digitata.

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

I. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus multicapsularis, capsula capitatæ.

PALAVIA

malvifolia cav. Diss.

malope parviflora l' Her. stirp.

MALOPE

malacoides z. trifida cav. piss.

KITAIBELIA
vitifolia willd. sp.

3. Folioles ternées, rarement quaternées; hampes à plusieurs fleurs.

comprimé, cap. or. T à quatre folioles. Mexique. T violet. Am. s. T tacheté. cap. or. T penché. cap. or. T. à cinq glandes. cap. or. T

4. Une tige; folioles ternées; pédoncules à une fleur.

bigarré. cap. or. Togréle.

allongé. cap. or. Touge. cap. or. Touge. cap. or. Togréle.

à feuilles nombr. cap. or. Togréleurs fleurs. cap. or. Tosacé. cap. or. Tosacé. cap. or. Togréleurs. cap. or. Togréleurs.

5. Folioles ternées ; pédoncules à plusieurs fleurs.

cornu. f. ¥ ramassé. f. ¥

6. Feuilles digitées.

pectiné. cap. or. Z jaune. cap. or. Z éventail. cap. or. Z digité. cap. or. Z

ORDRE XIV.

MALVACÉES.

I. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; plusieurs capsules réunies en tête.

PALAVIA

à feuilles de mauve. Pérou. O

MALOPÉ

à feuilles ovales. Alger. or. or à trois lobes. Afr. s. O

KITAIBÉLIA
à feuilles de vigne. Hongr. L

II. Stamine in tubum corolliferum connata; fructus multicapsularis; capsulæ in orbem dispositæ aut in unam coalitæ.

MALVA.

I. Foliis indivisis.

spicata L.
polystachya cav. Diss.
scoparia cav. et l'Her.
scabra cav. Diss.
americana L.
angustifolia cav. Diss.

2. Foliis angulatis.

asperrima Jacq. H. sch. miniata cav. Ic. fragrans cav. Diss. capensis cav. Diss. virgata cav. Diss. abutiloides L. vitifolia cav. Ic. umbellata cav. Ic. peruviana L. limensis L. caroliniana L. sherardiana L. parviflora L. verticillata L. marcolica pelile, Egyp. rotundifolia z. - sylvestris L. crispa L. Alcea L. moschata L. ægyptia L.

LAVATERA.

1. Caule fruticoso.

arborea L.
micans L.
olbia L.
pseudo-olbia.
unguiculata.
triloba L.
lusitanica L.
maritima Gouan, Ill.
acerifolia Dec. cat.
phœnicea Vent. Malm.

II. Étamines réunies en un tube adhérent à la corolle ; plusieurs capsules disposées circulairement, ou réunies en une scule.

MAUVE.

1. Feuilles entières.

à épis. Am. m. s. ch. 5 à plus. épis. rérou. s. ch. 5 à balais. rérou. s. ch. 5 rude. rérou. s. ch. 5 d'Amérique. Antilles. ① à feuill. étroit. mexiq. s. ch. 5

2. Feuilles anguleuses.

rapeuse. cap. or. 5 rouge. s. ch. b odorante. cap. or. 3 du Cap. or. 19 effilée. cap. or. 5 à f. d'Abutilon. Ant. s. ch. 5 à f. de vigne. mexique. or. 3 ombellisere. mexique. s. ch. > du Pérou. 🔾 de Lima. () de Caroline. O de Sherard. italie. or. 3 à petites fleurs. Barbarie. O verticillée. chine. O maréotique. Égypte. à feuilles rondes. F. L (méd.) sauvage. F. & (méd.) crépue. orient. O Alcee. F. T musquée. F. 7 $d'Egypte. \odot$

LAVATÉRA.

1. Tige ligneuse.

arbre. Italie. or. 5
brillant. Esp. or. 5
olbia. F. m. or. 5
faux olbia. or. 5
onguiculé. or. 5
à trois lobes. F. m. or. 5
de Portugal. or. 5
maritime. F. m. or. 5
à f. d'Erable. canaries. or. 5
à fl. pourpres. canaries. or. 5

2. Caule herbaceo.

punctata All. Auct. cretica L. thuringiaca L. trimestris L.

ALTHEA et ALCEA
rosea willd. sp.
— sinensis.
ficifolia willd. sp.
officinalis L.
narbonensis cav. piss.
cannabina L.
Ludwigii L. mant.
hirsuta L.

MALACHRA capitata z. alceæfolia jacq. ic. triloba.

PAVONIA

urens cav. piss.
cuneifolia cav. piss.
Hibiscus præmorsus L. f. }
spinifex cav. piss.
Hibiscus spinifex L. }
aristata.
zeylanica willd. sp.
Hibiscus zeylanicus L. }
parviflora.
columella jacq. H. sch.

URENA

- lobata z.
sinuata z.
multij

NAPÆA

scabra L.
sida dioica cav. piss. }
levis L.
sida Napæa cav. piss. }

SIDA

spinosa L.
frutescens cav. piss.
carpinifolia L. f.
rhombifolia L.
alnifolia L.
unilocularis l'Her. stirp.

2. Tige herbacée.

ponctué. Nice. ①
de Crète. ①
de Thuringe. ①
à opercule. F. m. ① (orn.)

ALTHÉA

Rose trémière. chine. & (orn.)
— de Chine.

à f. de Figuier. sibér. & (orn.)
officinal. F. Z (méd.)
de Narbonne. &
à feuilles de chanvre. F. m. &
de Ludwig. sicile.
velu. F. O

MALACHRA

à fleurs en tête. Antilles. ①
à feuilles d'Alcéa. caracas. ①
à trois lobes. ①

PAVONIA.

piquant. île de Fr. s. ch. 5
cunciforme. cap. or. 5

épineux. Antilles. s. ch. 5

— à longues arêtes.

de Ceylan. O

à petites fleurs. s. ch. 5 de Bourbon. s. ch. 5

URENA

à f. lobées. chine. s. ch. 5 à f. sinuées. Antilles. s. ch. 5

NAPÉA

rude. Am. s. T

lisse. Am. s. Z

SIDA

épineux. Antilles. ①
arbrisseau. s. ch. 5
à f. de charme. canar. or. 5
rhomboïdal. Inde. s. ch. 5
à feuilles d'Aune. Inde. ②
à une loge. île de fr. ①

- .' .

retusa L. viscosa L. angustifolia cav. piss. umbellata L. triquetra L. virgata cav. Ic. periplocifolia L. nutans l'Her. stirp. fragrans l'Her. stirp. ricinoides l'Her. stirp. palmata cav. Diss. nudiflora l'Her. stirp. stellata cav. Diss. crassifolia l'Her. stirp. glauca cav. Ic. tricuspis. mollissima cav. Diss. arborea L. f. peruviana cav. Diss. reflexa cav. Diss. retrorsa l'Her. stirp. tiliæfolia. gigantea Jacq. H. sch. palmata cav. piss. jatrophoides l'Her. stirp. S Abutilon L. indica L. occidentalis L. asiatica L. hirta cav. Diss. pilosa l'Her. stirp. S mollis ortega, Dec. mauritiana l'Her. stirp. triloba Jacq. H. sch. hastata willd. sp. Anoda hastata cav. piss. cristata. Anoda cristata cav. Diss. parviflora. Anoda parviflora cav. piss.

III. Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita; fructus simplex, multilocularis.

Hibiscus
solandra l'Her. stirp.
solandra lobata syst. veget.
palustris L.

C. 15 - 1. .

- - 1 1 10.

were the second

émoussé. inde. 🕥 visqueux. Antilles. s. ch. 5 à f. étroit. île de Bourb. s. ch. 5 ombellisère. Antilles. O triangulaire. Antilles. s. ch. 5 effilé. pérou. s. ch. 🕥 à f. de périploca. Ant. s. ch. 5 à fl. penchées. pérou. s. ch. 5 odorant. Antilles. s. ch. 5 à feuilles de Ricin. Pérou. O à fleurs nues. Antilles. s. ch. 5 à f. épaisses. Antilles. s. ch. 5 glauque. sénégal. s. ch. 5 à trois pointes. s. ch. b velouté. Pérou. s. ch. 5 arbre. pérou. s. ch. 9 résléchi. pérou. s. ch. 5 à f. de rilleul. Ant. s. ch. 5 gigantesque. Antilles. s. ch. 5 à feuilles palmées. rérou. O Abutilon. suisse. O des Indes. s. ch. b d'Occident. Antilles. O d'Asie. Inde. \odot hérissé. mde. 🔾 à f. molles. pérou. s. ch. 5 de l'Ile de France. s. ch. 5 à trois lobes. cap. or. 5 hasté. mexique. O à crête. mexique. O à petites. fleurs. mexique. O

III. Étamines indéfinies, réunies en un tube adhérent à la corolle; une capsule à plusieurs loges.

HIBISCUS

à trois lobes. île de Bourb. ⊙ des marais. Am. s. ¼ (orn.)

moscheutos L.
speciosus H. K.
pentacarpos L.
militaris cav. Diss.

+ populneus z. vd Tespesia populnea.

tiliaceus z.
 mutabilis z.

- Rosa-sinensis L.

phœniceus L. f.

syriacus L.

scaber Encycl.

ficulneus cav. Diss. (non L.)

diversifolius willd. sp.

manihot L.

heterophyllus vent. malm.

cannabinus L.

digitatus cav. Diss.

Abelmoschus £.

— esculentus L.
sabdariffa L.
tubulosus cav. Diss.
vitifolius L. Mant.
pedunculatus L. f.
rrionum L.

MALVAVISCUS

arboreus cav. Diss.

Achania malvaviscus II. K.

Hibiscus malvaviscus Z.

LAGUNEA

squamea vent. malm.

Hibiscus patersonius Andr.

Rep.

GOSSYPIUM

herbaceum z.
arboreum z.
hirsutum z.
vitifolium encycl.
purpureum.

II". Stamina basi in urceolum sessilem connata; omnia fertilia, definita aut indefinita.

MELOCHIA

pyramidata z.
corchorifolia z.
ovata.
Brotera ovata cap. ic.
tomentosa z.

moscheutos. Am. s. Z (orn.)
à fl. pourpres. Am. s. Z (orn.)
à cinq fruits. Italie. Z
à f. hastées. Louisiane. or. Z
à f. de reuplier. Inde. s. ch. b
à f. de Tilleul. Inde. s. ch. b
à fl. changeantes. Inde. s ch. b
Rose de Chine. s. ch. b (orn.)
rose. Inde. s. ch. b
Mauve en arbre. orient. b (orn.)

à feuill. rudes. ceylan. s.ch. 3

à grandes fleurs. Inde. s. ch. 5 à feuill. var. N. Holl. s. ch. 5 à feuilles de chanvre. Inde. O digité. Mexique. s. ch. 5 Abelmosc. Inde. s. ch. 5 comestible. Inde. (alim.) oseille de Guinée. Inde. (buinée. Inde. ch. 5 à longs pédoncules. cap. or. 5 vésiculeux. Italie. (c)

MALVAVISCUS

en arbre. Antilles. s. ch. p

LAGUNÉA

écailleux. N. Holl. or. 5

COTONNIER

de Malte. orient. or. 5 (orn.) en arbre. inde. s. ch. 5 velu. Antilles. s. ch. 5 à f. de vigne inde. s. ch. 5 pourpre. Antilles. s. ch. 5

IV. Étamines toutes sertiles, définies ou indéfinies; silets réunis à la base en un corps sessile et evasé.

MÉLOCHIA

pyramidal. Brésil. s. ch. Z à feuilles de cocréte. inde. O à f. ovales. N. Esp. s. ch. Z cotonneux. Antilles. s. ch. D STUARTIA

malacodendrum L.

pentagyna l'Her. stirp

Lasianthus l'ner. stirp.

pubescens l'ner. stirp.

Bombax ceiba L.

Adansonia Baobab L.

on the training and the

V. Stamina basi in urceolum sessilem connatu; sterilia fertilibus intermixta, definita aut indefinita.

Pentapetes phænicea L.

fastuosa Jacq. Hort.
Ambroma augusta L. f.

GUAZUMA
ulmifolia.

Theobroma Guazuma z.

Bubroma Guazuma willd. sp.

Dombeya - ferruginea

- ferruginea cav. Diss.

BYTTNERIA ovata Encycl.

VI. Stamina basi in urceolum germini arctè circumpositum et cum ipso stipitatum connata, plerumquè definita et fertilia.

AYENIA pusilla z.

Helicteres
althæifolia encycl.

" Was I'm, or

STERCULIA
monosperma vent. Malm.
platanifolia L. f.
fœtida z.

STUARTIA .

monostyle. caroline. or. D à cinq styles. virginie. or. D

à f. glabres. caroline. or. 5.
pubescent. caroline. or. 5

BOMBAX ceiba. Inde. s. ch. 5

ADANSONIA

digité, pain-de-singe. Afr. s.

ch. 5

V. Étamines définies ou indéfinies, les unes stériles, les autres fertiles; filets réunis à la base en un corps sessile et évasé.

PENTAPÈTES écarlate. Inde. O

ABROMA
à larges feuilles. 1nde. s. ch. 5

à f. d'orme. Antilles. s. ch. 5

Dombey A

ferrugineux. île de F. s. ch. p

à angles aigus. île de F. s. ch. p

Byttnéria à feuill. ovales. pérou. s. ch. 5

VI. Étamines ordinairement définies et fertiles; filets réunis à la base autour de l'ovaire en un godet porté sur un pédicelle.

AYÉNIA

petit. Antilles. s. ch. &

HELICTÈRES à f. d'Althéa. Antilles. s. ch. 5

STERCULIA

monosperme. inde. s. ch. 9

à f. de Platane. chine. or. 9

fétide. inde. s. ch. 9

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM

floridanum z. mant. parviflorum vent. H. cels.

MAGNOLIA

grandiflora z.
glauca z.
acuminata z.
tripetala z.
umbrella Encycl. {
macrophylla mich. Fl.
auriculata mich. Fl.
yulan.
purpurea Bot. Mag.
obovata willd. sp.
discolor vent. malm.
pumila Andr. Rep.

Liriodendrum rulipifera L.

Genera Magnoliis affinia.

DILLENIA

scandens willd. sp.
volubilis vent. malm.
speciosa Bot. mag.
Hibbertia volubilis Andr. Rep.

ORDO XVI.

ANNONÆ.

Jameolifera pedunculata z.?

ANNONA

- squamosa z.

Il a marit

に 「ん」、

cherimolia Encycl. }
tripetala H. K. }
glabra L.
triloba L.
orchidocarpon arietinum
Mich. Fl.

ORDRE XV. h.

MAGNOLIERS.

BADIANE

de la Floride. or. 5 (écon.) à petites fleurs. Floride. or. 5

MAGNOLIA

à grandes fl. Flor. or. 5 (orn.) glauque. virginie. 5 (orn.) à f. aiguës. Am. s. 5 (orn.)

ombrelle. Am. s. h (orn.)

à grandes f. Am. s. b (orn.)
auriculé. Am. s. s. ch. b (orn.)
rulan. chine. or. b (orn.)

pourpre. chine. or. 5 (orn.)

nain. chine. or. 5 (orn.)

TULIPIER

de Virginie. 5 (orn.)

Genres qui ont de l'affinité avec les Magnoliers.

DILLÉNIA

sarmenteux. N. Holl. or. 3

ORDRE XVI.

ANNONES.

Jamboliféra pédonculé. inde. s. ch. 5

ANNONE

écailleuse, pomme-cannelle.

ind. s. ch. p
chérimolia. pérou. s. ch. p
(alim.)
glabre. caroline. s. ch. p

à trois lobes, Assiminier. Am. s. 5

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS Pareira L.

Menispermum
canadense L.
virginicum L.
carolinum L.

Schisandra coccinea mich. Fl.

ORDO XVIII.

BERBERIDES.

BERBERIS

vulgaris z.

-- rubra.

- violacea.

- canadensis.

cretica L.

sibirica willd. sp.

sinensis.

NANDINA

domestica Bot. Magaz.

Epimedium alpinum L.

Hamamelis virginiana L.

ORDO XIX.

TILIACEÆ.

I. Stamina basi monadelpha definita.

WALTHERIA

americana L.
arborescens cav. piss.
indica Jacq. Ic.

HERMANNIA

denudata L. f. hyssopifolia L.

ORDRE XVII.

MÉNISPERMES.

Cissampélos pareira-brava. Antilles. s. ch. 5

(méd.)

MÉNISPERME

de Canada. 5 de Virginie. 5

de Caroline. 5

Schisandra écarlate. Am. s. 5

ORDRE XVIII.

VINETTIERS.

BERBÉRIS

Epine-vinette. F. 5 (écon. méd.)

- à fruit rouge.

— à fruit violet.

— de Canada.

de Crête. 5

de Sibérie. 5

de Chine. 5

NANDINA

de Chine. s. ch. y

EPIMÉDIUM

des Alpes. 5

HAMAMÉLIS

de Virginie. 5

ORDRE XIX.

TILIACÉES.

I. Étamines définics, réunies à la base.

WALTHÉRIA

d'Amérique. Antilles. s. ch. 5

HERMANNIA

lisse. cap. or. 5

à f. d'Hysope. cap, or. 5

lavandulæfolia z. althæifolia z. cuneifolia sacq. H. sch. alnifolia z. micans schrad. sert. latifolia Jacq. H. sch. rotundifolia Jacq. 1c.) disticha willd. sp. angularis Jacq. H. sch. trifoliata z. pulverata Andr. Rep. scabra Jacq. H. sch. multiflora Jacq. H. sch.

MAHERNIA

pinnata s. veg. glabrata L. f. verticillata L. mant.

II. Scamina distincta, plerumque indefinita; fructus multilocularis.

Corchorus

hirsutus z. siliquosus L. tridens L. Mant. trilocularis z. olitorius z. hirtus z. æstuans L. Mant.

HELIOCARPUS americanus L.

TRIUMFETTA Lappula L.

FLACURTIA

Ramontchi l'Her. stirp. GREWIA CE ..

nitida Juss. Ann. occidentalis z. carpinifolia Juss. ann. asiatica L. Mant.

TILIA

Ssylvestris. 11 2 poea. microphylla vent. Inst. platiphyllos vent. inst. - villosa. pubescens vent. Inst.

à f. de Lavande. cap. or. 19 à f. d'Althéa. cap. or. 5 cunéiforme. cap. or. 5 à feuilles d'Aune. cap. or. 5 à feuill. brillantes. cap. or. 3)

à feuilles rondes. cap. or. 3 anguleux. cap. or. h trifolié. cap. or. 5 pulvérulent. cap. or. 5 rude. cap. or. h

à fleurs nombr. cap. or. 9

MAHERNIA

à feuilles pennées. cap. or. 9 glabre. cap. or. 5 verticillé. cap. or. 5

II. Étamines distinctes, ordinairement indéfinies; fruit à plusieurs loges.

Corchorus

velu. Antilles. s. ch. 5 siliqueux. Antilles. s. ch. 5 à trois dents. Inde. O à trois loges. Inde. O cultivé. Afr. s. O hérissé. Antilles. 🕥 à six pointes. Antilles. O

HÉLIOCARPUS d'Amérique. Antilles. s. ch. 3

TRIUMFETTA hérissé. Antilles. s. ch. 5

FLACURTIA Ramontchi. Inde. s. ch. 3

GRÉWIA

à feuilles luis. chine. s. ch. p d'Occident. cap. or. 5 à f. de charme. Guin. s. ch. 3 d'Asie. s. ch. y

TILLEUL

sauvage. F. b (orn. méd.) de Hollande. F. 5 (orn. med.) - velu. pubescent, Am. s. 5 (orn.)

americana L.
glabra Vent. Inst.
canadensis Mich. Fl.
argentea.
rotundifolia Vent. Inst.
alba Willd. sp.

BIXA

- orellana z.

ORDO XX.

CISTI.

CISTUS.

1. Corolla alba aut flavescens.

populifolius L. laurifolius L. ladaniferus L. — maculatus. monspeliensis L. salvifolius L.

2. Corolla rosea.

symphytifolius Encycl. vaginatus H. K. }

purpureus Encycl.
villosus S. Veg.
complicatus Encycl.
incanus L.
albidus L.
crispus L.
creticus L.

HELIANTHEMUM (CISTUS Lin.).

1. Exstipulata fruticosa.

umbellatum L.
halimifolium L.
ocymoides Encycl.
alyssoides Encycl.
lævipes L.
Fumana L.
marifolium L.

2. Stipulata fruticosa.

squamatum z. Lippii z. mant. d'Amérique. 5 (orn.)

argenté. Hongrie. 5 (orn.)

Rocov cultivé. Antilles. s. ch. 5 (arts.)

ORDRE XX.

CISTES

CISTE.

1. Corolle blanche on jaune.

à f. de Peuplier. Esp. or. 5 à f. de Laurier. F. m. or. 5 ladanifère. Alger. or. 5 — maculé. de Montpellier. or. 5 à f. de sauge. F. m. or. 5

2. Corolle rose.

à f. de consoude. canar. or. y

pourpre. orient. or. 5
velu. esp. or. 5
plissé. orient. or. 5
incane. orient. or. 5
cotonneux. f. m. or. 5
crépu. f. m. or. 5
de Crète. or. 5 (méd.)

HELIANTHÉME.

ombellisere. F. 5

à f. d'halime. F. m. or. n à f. de Basilic. Esp. or. n à feuilles d'Alysson. F. n glauque. F. m. or. n Fumana. F. n à feuilles de Marum. F. n

2. Tiges ligneuses; feuilles accompagnées

écailleux. Esp. or. 5 de Lippi. Égypte. or. 5 lavandulæfolium Encycl. syriacum Jacq. 1c.
serpyllifolium L.
thymifolium L.
pilosum L.
vulgare.
— latifolium.
mutabile Jacq. 1c.

3. Exstipulata herbacea.

guttatum L.

4. Stipulata herbacea.

ledifolium L.
salicifolium L.
niloticum L. mant.
ægyptiacum L.

Genera Cistis affinia.

Fructus trivalvis; valvis seminiferis; stamina definita.

IONIDIUM.

polygalæfolium *vent. Malm.* \ viola verticillata *ortega* , *pec.* \

VIOLA.

1. Acaules.

hirta L.
palustris L.
odorata L.
palmata L.

2. Caulescentes; stipulis indivisis.

canina L.
mirabilis L.
striata H. K.
canadensis L.
montana L.
biflora L.
arborescens L.

3. Stipulis pinnatifidis.

tricolor L.

— hortensis.

rhotomagensis.

grandiflora L. mant.

calcarata L.

cornuta L.

à f. de Lavande. F. m. or. 5
à feuilles de serpolet. F. 5
à f. de Thym. F. m. or. 5
velu. F. 5
commun. F. 5
— à larges feuilles.
à fl. changeantes. F. m. 5

3. Tiges herbacées; point de stipules. maculé. F. ①

4. Tiges herbacées; feuilles accompagnées de stipules.

à feuilles de Lédum. F. m. ①
à feuilles de saule. F. m. ②
du Nil. ③
d'Égypte. ④

Genres qui ont de l'affinité avec les Cistes.

3 valves séminifères; étamines définies:

FONIDIUM

à f. de Polygala. N. Esp. or. L

VIOLETTE.

1. Tige nulle.

velue. F. Z

des marais. F. Z

odorante. F. Z (orn.)

palmée. virginie. Z

2. Une tige; stipules entières.

de chien. F. W sans corolle. F. W striée. Am. s. W de Canada. W de montagne. Alpes. W à deux fleurs. Alpes. W arbrisseau. Esp. or. 5

3. Stipules pinnatisides:

tricolor. f. (orn.)
— des jardins.
de Rouen. f. L
à grandes fl. pyrén. L (orn.)
à long éperon. Alpes. L
cornue. pyrénées. L

ORDO XXI.

RUTACEÆ.

I. Folia stipulacea, sapiùs opposita.

TRIBULUS terrestris £. cistoides £.

FAGONIA cretica z.

Zygophyllum Fabago L. morgsana L. album L.

GUAIACUM sanctum L.

LARREA nitida cav. 1c.

Porliera hygrometra fl. peruv.

Boronia pinnata smith, soc. Lin.

CORREA alba L. virens smith, Exot. Bot.

CROVEA saligna smith, soc. Lin.

RUTA
sylvestris.
legitima jacq. ic.
montana H. K.
graveolens L.
chalepensis L. Mant.?
linifolia L.
pinnata L. f.

Peganum Harmala z.

DICTAMNUS albus L.

ORDRE XXI.

RUTACÉES.

I. Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules.

Tribulus
hérissé. f. ①
à fleurs de ciste. Antilles. ①

FAGONIA

de Crète. or. 3

FABAGELLE
commune. orient. L
membraneuse. cap. or. L
à fleurs blanches. Barb. or. 5

Canac commun. Ant. s. ch. 5 (méd. arts.)

Larréa à f. luis. Buénos-ayres. s. ch. 5

Portiéra hygrométrique. pérou. s. ch. p

Boronia
à f. pennées. N. Holl. or. 5

Corréa
à fl. blanches. n. Holl. or. p
à fl. vertes. n. Holl. or. p

CROVÉA
à f. de saule. N. Holl. or. 5
Rue

sauvage. Barbarie. or. 5.

puante. F. L' (méd.)
ciliée. orient. or. 19
à feuilles de Lin. Esp. or. L
à f. pennées. canaries. or. 19

PÉGANUM

Harmala. Barbarie. T

FRAXINELLE cultivée. F. m. \pm (orn.)

Genera Rutaceis affinia.

Melianthus
major L.
minor L.
comosus vahl, symb.

rubra L.
purpurea.
virgata Encycl.
deflexa.
ciliata L.
prolifera.
Bucco prolifera wendl.
hirsuta L.
uniflora L.
Glandulifolia uniflora wendl.
sert.
acuminata.
Bucco acuminata wendl.

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ.

I. Calix partitus; stamina 3; stylus i aut 3.

ORTEGIA hispanica L.

HOLOSTEUM umbellatum £.

Polycarpon tetraphyllum L.

Mollugo verticillata L.

MINUARTIA campestris L. dichotoma L.

Polycarpea teneriffæ encycl. mollia diffusa willd. H. Ber.

Queria canadensis E.

Genres qui ont de l'affinité avec les Rutacées.

Mélianthus

à larges feuilles. cap. or. 5

à feuilles étroites. cap. or. 5

velu. cap. or. 5

rouge. cap. or. 5
pourpre. cap. or. 5
effilé. cap. or. 5
à feuill. abaissées. cap. or. 5
cilié. cap. or. 5
prolifère. cap. or. 5
velu. cap. or. 5

ORDRE XXII. CARYOPHYLLEES.

acuminé. cap. or. b

1. Calice partagé; 3 étamines; 1-3 styles.

ORTÉGIA d'Espagne. O

HOLOSTÉUM ombellifère. F. 🔾

POLYCARPON
à quatre feuilles. F. O

Mollugo verticillé. Am. s. O

MINUARTIA

des champs. Esp. O

dichotome. Esp. O

Polycarpéa de Ténériffe. 🔾

Quéria de Canada. O II. Calix partitus; stamina 4; styli 2-4.

Bufonia tenuifolia z.

procumbens L. erecta L.

III. Calix partitus; stamina 5 ad 8; styli 2 ad 4.

ALSINE

media z.

segetalis z.

mucronata z.

PHARNACEUM cerviana L.

Moehringia muscosa L.

ELATINE

Hydropiper L.

Alsinastrum L.

IV. Calix partitus; stamina 10; styli 3
aut 5.

nodosa z.
arvensis z.
pentandra z.
saginoides z.

CERASTIUM.

1. Capsulis oblongis.

perfoliatum L.
vulgatum smith, Fl. \
viscosum curt. Fl. \
semidecandrum curtis, Fl.
viscosum smith, Fl. \
vulgatum curtis, Fl. \
dichotomum L.
arvense L.
alpinum L.

2. Capsulis subrotundis.

tomentosum Encycl.
repens willd. Enum. (an Ļ.?)
latifolium L.
aquaticum L.

II. Calice partagé; 4 étamines; 2-4 styles,

Bufonia à feuilles menues. F. 🔾

SAGINA couché. f. O droit. f. O

III. Calice partagé; 5-8 étamines; 2-3

des oiseaux. f. o
des moissons. f. o
pointu. f. o

PHARNACÉUM filiforme. Esp. 🕣

Moéhringia touffu. Alpes. Z

ELATINÉ
à feuilles de serpolet. r.
verticillé. r.

IV. Calice partagé; 10 étamines; 3 on 5 styles.

ESPARGOUTTE
noueuse. F. V.
des champs. F. ①
à cinq étamines. F. ①
à feuilles de sagina. F. V

CÉRASTIUM.

1. Capsules oblongues.

perfolié. orient. ①
aggloméré. F. ①
à cinq étamines. F. ①
commun. F. ¥
dichotome. Esp. ②
des champs. F. Z
des Alpes. F. Z

2. Capsules arrondies.

à larges feuilles. Alpes. La aquatique. F. L

CHERLERIA	CHERLÉRYA
sedoides Le	sédoïde. Alpes. 72
ARENARIA	ARÉNARIA
peploides z.	à feuilles de Péplis. F. V
tetraquetra z.	tétragône. F. m. Z
biflora L. Mant.	à deux fleurs. Alpes. Z
trinervia z.	à trois nervures. F. O
ciliata L.	cilié. Alpes. 72
serpyllifolia z.	à feuilles de serpolet. F. 🔾
balearica l'Her. stirp,	de Mahon, W
montana L.	de montagne. F. W
rubra L.	rouge. F. 🔾
media z.	membraneux. f. 🔾
dianthoides smith, 1c.?	à fleurs d'oxillet. orient. W
cucubaloides smith, 1c.	à fleurs de Béhen, orient. 75
saxatilis z.	des rochers. F. Z
striata L.	strié. f. V
verna L. Mant.	printanier. F. L
tenuifolia L.	à feuilles menues. F. ①
fasciculata Jacq. 1c.	fasciculé. F. 🔾
triflora L. Mant.	à trois fleurs. F. ¥
STELLARIA	STELLULAIRE
nemorum L.	des bois. F. T
Holostea L.	des haies. F. V
graminea L.	à feuilles de Gramen. F. Z
uliginosa curt. Fl.	
Alsine willd. sp.	des marais f. O
TTT COLD TO THE	ST Cli
V. Calix tubulosus; stamina 10; styli 2-5.	V. Calice en tube; 10 étamines; 2-5 style
GYPSOPHILA	GYPSOPHILA
repens L.	rampant. Alpes, T
prostrata L.	couché. Alpes. T
viscosa s. veg.	visqueux. orient. ⊙
paniculata L.	paniculé. sibérie. ¥
grandiflora.	— à grandes fleurs.
glomerata marsch. cauc.	aggloméré. caucase. ¥
altissima L.	élevé. sibérie. 4
struthium z.	struthium. Esp. or. b
fastigiata Encycl. (an Lin.?)	corymbisere. Alpes. T
perfoliata z.	perfolié. Esp. Z
muralis z.	des murailles. F. &
saxifraga z.	caliculé. f. T
SAPONARIA	SAPONAIRE
officinalis z.	ofsicinale. f. v (méd.)
vaccaria L.	anguleuse. F. ①
ocymoides z.	à feuilles de Basilic. F. Z
ļutea 4.	jaune. Alpes. 12

orientalis L. porrigens Jacq. nort.

DIANTHUS.

1. Flores aggregati.

barbatus L.
carthusianorum L.
Armeria L.
prolifer L.
atrorubens All. Ped.
ferrugineus L. Mant.
collinus Wald. et Kitt. Hung.
aggregatus Encycl. suppl.
capitatus Wald. et Kitt. Hung.

2. Flores solitarii plures in codem caulc.

corymbosus Encycl. suppl. caryophyllus L. - ruber. moschatus Mayer. plumarius Dec. Fl. monspessulanus Dec. Fl. superbus L. chinensis L. deltoides L. attenuatus smith, soc. Lin. longislorus Encycl. leptopetalus marsch. cauc. bicolor wald. et Kitt. Hung. squarrosus marsch. cauc. arenarius L, dubius pec. cat. biflorus pelongch. Journ. de Bot. ochroleucus pers. syn. rhutenicus Encycl. suppl. caucasicus marsch. cauc. serotinus Wald. et Kitt. Hung.

3. Caule subunifloro, herbaceo. alpinus L.

4. Caule fruticoso.

rigidus marsch. cauc. involucratus Encycl. suppl. arboreus L.

-- , my ...

d'Orient. O à longs pédoncules. orient. O

OEILLET.

1. Fleurs aggrégées.

de poète. F. &

à trois nervures. F. W

velu. F. ①

prolifère. F. ①

brun-pourpre. Alpes. &

rouillé. Italie. &

des collines. Hongrie. W

à fleurs servées. W

à fleurs en tête. Hongrie. W

2. Plusieurs fleurs solitaires sur la même tige.

corymbifere. ¥ (orn.)
des jardins. F. ಒ (orn.)
— ratafiat.

mignardise. Z (orn.)

de Montpellier. & (orn.) superbe. Alpes. & (orn.) de Chine. O (orn.) deltoïde. F. &

à long calice. f. m. ¥

à pétales linéaires. caucase. Le bicolor. Hongrie. Le rude. caucase. Le des sables. F. Le douteux. Le biflore. F. Le

jaune-pâle: orient. ¥ de Russie. ѣ du Caucase. ѣ tardif. Hongrie. ¥

3. Tige herbacée, à une sleur. des Alpes. &

4. Tige ligneuse.

à feuilles roides. caucase. 5 à involucre. or. 5 à f. épaisses. orient. or. 5

SILÉNÉ.

1. Floribus solitariis, lateralibus.

lusitanica L.
quinque vulnera L.
gallica L.
hispida nesf. Atl.
tridentata nesf. Atl.
nocturna L.
sericea All. ped.

- 2. Floribus lateralibus, confertis.

 arenaria nesf. Atl.

 cypsophila
 tricuspidata.
 nutans L.
 paradoxa L.
 ocymoides.
 suffruticosa.
 fruticosa L.
 longiflora willd. sp.
 buplevroides L.
 gigantea L.
 viridiflora L.
 chlorantha willd. sp.
- 3. Floribus ex dichotomia caulis, sedoides Desf. All. conoidea z. conica L. Behen L. dichotoma wald. et Kitt. Hung. pendula L. bellidifolia Jacq. Hort. noctiflora L. maritima willd. sp. anțirrhina z. inaperla L. polyphylla L. portensis L. apetala willd. sp. cretica L. glauca zea. muscipula L. rubella L.? ornata H. K. bipartita Desf. All. hispanica sacq. Fragm. S stricta L.

1. Fleurs solitaires, latérales.

de Portugal. ①
à cinq taches. F. ①
sans dents. F. ①
hérissé. Barbarie. ②
à trois dents. Barbarie. ②
nocturne. F. m. ①
soyeux. F. m. ①

- 3. Fleurs dans la bifurcation des tiges. à feuilles de sédum. Barbar. O à gros fruit. F. 🔾 conique. F. O faux Behen. orient. O dichotome Hongrie. O à fleurs pendantes. crète. O à feuilles de paquerette. O noctiflore. suisse. O maritime. F. Z à feuilles linéaires. Am. s. 🔾 fermé. Eur. austr. 🕥 à feuilles nombreuses. All. O paniculé. Portugal. O apétale. O de Crète. O glauque. O gobe-mouche. F. m. O incarnat. orient. O à fleurs pourpres cap. or. of à sleurs roses. Alger. O (orn.) à fleurs serrées. F. m. 🛈

4. Floribus terminalibus.	4. Fleurs terminales.
chloræfolia smith, 1c.	à f. de chlora. orient. or. ¥
picta Pers. syn.	à réseau. F. m. Z
flavescens wald. et kitt. Hung.	à fleurs jaunes. Hongrie. V
Armeria L.	à bouquets. F. O (orn.)
Atocion Jacq. Hort. orchidea L. f.	Atocion. orient. ①
rupestris z.	des rochers. Alpes. o
quadridentata pec. Fl.	
alpestris jacq. Austr.	à quatre dents. Alpes. T
saxifraga L.	saxifrage. Alpes. To
vallesia z.	du Valais. V
acaulis z.	sans tige. Alpes. Z
CUCUBALUS .	BÉ H E N
stellatus z.	étoilé. Am. s. ¥
bacciferus z.	baccifere. F. V
вehen L.	commun. F. K
- alpinus.	—des Alpes.
— angustifolius.	-à feuilles étroites.
roseus.	- à fleurs roses.
fabarius L.	dichotome. sicile. or. Z
tataricus z.	de Tartarie. 🕦
sibiricus z.	de Sibérie. 😮
multiflorus willd. sp.	à fleurs nombr. Hongrie. E
cæspitosus.	touffu. Z
viscosus L.	visqueux. Italie. &
catholicus z.	de Rome. F. V
fimbriatus marsch. cauc.	lacinié. caucase. V
otites z.	dioïque. F. Z
volgensis willd. Enum. suppl.	du Volga. Z
Lychnis	LYCHNIS
grandiflora sacq. sc. } coronata Thunb. sap. }	à grandes fl. sap. or. 14 (orn.)
chalcedonica z.	croix-de-Jérusalem. Russie. ¥ (orn.)
Flos-cuçuli z.	des prés. F. T
viscaria L.	visqueux. F. Z
alpina z.	des Alpes. W
dioica z.	dioïque. F. ¥
- rubra.	- rouge.
GITHAGO	GITHAGO
(segetum.	
- { Agrostemma Githago L. }	Nielle-des-blés. F. 🔾
AGROSTEMMA	AGROSTEMMA
coronaria L.	coquelourde. F. & (orn.)

rlos-jovis L.
cœli-rosa L.
parviflora cav. Ic.

VI. Calix tubulosus; stamina pauciora quam 10; styli 2-3.

Velezia rigida z.

Genera Caryophylleis affinia.

FRANKENIA
levis L.
pulverulenta L.
hirsuta L.
virens.

LINUM.

II. Floribus caruleis, albis aut rubentibus.

usitatissimum L.
perenne L.
narbonense L.
austriacum L.
hirsutum L.
tenuifolium L.
alpinum Jacq. Austr.
catharticum L.
Radiola L.

2. Floribus luteis.

gallicum L.
strictum L.
suffruticosum L.
africanum L.
trigynum Bot. Magaz.
quadrifolium L.
maritimum L.
campanulatum L.

rose. Alpes. Z (orn.)
maritime. F. O. (orn.)
à petites fleurs. Esp. O

VI. Calice en tube; moins de 10 étamines; 2-3 styles.

Vélézia à feuilles roides, esp. 🕥

Genres qui ont de l'affinité avec les Caryophyllées.

FRANKÉNIA
lisse. f. Z
pulvérulent. f. ()
velu. orient. y
verdátre. Z

L_{IN} .

1. Fleurs bleues, blanches ou rouges.

cultivé. ① (écon. méd.)
vivace. sibérie. Z (écon.)
de Narbonne. Z
d'Autriche. Z
velu. Autriche. Z
à feuilles menues. F. Z
des Alpes. Z
cathartique. F. ② (méd.)
Radiola. F. ②

2. Fleurs jaunes.

à petites fleurs. F. ①
rude. F. m. ♂
sous-arbrisseau. Esp. or. 为
d'Afrique. cap. or. 为
à trois styles. Inde. or. 为
à f. quaternées. cap. or. 为
maritime. F. 龙
campanulé. F. m. or. 윦

CLASSIS XIV.

POLYPETALE.

(Stamina perigyna.)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

TILLÆA muscosa z.

Bulliarda
vaillantii *dec. fl.*rillæa aquatica *L.*rillæa vaillantii *willd. sp.*

CRASSULA.

1. Herbacea.

glomerata L. Mant.
ciliata L.
calicina.
acutifolia Encycl.
rubens L. f.
sedum rubens L.
lycopodioides Encycl.
muscosa L.

2. Fruticosa.

coccinea L.
scabra L.
perfoliata L.
perfossa Encycl.
tetragona L.
obvallata L. Mant.
cultrata L.
falcata H. K.
Rochea falcata Dec. Pl. Gr.
portulacea Encycl.
obliqua H. K.
lucida Encycl.
spathulata Thunb. Prodr.

CLASSE XIV.

DICOTYLÉDONS

POLYPÉTALES.

(Etamines attachées au calice.)

ORDREI.

JOUBARBES.

TILLÉA nain. f. 🔾

BULLIARDA

de Vaillant. F. O

CRASSULE.

1. Tiges herbacees.

agglomérée. cap. ⊙
ciliée. cap. or. ℤ
à grand calice. N. Holl. or. ℤ
à feuilles aiguës. cap. or. 및

rouge. F. O

erbiculaire. cap. or. The Lycopode. cap. or. The

2. Tiges ligneuses.

écarlate. cap. or. 5 (orn.)
rude. cap. or. 5
perfoliée. cap. or. 5
enfilée. cap. or. 5
tétragône. cap. or. 5
à feuilles en scie. cap. or. 5
en serpe. cap. or. 5

falciforme. cap. or. 5 (orn.)

à f. de pourpier. cap. or. 5

luisante. cap. or. 3

cordata L. f. lactea H. K. cotyledon Jacq. miscell.

Codicione 1.

COTYLEDON

coccinea cav. ic.
orbiculata L.
hemisphærica L.
ungulata Encycl.
tuberculosa Encycl.
hispida Encycl.
viscosa vahl, symb.
hispanica L.
umbilicus L.
lusitanica Encycl.
lutea H. K.

KALANCOE

| Solution | Solution

SEDUM.

1. Planifolia.

Rhodiola.
Rhodiola rosea L.

Telephium L.

— purpureum.

— maximum.

Anacampseros L.

— longifolium.

Aizoon L.

stellatum L.

hybridum L.

populifolium L. f.

cepæa L.

2. Teretifolia.

dasyphyllum L.
reflexum L.
virens H. K.
rupestre L.
altissimum Encycl.
sempervivum sedifolium
Jacq. Hort.

en cœur. cap. or. 5 blanche. cap. or. 5 cotylédon. cap. or. 5

COTYLÉDON

safrané. s. ch. 5
orbiculaire. cap. or. 5
hémisphérique. cap. or. 5
ongulé. cap. or. 5
tuberculeux. cap. or. 5
hispide. Barbarie. ①
d'Espagne. ①
Nombril-de-Vénus. 7. 72
corymbifère. Angleterre. 7

KALANCOÉ

en spatule. chine. s. ch. 5 d'Egypte. s. ch. 5

crénelé. cap. or. 5

SÉDUM.

1. Feuilles aplaties.

odorant. Alpes. ¥

orpin. F. ¥ (méd.)

— pourpre.

— à larges feuilles.

Anacampséros. F. Æ

— à feuilles longues.

Aïzoon. sibérie. ¥

étoilé. F. ①

hybride. Tartarie. ¥

à f. de peuplier. sibérie. Æ

cépéa. F. ①

2. Feuilles cylindriques.
à feuilles courtes. Alpes. &
penché. F. Z
verdoyant. Portugal. Z
des rochers. F. &

élevé. Eur. 4

hispanicum L.
album L.
sexfidum Marsch. cauc.
glaucum Wald. et Kitt. Hung.
saxatile Dec. syn.
acre L.
sexangulare L.
anglicum H. K.
villosum L.
nudum H. K.
cruciatum.
monregalense Balbis.

Sempervivum

arboreum L.

canariense L.

glutinosum H. K.

tortuosum H. K.

villosum H. K.

Aizoides Encyclitectorum L.

globiferum L.

hirtum L.

montanum L.

arachnoideum L.

monanthos H. K.

PENTHORUM sedoides z:

ORDO II.

SAXIFRAGEÆ.

I. Fructus superus; capsularis birostris.

Heuchera americana z

SAXIFRAGA.

1. Foliis integris; caule subnudo.

longifolia Lapeyr. Fl.
pyramidalis Lapeyr. Fl.
cotyledon L.
pensylvanica L.
stellaris L.
umbrosa L.
hirsuta L.

d'Espagne. or. The blanc. F. O à six divisions. caucase. The glauque. Hongrie. or des rochers. Pyrénées. O vermiculaire. F. The hexagône F. The d'Angleterre. The velu. F. O à tiges nues. canaries. or. 5 à feuilles en croix. Alpes. The

JOUBARBE

en arbre. Barbarie. or. 5
des Canaries. or. 5
glutineuse. canaries. or. 5
tortueuse. canaries. or. 5
velue. canaries. or. 5
Aïzoïde. canaries. or. 5
des toits. F. & (méd.)
à globules. F. & hérissée. Alpes. &
de montagne. Alpes. &
arachnoïde. Alpes. &
à une fleur. canaries. or. &

PENTHORUM
à grappes. Am. s. 72

ORDRE II.

SAXIFRAGÉES.

I. Ovaire supère; une capsule à deux pointes.

HEUCHÉRA
d'Amérique. Am. s. w

SAXIFRAGE.

1. Feuilles entières; tige presque nue.

à longues f. pyrén. Z (orn.)

pyramidale. pyrén. Z (orn.)

cotylédon. Alpes. Z

de Pensylvanie. Z

étoilée. Alpes. Z

ombreuse. Alpes. Z

velue. Alpes. Z

cuneifolia L.
crassifolia L.
sarmentosa L. f.

2. Foliis integris; caule folioso.

rotundifolia *L.*oppositifolia *L.*aizoides *willd. sp.*autumnalis *Fl. dan.* (non *L.*)
aspera L.

3. Foliis lobatis.

granulata L.
geranioides L.
rridactylites L.
cespitosa L.
hypnoides L.
furcata Lapeyr. Fl.?
palmata smith, Fl.
decipiens Ehrart.

Tiarella cordifolia L. biternata vent. malm.

MITELLA diphylla L. nuda L.

II. Fructus inferus; capsularis aut baccatus.

CHRYSOSPLENIUM oppositifolium L. alternifolium L.

ADOXA moschatellina L.

Hydrangea arborescens L. nivea mich. Fl. radiata willd. sp. f quercifolia H. K.

Hortensia opulifolia encycl.

Hydrangea hortensis willd.

sp.

CALLICOMA serrata Andr. Rep.

cunéisorme. Alpes. Z à f. épaisses. sibérie. Z (orn.) sarmenteuse. Japon. Z

2. Feuilles entières; tige feuillue.

à feuilles rondes. Alpes. L'à feuilles opposées. Alpes. L'Aïzoïde. Alpes. L'rude. Alpes. L'

3. Feuilles lobées.

grenue. F. W.
à f. de Géranium. Pyrénées. W.
à trois pointes. F. ①
touffue. Alpes. W.
hypnoïde. Alpes. W.
fourchue. Pyrénées. W.
palmée. Alpes. W.

TIARELLE à feuilles en cœur. Am. s. L biternée. Am. s. L

MITELLA
bifoliée. Am. s. Z
à tige nue. Asie. Y

II. Ovaire infère; une capsule ou une baie.

DORADILLE

à feuilles opposées. F. Z.
à feuilles alternes. F. Z.

ADOXA

Moschatelle. F. V

Hydrangéa
en arbre. Am. s. 5
cotonneux. Am. s. 5
à feuilles de chêne. Am. s. 5

HORTENSIA

à f. d'obier. chine. 5 (orn.)

à feuilles en scie. or. 5

ORDO III.

CACTI.

I. Petala et stamina definita.

RIBES.

1. Inermia.

rubrum z. — album. pelræum Jacq. tc. nigrum L. prostratum l'Her. stirp. glandulosum H. K. pensylvanicum encycl. floridum l'Her. stirp. alpinum z.

2. Aculeata.

cynosbati L. diacanthum z.f. orientale. Grossularia Z. Uva-crispa L. - rubra.

II. Petala et stamina indefinita.

CACTUS.

- 1. Opuntiæ caule plano.
- opuntia z.
 - Ficus indica.
 - Tuna.
 - nana.
 - inermis.

cochinillifer z.

curassavicus L.

brasiliensis willd. Enum. suppl. spinosissimus Encycl.

speciosus Bonpland, Malm.

(non willd.) phyllanthus L.

pereskia L.

2. Echinato melocacti, subrotundi. mamillaris z. pseudomamillaris.

ORDRE III.

CIERGES.

I. Pétales et étamines définis.

GROSEILLIER.

1. Tiges sans épines.

commun. F. h (écon. méd.) — blanc. des rochers. Alpes. 5 cassis. F. b (écon.)

couché. am. s. 5

de Pensylvanie. 5

des Alpes. b

2. Tiges épineuses.

cynosbati. Am. s. h à deux épines. Russie. 5 du Liban. 19 épineux. F. h (écon.) à maquereau. F. h (écon.) -- rouge.

II. Pétales et étamines indéfinis.

CIERGE.

1. Opontias à tige aplatie.

opontia. Afr. s. s. ch. 5 (écon.)

- Figuier-d'inde.

- Tuna.

- petit.

— sans épines.

à cochenille. Am. m. s. ch. 5

de Curação, s. ch. 3 du Brésil. s. ch. 5

très-épineux. s. ch. 5

rose. am. m. s. ch. 5

scolopendre. Am. m. s. ch. p péreskia Am. m. s. ch. b

2. Mélocactes hérissés, presque ronds.

mamillaire. Antilles. s. ch. b mamelonné. s. ch. p

stellatus willd. Enum. suppl. coronatus willd. Enum. suppl. melocactus L.

3. Erecti, cylindrici.

cylindricus Encycl.
serpentinus willd. Enum. suppl.
heptagonus L.
tetragonus L.
peruvianus L.
monstrosus.
abnormis willd. Enum. suppl.
Royeni L.
multangularis willd. Enum.
suppl.

4. Repentes.

grandiflorus z.
flagelliformis z.
parasiticus pec. pl. gr.
pendulus willd. sp.
funalis.
speciosissimus.
speciosus willd. Enum. suppl.)
triangularis z.
proteiformis.
triqueter (non willd.)

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

I. Fructus unilocularis.

PORTULACA
pilosa z.
oleracea z.

TALINUM

Anacampseros willd. sp.
portulaca Anacampseros z. }

patens willd. sp.
reflexum cav. ic.
trichotomum.
fruticosum willd. sp.
portulaca paniculata z. }

man a t of at its

Turnera cistoides z.

étoilé. Am. m. s. ch. 5 couronné s. ch. 5 Mélocacte. Antilles. s. ch. 5

3. Tiges droites, cylindriques.

cylindrique. rérou. s. ch. b sarmenteux. s. ch. b heptagône. Am. m. s. ch. b tétragône. Am. m. s. ch. b du Pérou. s. ch. b

monstrueux. s. ch. 5

de Royen. Am. m. s. ch. 19 multangulaire. s. ch. 19

4. Tiges rampantes.

à grandes fl. Antilles. s. ch. b serpentin. Am. m. s. ch. b parasite. Antilles. s. ch. b à tiges grêles. s. ch. b éclatant. s. ch. b triangulaire. s. ch. b protéiforme. s. ch. b

ORDRE IV:

à trois angles. s. ch. y

1. Fruit à une loge.

PORTULACÉES.

POURPIER
velu. Antilles. ⊙
čultivé. F. ⊙ (écon.)

TALINUM

Anacampséros. cap. or. 5
paniculé. Am. m. s. ch. 5
à fl. jaunes. Am. m. s. ch. 5
trichotome. s. ch. 5
ligneux. Am. m. s. ch. 5

Turnéra
à fl. de ciste. Antilles. s. ch. x)

Montia fontana L.

TAMARIX
gallica z.
germanica ż.

Telephium imperati z.

Corrigiola littoralis z.

Scleranthus annuus z. perennis z.

TRIANTHEMA monogyna L. mant.

CLAYTONIA
virginica L.
cubensis Bonpl. Equin. \
perfoliata Willd. Enum. \

Portulacaria afra jacq.
claytonia portulacaria z.
mant.

ORDO V.

FICOIDEÆ.

Reaumuria vermiculata z.

NITRARIA schoberi z. tridentata *pesf. All*.

Sesuvium

portulacastrum z.

revolutifolium willd. Enum.

Aizoon canariense z. hispanicum z.

GLINUS lotoides z.

MESEMBRYANTHEMUM.

1. Foliis planis, cristallinum z.

MONTIA

aquatique. F. O

TAMARIX

de France, 5 (orn.)

d'Allemagne. 5 (orn.)

Téléphium d'Impérati. ғ. ц

Corrigiola

des sables. f. ••

Scléranthus annuel. f. O vivace. f. V

TRIANTHÉMA
monogyne. Antilles. ①

Claytonia de Virginie. ұ de Cuba. ()

PORTULACARIA

d'Afrique. cap. or. 9

ORDRE V.

FICOIDES.

Réaumuria à feuill. de sédum, Barb. or. 3

NITRARIA à feuilles entières. Russie. 5 à trois dents. Barbarie. or. 5

Sésuvium
à f. de pourpier. inde. s. ch. &
à f. roulées. cuba. s. ch. &

Aïzoon des Canaries. ① d'Espagne. ①

GLINUS lotoïde. Esp. 🔾

FICOIDE.

1. Feuilles planes.

cristalline. madère.

13

linguiforme z.

tortuosum L.

expansum L.

pinnatifidum z. f.

cordifolium L. f.

cuneifolium Jacq. 1c.

limpidum H. K.

helianthoides H. K.

2. Foliis subtus convexis.

ciliatum H. K. geniculiflorum z. noctiflorum z. pallens H. K. bicolorum z. coccineum Dec. Pl. Gr. tuberosum z. tenuifolium z. violaceum Dec. Pl. Gr. stipulaceum z. corniculatum z. Joreum L. veruculatum L. echinatum H. K. viridiflorum H. K. splendens I. villosum z. micans L. rostratum z. caninum Dec. Pl. Gr. felinum Dec. Pl. Gr. tigrinum Haw. testiculare Jacq. Fragmi.

3. Foliis teretibus.

nodiflorum z.
brachiatum H. K.
hispidum z.
striatum Dec. Pl. Gr.
barbatum z.
stellatum Dec. Pl. Gr.
calamiforme z.

4. Foliis triquetris.

falcatum z.
reptans H. K.
spinosum z.
glomeratum z.

linguiforme. cap. or. Ze tortueux cap. or. Ze ouvert. cap. or. 3 pinnatifide. cap. O en cœur. cap. or. 3 cunéiforme. cap. O à fleur de soleil. cap. O

2. Feuilles convexes en-dessous.

cilié. cap. or. 5 géniculiflore. cap. or. 3 de nuit. cap. or. 5 pále. cap. or. 5 écarlate. cap. or. 5 tubéreux, cap. or. 5 à feuilles menues. cap. or. 9 violet. cap. or. 5 à stipules. cap. or. 5 comu. cap. or. b courroie. cap. or. 5 à feuilles lisses, cap. or. 5 hérissé. cap. or. b à fleurs vertes. cap. or. 5 luisant. cap. or. 5 velu. cap. or. 5 argenté. cap. or. h bec-de-grue. cap. or. Z gueule-de-chien. cap. or. Z gueule-de-chat. cap. or. Z gueule-de-tigre. cap. or. Is bilobé. cap. or. Z

3. Feuilles cylindriques.

nodiflore. Barbarie. or. 5
étalé. cap. or. 5
hispide. cap. or. 5
strié. cap. or. 5
barbu. cap. or. 5
étoilé. cap. or. 5
doigt-d'enfant. cap. or. 5

4. Feuilles triangulaires.

falciforme. cap. or. 5
rampant. cap. or. 5
épineux. cap. or. 5
aggloméré. cap. or. 5

glaucum z.
spectabile willd. sp.
aureum willd. sp.
serratum z.
scabrum z.
uncinatum z.
— minus.
pugioniforme z.
filamentosum z.
acinaciforme z.
lacerum H. K.
deltoides z.
albidum z.
bellidiflorum z.
dolabriforme z.

Tetragonia

decumbens pec. pl. gr.
echinata H. K.
expansa syst. veget.
cristallina l'Her. stirp.

ORDO VI.

ONAGRÆ.

I. Styli plures.

MYRIOPHYLLUM spicatum z. verticillatum z.

Proserpinaca palustris z.

CERCODIA

erecta *Murr. Gætt.*Ludwigia cercodia *Jacq. ic.*Halogaris cercodia *H. K.*Tetragonia ivæfolia *z. f.*

II. Stylus 1; fructus capsularis; stamina petalis numero aqualia aut pauciora.

TRAPA natans L.

racemosa cav. 1c.
hirsuta Jacq. coll. suppl.
miniata Dec. cat.

glauque. cap. or. 5
à grandes fleurs. cap. or. 5
doré. cap. or. 5
denté. cap. or. 5
rude. cap. or. 5
à crochet. cap. or. 5
— petit.
en poignard. cap. or. 5
filamenteux. cap. or. 5
lacéré. cap. or. 5
deltoïde. cap. or. 5
blanc. cap. or. 5
å fl. de paquerette. cap. or. 5
en doloire. cap. or. 5

Tétragonia
tombant. cap. or. 5
hérissé. cap. or. ©
étalé. N. zél. ©
cristallin. pérou. ©

ORDRE VI.

ONAGRES.

I. Plusieurs styles.

Volant-d'eau à épis. f. T verticillé. f. V

PROSERPINACA

des marais. Am. s. 72

CERCODIA

à tige droite. N. zél. or. 5

II. Un style; une capsule; étamines en nombre égal ou moindre que les pétales.

MACRE flottante. F. ¥ (alim.)

Lopézia
à grappes. mexique. ① (orn.)
velu. mexique. ①
arbrisseau. mexique. s. ch. 5
(orn.)

CIRCEA

lutetiana z. alpina z.

Ludwigia

macrocarpa *mich. fl.* } alternifolia *z*.

III. Stylus 1; fructus capsularis; stamina petalorum dupla.

Jussiæa

erecta z.

OENOTHERA.

1. Capsulis teretibus.

biennis z.

grandiflora willd. sp.
parviflora z.
muricata s. veg.
longiflora jacq. Hort.

— mollissima z. odorata Jacq. Ic. nocturna Jacq. Ic. } albicans Encycl. } sinuata s. veg.

2. Capsulis angulates.

— telraptera cav. 1c.
purpurea Bol. Mag.
rosea willd. sp.
pumila z.

GAURA

biennis z.
fruticosa jacq. ic.
mutabilis cay. ic.

tripetala cav. 1c. undulata

EPILOBIUM

angustifolium Encycl. (angustissimum H. K.)
spicatum Encycl. (angustifolium H. K.)
hirsutum willd. sp.
pubescens Roth. Germ.
montanum L.
palustre L.

CIRCÉE

des bois. F. V. des Alpes. V

LUDWIGIA

à gros fruit. virginie. 华

III. Un style; une capsule; étamines en nombre double des pétales.

JUSSIÉA

à tige droite. Antilles. O

OENOTHÉRA

1. Capsules cylindriques.

commun. F. &
à grandes fleurs. Am. s. &
à petites fleurs. Am. s. &
tuberculeux. Am. s. &
à long. fl. Buenos-Ayres. s. ch. &
velouté. Buenos-Ayres. s. ch. &
odorant. Magellan. &
noctiflore. cap. ©
sinué. Am. s. or. &

2. Capsules anguleuses.

à quatre ailes. N. Esp. s. ch. L'a pourpre. Am. s. ⊙ rose. Pérou. or. L'anain. Am. s. L

GAURA

bisannuel. Am. s. of arbrisseau. Antilles. s. ch. 5 à fleurs changeantes. Mexiq. s. ch. 5 à trois pétales. or. 4 ondulé. 4

EPILOBIUM

à seuilles étroites. F. ¥

à grappes. F. Z (orn.)

velu. F. K.
pubescent. F. K.
de montagne. F. K.
des marais. F. K.

tetragonum z.

podonæi vill. pelph.

alpinum z.

FUCHSIA

magellanica Encycl. coccinea H. K. lycioides Andr. Rep.

MENTZELIA

hispida willd. sp.
aspera cav. 1c. (non Lin.)

ORDO VII.

MYRTI.

MELALEUCA

thymifolia smith, soc. L. coronata Andr. Rep. gnidiæfolia vent. Malm. hypericifolia smith, soc. L.

myrtifolia vent. malm.

squarrosa smith, soc. L.

armillaris H. K.

ericæfolia vent. malm.

styphelioides smith, soc. L.

diosmæfolia Andr. Rep.

gibbosa Labill. N. Holl.

linarifolia smith, soc. L.

metrosyderos hyssopifolia

cav. Ic.

neriifolia Andr. Rep.

LEPTOSPERMUM

scoparium smith, soc. L.

ambiguum smith, soc. L.

myrtifolium.

Thea willd. sp.

flavescens H. K.

Melaleuca Thea sert. Hann.

pubescens willd. sp.

juniperinum smith, soc. L.

lanigerum smith, soc. L.

FABRICIA

lævigata smith, soc. L.

METROSIDEROS saligna smith, soc. L.

tétragône. F. Z de Dodoens. F. ¥ des Alpes. ¥

FUCHSIA

écarlate. chili. or. 19 (orn.)
à f. de Lycium. Ant. s. ch. 19

MENTZÉLIA

hérissé. mexique. s. ch. 76

ORDRE VII.

MYRTES.

MÉLALEUCA

à f. de Thym. N. Holl. or. 5

à f. d'hypéricum. N. Holl. or. ъ (orn.)

à f. de myrte. n. Holl. or. p

armillaire. N. Holl. or. b

à f. de styphélia. N. Holl. or. b à f. de Diosma. N. Holl. or. b gibbeux. N. Holl. or. b

à f. d'Hysope. N. Holl. or. 19

à f. de Nérium. N. Holl. or. 5

LEPTOSPERMUM

de la N. Zélande. or. 5 à long. étamines. N. Holl. or. 5 à f. de myrte. N. Holl. or. 5

Théa. N. Holl. or. h

pubescent. N. Holl. or. 5 à f. de Genévrier. N. Holl. or. 5 laineux. N. Holl. or. 5

FABRICIA

lisse. N. Holl. or. b

Métrosidéros à f. de saule. N. Holl. or. 5 lophanta vent. H. cels.
lanceolata smith, soc. L.
glandulosa.
corifolia vent. malm.
pinifolia wendl. collect.
linearis smith, soc. L.
melaleuca linearis sert. Hann.
floribunda vent. malm.

EUCALYPTUS

robusta smith, soc. z.? oppositifolia. obliqua l'Hert. sert. amygdalina Bill. N. Holl. piperita H. K. discolor.

PSIDIUM

pyriferum z. montanum swartz. prodr.

MYRTUS

communis L.

- bœtica.
- romana.
- tarentina.
- belgica.
- mucronata.

tomentosa H. K. horizontalis vent. malm.

- - · 3 V 1 ~, 1

EUGENIA

- uniflora z.
- Jambos z.
- malaccensis z.
 baruensis jacq. ic.

X CALYPTRANTHES

zuzygium swartz. prodr.)
Myrtus zuzygium L.)

DECUMARIA

barbara z.

PUNICA

granatum z.

— nanum.

— flayum.

X

, š,

Con any k

lancéolé. N. Holl. or. h (orn.)
glanduleux. N. Holl. or. h
à f. de coris. N. Holl. or. h
à f. de Pin. N. Holl. or. h

à feuill. étroites. N. Holl. or. 5 à fleurs nombr. N. Holl. or. 5

EUCALYPTUS

gigantesque. N. Holl. or. 5
à f. opposées. N. Holl. or. 5
oblique. N. Holl. or. 5
à f. d'Amandier. N. Holl. or. 5
poivré. N. Holl. or. 5
de deux couleurs. N. Holl.
or. 5

GOYAVIER.
Poire. inde. or. b
de montagne. Ant. s. ch. b

MYRTE

commun. F. or. h (orn. méd.)
— d'Andalousie.

- romain.
- de Tarente:
- -moyen.
- pointu.

pimento, Tout-épice. Antilles. s. ch. 5 (écon.) cotonneux. chine. s. ch. 5 horizontal. Am. m. s. ch. 5

EUGÉNIA

à une fleur. Brésil. s. ch. p jamrose. inde. s. ch. p de malaca. inde. s. ch. p de Baru. s. ch. p

CALYPTRANTÈS

zuzygium. Antilles. s. ch. D

DÉCUMARIA

sarmenteux. caroline. 19

GRENADIER

cultivé. runis. or. p (écon.)
—nain.

jaune.

PHILADELPHUS

coronarius L.

— nanus.

inodorus L.

ORDO VIII.

MELASTOMÆ.

BLAKEA trinervia L.

MELASTOMA elæagnoides swartz. Prodr. cymosa willd. sp.

ORDOIX.

SALICARIA.

LAGERSTROEMIA
— indica z.

LAWSONIA $\begin{array}{l}
-\left\{ \text{ inermis } L. \\
\text{ spinosa } L.
\end{array} \right\}$

Lythrum
salicaria L.
virgatum L.
hyssopifolia L.

Cuphea viscosissima jacq. nort. \
Lythrum cuphea L. f.

Isnardia
palustris L.

GLAUX maritima L.

Peplis portula L.

ORDO X.

ROSACEÆ.

I. Germen simplex inferum; polystylum; pomum calycino limbo umbilicatum, multiloculare.

Malus communis.

SERINGAT

odorant. F. h (orn.)

— nain.

inodore, caroline. h (orn.)

ORDRE VIII.

MÉLASTOMES.

BLAKÉA à trois nervures. Ant. s. ch. 5

Mélastome à f. d'éléagnus. ant. s. ch. ъ corymbifère. ant. s. ch. ¥

ORDRE IX.

SALICAIRES.

LAGERSTROÉMIA

des Indes. or. 5 (orn.)

LAWSONIA

d'Orient. or. b (orn. teint.)

SALICAIRE

commune. F. Z (orn.)

effilée. Autriche. Z (orn.)

à feuilles d'hysope. F. O

CuphéA visqueux. Brésil. ⊙

ISNARDIA

des marais, F. V.

GLAUX maritime. F. V

Péplis
aqualique. F. 🕤

ORDRE X. ROSACÉES.

I. Un seul ovaire infère; plusieurs styles; une pomme à plusieurs loges, terminée par un ombilic couronné par le calice.

Pommier commun. f. y (écon.)

latifolia Encycl. Aria L. – longifolia. chamæmespilus. humilis Encycl. arbutifolia Encycl. glabra H. K. pyrifolia Encycl. spicata Encycl. racemosa Encycl.

Sorbus

aucuparia L. americana.

Amelanchier.

rotundifolia Encycl. s

glabre. chine. or. 19 à f. de poirier. Am. s. h à épis. Am. s. h à grappes. Am. s. b

SORBIER des oiseleurs. F. 1) (orn.) d'Amérique. Am. s. h (orn.)

Amelanchier. F. h

. domestica L. hybrida L.

MESPILUS

oxyacantha. - plena.

- rubra.

monogyna Jacq. Austr.

Azarolus.

- aronia.

sanguinea.

spathulata mich. Fl.

tanacetifolia encycl.

tomentosa L.

corallina.

acerifolia Encycl.

coccinea.

pyrifolia.

cornifolia Encycl.

linearis.

prunifolia Encycl.

crus-galli encycl.

Pyracantha L.

cotoneaster L.

germanica L.

japonica Thunb. Jap.

II. Germina indefinita, calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla.

Rosa.

1. Fructibus subglobosis.

berberifolia Pall, Act. Petr.

Eglanteria L.

lutea H. K.

- punicea. sulphurea H. K.

spinosissima L.

scotica.

cinnamomea L.

arvensis L. Mant.

carolina L.

parviflora willd. sp.

Incida willd. sp.

villosa L.

sinica.

kamtchatica vent. ch. de P.

cormier. F. b (écon.) de Laponie. 5 (orn.)

NÉFLIER

Aubépine. F. h (orn.)

-double. (orn.)

-rose. (orn.)

monogyne. F. b

azerole. f. h (écon.)

— d'Orient.

sanguin. Am. s. h

en spatule. Am. s. h

à f. de ranaisie. orient. b

cotonneux, Pinchaw, Am.s. 5

Petit-corail. Am. s. b

écarlate. Am. s. 19

à f. de Poirier. Am. s. 19

à feuilles étroites. Am. s. 5

à f. de prunier. Am. s. h

Pied-de-coq. Am. s. b

Buisson-ardent. F. 5 (orn.)

cotoneaster. F. b

cultivé. F. 5

du Japon. 5 (écon.)

II. Ovaires indéfinis renfermés dans un calice étranglé à son sommet, surmontes chacun d'un style.

Rosier.

1. Fruits presque ronds.

à une seuille. perse. or. 5

Églantier. Allem. 5 (orn.)

—ponceau. (orn.)

jaune. orient. 5 (orn.)

hérissé. F. 19

d'Ecosse. b

cannelle. Alpes. 19

des champs. 5

de Caroline. 5

à petites fleurs. Am. s. 5

luisant. Am. s. 5

velu F. h

de Chine. 5

du Kamtchatka. 5

2. Fruccibus ovacis.

remensis. burgundiaca. damascena willd. sp. centifolia L. - unguiculata. muscosa H. K. maxima. semperflorens (non willd.) sempervirens H. K. turbinata H. K. francofurtensis. gallica L. bracteata vent. H. cels. alba z. collina Jacq. Austr. rubiginosa L. Mant. canina L. glauca. rubrifolia vill. nelph. alpina z. pendulina z. moschata H. K. diversifolia vent. H. cels. [semperflorens jacq. H. sch.] sempervirens L.

III. Germina plura definita (rariùs unum), calice urceolari supra coarctato tecta, singula monostyla; semina totidem.

POTERIUM

sanguisorba L.
polygamum willd. sp.
hybridum L.
ancistroides Desf. Atl.
caudatum H. K.
spinosum L.

Sanguisorba.

officinalis z.

media z.

cànadensis z.

Ancistrum
ascendens vahl, sp.
repens vent. H. cels.

WALDSTEINIA geoides willd. sp.

2. Fruits ovales.

de Champagne. 5 (orn.) de Bourgogne. 5 (orn.) de Damas. b (orn.) à cent feuilles. (orn.) -onguiculé. mousseux. b (orn.) de Hollande. b (orn.) de tous les mois. h (orn.) à gros calice. 5 (orn.) de Provins. Eur. h (orn. méd) de Macariney. chine. 5 (orn.) blanc. Eur. b (orn.) des collines. F. b odorant. F. b de chien. F. b glauque. Alpes. 5 des Alpes. b à fruit pendant. 19 musqué. Barbar. 5 (orn. écon.) du Bengale. b (orn.) toujours vert. Allem. b

III. Ovaires en nombre défini (rarement un seul), surmontés chacun d'un style, renfermés dans un calice étrangle au sommet; autant de graines.

PIMPRENELLE

des jardins. F. ¥ (écon. méd.)
polygame. Hongrie. ¥
hybride. F. m. Æ
à f. d'Ancistrum. Alger. or. ъ
à grappes. Madère. or. ъ
épineuse. orient. or. ъ

Sanguisorbe
officinale. f. Z (écon.)
moyenne. am. s. Z
de Canada. ¥

ANCISTRUM

à tige montante. Magellan. V.

WALDSTEINIA
à f. de Géum, Hongrie. Z

AGRIMONIA FUNATO

Eupatoria L.

— odorata. repens L.

agrimonioides L.

CLIFFORTIA
ilicifolia L.
tridentata willd. sp.
ruscifolia L.

ALCHEMILLA

vulgaris L.
hybrida L.
alpina L.
pentaphyllea L.
Aphanes.
Aphanes arvensis L.

Sibbaldia procumbens L.

IV. Germina indefinita supera, receptaculo communi imposita, singula monostyla; semina totidem nudu aut rarius baccata.

TORMENTILLA erecta L. reptans L.

POTENTILLA.

1. Foliis pinnatis.

fruticosa L.

Anserina L.

multifida L.

supina L.

bifurca L.

rupestris L.

pensylvanica L. Mant.

2. Foliis digitatis.

recta L.
laciniosa wald. et Kitt. Hung.
pedata Nester, Pot.
obscura Marsch. cauc.
canescens Besser, Fl.
ascendens vill. Delph.
recta Jacq. Austr.

AIGREMOINE
officinale. F. \u03c4 (med.)
— à fleurs blanches.

- odorante.

rampante. orient. L' à feuilles ternées. Italie. L'

CLIFFORTIA

à feuill. de Houx. cap. or. 5 à trois dents. cap. or. 5 à f. de Fragon. cap. or. 5

ALCHÉMILLE

commune. F. V (méd.)

lybride. Alpes. V

satinée. Alpes. V

à cinq feuilles. Alpes. V

perche:pierre. F. ①

Sibbaldia

couché. Alpes. Z

IV. Ovaires supères et indéfinis, attachés à un réceptacle commun, surmontés chacun d'un style; autant de graines nues, ou plus rarement renfermées dans une baie.

TORMENTILLE
droite. F. ¥
rampante. F. ¥

POTENTILLE.

1. Feuilles pennées.

arbrisseau. sibérie. 5
Argentine. F. W
laciniée. F. W
couchée. F. O
bifurquée. sibérie. W
des rochers. Alpes. W
de Pensylvanie. W

2. Feuilles digitées.

droite. Alpes. L' laciniée. Hongrie. L' en pédale. L' obscure. caucase. L'

blanchätre. F. ¥

hirta L.
argentea L.
verna L.
alchimilloides Lapeyr. Fl.
aurea L.
intermedia L.
incisa Nester, Pot.
alba L.
lupinoides Willd. sp. \
valderia Vill. Delph. \
caulescens L.

3. Foliis ternatis.

grandiflora L.
monspeliensis L.
norvegica L.
parviflora.
Fragaria sterilis willd. sp. }
emarginata.
vaillantii Nester, Pot.

FRAGARIA

vesca L.

- monophylla willd. sp.

- eflagellis.

- semperflorens.

- moschata.

-nigra.

- viridis.

- virginiana willd. sp.

- chiloensis willd. sp.

- ananassa.

Comarum palustre z.

GETTA

urbanum L.
virginianum L.
album willd. Enum.
canadense Jacq. Hort.
canadense Murr. Goett.
strictum willd. sp.
alepicum Jacq. Ic.
rivale L.
nutans Encycl.
pyrenaicum willd. sp.
montanum L.
reptans L.

hérissée. F. m. Z argentée. F. Z printanière. F. Z à f. d'Alchimille. pyrénées. Z dorée. Alpes. Z moyenne. Alpes. Z incisée. Z blanche. Alpes. Z à feuilles de Lupin. Alpes. Z montante. F. Z

3. Feuilles ternées.

à grandes fleurs. Alpes. Le de Montpellier. Le de Norvège. Le à petites fleurs. F. Le

échancrée. F. ¥

FRAISIER

des bois. F. 72 (écon. méd.)

- à une feuille.

-sans coulans.

— de tous les mois,

-capiton.

-noir.

-vert.

-de Virginie.

-du Chili.

-ananas.

COMARUM

des marais. F. ¥

BENOITE

officinale. F. & (méd.)
de Virginie. &

à sleurs blanches. Am. s. 1

de Canada. Z

des ruisseaux. Alpes. Te penchée. F. Te des Pyrénées. Te de montagne. Alpes. Te rampante. Alpes. Te

DRYAS

octopetala zi

Rubus.

1. Fruticosi.

idæus L.
occidentalis L.
villosus H. K.
vulpinus.
fruticosus L.
— inermis.

laciniatus Willd. H. Ber. rosæfolius smith, 1c.

cæsius L.

— crispus.
odoratus L.

2. Herbacei.

saxatilis L. arcticus L. chamæmorus L.

V. Germina plura supera definita; capsulæ totidem mono aut polyspermæ.

SPIRÆA.

1. Herbacea.

rilipendula z.
Aruncus L.
ulmaria L.
lobata s. Veg.
trifoliata L.

2. Fruticosa.

sorbifolia L.
salicifolia L.
lævigata L.
tomentosa L.
hypericifolia L.
crenata L.
chamædrifolia L.
opulifolia L.

VI. Germen 1 monoseylum; nux mono aut disperma, nuda vel drupacea.

PRUNUS.

1. Cerasi. Nucleo subrotundo.
caroliniana II. K.

DRYAS

à huit pétales. Alpes. T

RONCE.

1. Tiges ligneuses.

Framboisier. F. 5 (écon.) d'Occident. Am. s. 5 (écon.)

velue. Am. s. 5

des haies. F. 5 (écon. méd.)
— sans épines.
laciniée. 5
à f. pennées. île de F. s. ch. 5
à fruit bleu. F. 5 (écon.)
— crépue.
odorante. Am. s. 5

2. Tiges herbacées.

des rochers. F. 足 du Nord. suède. 足 (écon.) des marais. suède. 足 (écon.)

V. Ovaires supères en nombre défini; autant de capsules renfermant une ou plusieurs graines.

Spiréa.

1. Tige herbacée.

ilipendule. F. \(\mathbb{L}\) (orn.)

à grappes. F. \(\mathbb{L}\) (orn.)

vlimaire. F. \(\mathbb{L}\)

à feuilles lobées. \(\text{Am. s. }\mathbb{L}\)

à trois folioles. \(\text{Am. s. }\mathbb{L}\) (orn.)

2. Tiges ligneuses.

à f. de sorbier. sibér. b (orn.)
à f. de saule. sibér. b (orn.)
à feuilles lisses. sibérie. b
cotonneux. Am. s. b (orn.)
à f. d'hypericum. F. b (orn.)
à feuilles crénelées. sibérie. b
à f. de chamédrys. sibér. b
à f. d'obier. Am. s. b (orn.)

VI. Un seul ovaire surmonté d'un style; une noix nue ou recouverte d'une pulpe, renfermant 1-2 graines.

PRUNIER.

1. Cerisiers. Noyau presque rond.

de Caroline. or. 5

Laurocerasus i. lusitanica z. Padus L. - rubra. virginiana L. serotina willd. sp. pumila L. Mant. chamæcerasus Jacq. 1c. mahaleb L. semperflorens willd. sp.) serotina Roth. cat. cerasus L. - nana. - ruberrima. - suavissima. - juliana. avium L. -sylvestris. - nigra. — bigarella. persicifolia.

2. Pruni. Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L. sinensis. Amygdalus pumila z. prostrata Bill. Dec. insititia L. brigantiaca vill. pelph. domestica z. - cerea. — cereola. — damascena. -hungarica. - claudiana. myrobalana. cerasifera willd. sp. § hiemalis mich. Fl.

3. Armeniaca. Nucleo orbiculari, compresso.

> Armeniaca z. — dulcis. - nigra. - macrocarpa.

AMYGDALUS persica z.

Laurier-cerise. r. h (orn. vén.) Azarero. portugal. 5 (orn.) à grappes. F. h (orn.) -à fruit rouge. de Virginie. 5 (orn.) tardif. virginie. 5 Ragouminier. Am. s. h chamécerasus. Autr. 19 mahaleb. f. b (orn.) de la Toussaint. 19 cerisier. F. h (écon.) -nain. — de Montmorenci. - royal ou chériduc. — Guignier à fruit noir. merisier. f. b (écon.) -des bois à fruit rouge. -à fruit noir. -Bigarotier. à feuilles de Pêcher. 5

2. Pruniers. Noyau oblong, un peti comprimé.

épineux ou prunellier. F. 5 de Chine. 5 (orn.) couché. orient. h sauvage: F. 5 de Briançon. 5 cultivé. F. (écon.) — de Sainte-Catherine. — de mirabelle. —de Damas. - de Damas noir. - de reine Claude. de myrobolan. Am. s. h (écon.) d'hiver. Am. s. 1)

3. Abricotiers. Noyan orbiculaire, comprimé.

Abricotier. orient. 5 (écon.) - Alberge. —à fruit noir. - Péche.

AMANDIER Pêcher. perse. 5 (écon.)

communis L. - plena. - amara. nana L. georgica. orientalis H. K. argentea Encycl. \

CALYCANTHUS floridus L. lævigatus willd. Enum. ferax mich. Fl. præcox L.

BLACKWELLIA - axillaris Lamk, Ill. Vel Sweeking wester axillaire. ile de F. s. ch. 5 HOMALIUM racemosum Jacq. Am.

ORDO XI.

The borbon 1.

LEGUMINOSÆ.

I. Corolla regularis, quandoque nulla; stamina distincta.

ACACIA.

1. Foliis simplicibus.

verticillata willd. sp. juniperina willd. sp. linifolia willd. sp. floribunda willd. sp. sophoræ Bill. N. Holl.? (obliqua wendl. obs.) falcata willd. sp. dodonæifolia pers. syn. longifolia willd. sp. suaveolens willd. sp. stricta willd. sp. latifolia. melanoxylon H. K. paradoxa Dec. cat. armata H. K.

2. Foliis conjugatis simulque pinnatis.

pulchella H. K. strombulifera willd. sp. coronillæfolia. furcata.

cultivé. Asie. h (écon.) -double. (orn.) -amer. (vénén.) nain. sibérie. 5 (orn.) de Géorgie. 5 satiné. perse. 5

CALYCANTHUS de Virginie. 5 (orn.) à seuilles lisses. Am. s. b du Japon. 5 (orn.)

BLACKWELLIA HOMALIUM à grappes. Antilles. s. ch. 5

ORDRE XI.

LÉGUMINEUSES.

I. Corolle régulière, quelquefois nulle; étamines distinctes.

ACACIE.

1. Feuilles simples.

verticillée. N. Holl. or. h à f. de Genévrier. N. Holl. or. 5 à f. de L'n. N. Holl. or. h à fl. nombr. N. Holl. or. h sophora. N. Holl. or. b oblique. N. Holl. or. b à s. de podonée. N. Holl. or. 5 à long. feuill. N. Holl. or. b triangulaire. N. Holl. or. h ramassée. N. Holl. or. 5 à larges feuill. N. Holl. or. h ondulée. s. ch. p épineuse. N. Holl. or. b

2. Feuilles conjuguées et pennées.

élégante. N. Holl. or. Þ tire-bouchon. pérou. s. ch. 5 à feuilles de coronille. s. ch. 1) bifurquée. s. ch. 5

3. Foliis duplicato-pinnatis.

a. Aculeatæ aculeis sparsis.

sarmentosa.
uncinella.
trinervia.
ceratonia willd. sp.
rhodacantha.

b. Spinosà; spinis axillaribus.
juliflora willd. sp.
guayaquilensis.
mauroceana.
senegal willd. sp.
nilotica.
vera willd. sp.
indica.

- farnesiana willd. sp.
- eburnea willd. sp.
cornigera willd. sp.

c. Inermes.

muricata willd. sp.
portoricensis willd. sp.
leucocephala.
mimosa leucocephala encycl.
lophantha willd. sp.
arborea willd. sp.
mimosa filicifolia encycl.
tetragona willd. sp.
julibrisin willd. sp.
decurrens willd. sp.
peregrina willd. sp.
angustifolia encycl.

- Lebbek willd. sp. Sitmimora lebbek.

trichodes willd. sp.

scandens willd. sp.

botrycephala.

discolor willd. sp.

lentiscifolia.

angustisiliqua.

pesmantus virgatus willd. sp. }

pubescens.

mimosa pubescens vent. }

malm.

glandulosa willd. sp.

punctata.

pesmantus punctatus willd. }

sp.

3. Feuilles deux fois pennées.

a. Aiguillons épars.

sarmenteuse. s. ch. h à crochets. s. ch. h à trois nervures. s. ch. h à f. de caroubier. Ant. s. ch. h à épines de rosier. s. ch. h

b. Epineuses; épines axissaires.
à chatons. Jamaique. s. ch. p
de Guayaquil. s. ch. p
de Maroc. s. ch. p
Sénégal. Afr. s. ch. p

du Nil. s. ch. 5

de l'Inde. s. ch. 5 de Farnèse. s. ch. 5 à épines blanches. s. ch. 5 à grosses épines. s. ch. 5

c. Tiges sans épines.

tuberculeuse. Antilles. s. ch. n de Porto-Rico. s. ch. n à tête blanche. Ant. s. ch. n

en panache. N. Holl. or. 5

en arbre. Antilles. s. ch. p

tétragône. caracas. s. ch. э arbre de soie. э (orn.) décurrente. N. Holl. or. э

à f. étroites. antilles. s. ch. 15

Lebbek. Inde. s. ch. 5 barbue. Pérou. s. ch. 5 grimpante. Inde. s. ch. 5

à grappes. N. Holl. or. h

à feuill. de Lentisque. Mexiq. s. ch. b

à gousses étroites. Ant. s. ch. 5

pubescente. s. ch. 5

glanduleuse. Am. s. or. 5

ponctuée. Antilles. s. ch. 5

Thora L.

bicapsularis L.

yiminea L.

CASSIA

- Minnicon

CASSE

à fruit grêle. Antilles.
à deux loges. Ant. s. ch. 5
sarmenteuse. Ant. s. ch. 5

2 Janvers.

alaia L. corymbosa Encycl. falcata z.? occidentalis z. stipulacea H. K. Fistula L. latifolia. atomaria willd. sp.? grandiflora. corymbosa ortegà, pec. biflora L. tomentosa L. f. brasiliana Encycl. hirsuta z. glandulosa z. chamæcrista L.

marylandica L.

SPANDONCEA

tamarindifolia Desf. Dec. Phil cadia purpurea Forsk. Ægypt.

Hoffmanseggia
falcaria cav. ic.
Larrea glauca ortega, pec.

Moringa

Nux-ben. Vol. Sam culata.

Guilandina moringa z.

Hyperanthera moringa vahl,

symb.

Hæmatoxylum

— campechianum z.

Adenanthera – pavonina L.

Poinciana

pulcherrima L.

cæsalpinia pulcherrima

swartz. obs.

CÆSALPINIA

sappan z.
bahamensis encycl.
vesicaria encycl.
paniculata.

GUILANDINA

- Bonduc z.
Bonducella.

ailée. Antilles. s. ch. p corymbifère. Brésil. or. p falciforme. Antilles. O puante. Ant. s. ch. p (méd.) à grand. stipules. chili. s. ch. p des boutiques. Inde. s. ch. p à larges feuill. Ant. s. ch. p à grandes fl. Mexiq. s. ch. p à deux fleurs. Ant. s. ch. p

à deux fleurs. Ant. s. ch. p. cotonneuse. chili. s. ch. p. du Brésil. s. ch. p. velue. Antilles. s. ch. p. glanduleuse. Antilles. O chamæcrista. Antilles. O de Maryland.

SPANDONCÉA PARA

à f. de ramarin. Afr. s. ch. 3

Hoffmanseggia
falciforme. pérou. Z

MORINGA

(écon. méd.) Emicate,

CAMPÉCHE commun. Ant. s. ch. 5 (teint.)

ADÉNANTHÉRA glabre. inde. s. ch. 5

POINCILLADE

élégante. inde. s. ch. 5 (orn.)

CÉSALPINIA

sappan. inde. s. ch. h (arts.)

de Bahama. s. ch. h

vésiculeux. Antilles. s. ch. h

paniculé. s. ch. h

QUENIQUIER

Bonduc. Inde. s. ch. p

sarmenteux. Inde. s. ch. p

HYMENÆA courbaril L.

BAUHINIA

divaricata Encycl. (non Lin.)

porrecta H. K.

tomentosa Encycl.

aculeata L. rufescens Encycl.

II. Corolla papilionacea; stamina distincta; legumen uniloculare bivalve.

Cercis siliquastrum L. canadensis L.

Anagyris fætida z.

Sophora
alopecuroides L.
flavescens H. K.
occidentalis swartz.
japonica L. Mant.
microphylla H. K.
tetraptera H. K.

PODALYRIA capensis willd. sp. sophora capensis L. Mant. aurea willd. sp. virgilia aurea Encycl. Robinia subdecandra l'Her. stirp. genistoides willd. sp. sophora genistoides z. S australis willd. sp. sophora australis s. veg. tinctoria willd. sp. sophora tinctoria L. alba willd. sp. sophora alba s. veg. lupinoides willd. sp. sophora lupinoides L. cuneifolia vent. H. cels. biflora Encycl. styracifolia Bot. magaz.

VIRGILIA lutea mich. Arbr.

HYMÉNÉA courbaril. cayenne. s. ch. 5

BAUHINIA

divergent. s. ch. p

allongé. Antilles. s. ch. p

cotonneux. Inde. s. ch. p

épineux. Antilles. s. ch. p

à petites f. île de F. s. ch. p

11. Corolle papilionacée; étamines distinctes; gousse bivalve à une loge.

GAINIER

de Judée. orient. 5 (orn.)

de Canada. 5 (orn.)

Anagyris fétide. F. m. or. h

Queue-de-renard. orient. Z
jaune. sibérie. L
d'Occident. Antilles. s. ch. D
du Japon. D (orn.)
à petites f. N. Holl. or. D
à quatre ailes. N. zél. or. D

Podalyria
du Cap. or. 5

à fl. jaune. Abyssinie. s. ch. 3

génistoïde. cap. or. n

de Caroline. Z

des teinturiers. Am. s. 华 (teint.)

à fleurs blanches. caroline. ¥

à f. de Lupin. катtchatka. Ұ

à deux fleurs. cap. or. 5 à f. de styrax. cap or. 5

VIRGILIA

à bois jaune. Am. s. 5.

CHORIZEMA nana H. K.

VIMINARIA

denudata H. K.

Daviesia denudata vent.

choix de pl.

SPHEROLOBIUM vimineum H. K.

Oxylobium cordifolium andr. Rep.

EUTAXIA

myrtifolia H. K.

pilwinia obovata Bill. N.

Holl.

Callistachys
lanceolata vent. malm.
elliptica vent. malm.

III. Corolla papilionacea; stamina 10 mona aut diadelpha; legumen uniloculare, bivalve.

ULEX

europæus z.
minor Rhot. cat. }
nanus smith, Fl. }

PLATYLOBIUM
formosum smith, N. Holl. spec.
scolopendrium Andr. Rep.
Bossiæa scolopendrium H. K.

Borbonia crenata z.

GENISTA.

1. Spinosæ.

anglica z. germanica z. hispanica z.

2. Inermes

pilosa z.
sagittalis z.
tinctoria z.
sibirica z. mant.
canariensis z.

CHORIZÉMA
nain. N. Holl. or. 5

VIMINARIA

dénudé. N. Holl. or. 5

SPHÉROLOBIUM / / à tige grêle. N. Holl. or. 5

OXYLOBIUM
à f. en cœur. N. Holl. or. 5

EUTAXIA

à f. de Myrte. N. Holl. or. 5

CALLISTACHYS
lancéolé. N. Holl. or. 5
elliptique. N. Holl. or. 5

III. Corolle papilionacée; 10 étamines monadelphes ou diadelphes; gousse bivalve, à une loge.

Ajonc
marin. f. h (écon.)
petit. f. h

PLATYLOBIUM
élégant. N. Holl. or. 5
ailé. N. Holl. or. 5

Borbonia crénelé. cap. or. 5

GENET.

1. Tiges épineuses.

d'Angleterre. F. 5 d'Allemagne. F. 5 d'Espagne. 5

2. Tiges sans épines.

tuberculeux. f. h ailé. f. h des teinturiers. f. h de Sibérie. h des Canaries. or. h candicans L.
juncea.
spartium junceum L.

SPARTIUM.

I. Inermia.

sphærocarpon L. monospermum z. cinereum willd. sp. Genista scoparia vill. Delph. album Desf. Atl. multiflorum l'Her. stirp. Genista alba Encycl. multicaule. Genista multicaulis Encycl. purgans L. scoparium L. triquetrum. Genista triquetra willd. sp. nubigenum H. K. fragrans Encycl. patens s. veg: cytisus pendulinus L. f. virgatum H. K. parvislorum vent. H. cels. radiatum L. umbellatum pesf. Atl. linifolium pesf. All. Genista linifolia L.

2. Spinosa.

horridum Vahl, symb.
aspalatoi es Desf. Atl.
ferox Desf. Atl.

- scorpius L.
spinosum L.
lanigerum Desf. Atl.
creticum.
Aspalatus cretica L.?

CYTISUS

sessilifolius L.

nigricans L.

Laburnum L.

— latifolium.

— cajan L. V. Lajanne bicotori

hirsutus L.

blanchatre. f. m. or. 19
jonciforme. f. m. 19 (orn. écon.)

SPARTIUM.

1. Tige sans épines.

à fruit rond. Barbarie. or. 19 monosperme. F. m. or. 19 cendré. F. 19

à fleurs blanches. Alger. or. 5

à tiges nombr. mahon. or. 5
purgatif. F. 5

à balais. F. 9 (écon.)
triangulaire. Esp. or. 9

odorant. canaries. or. 9

étalé. F. m. or. 5

effilé. F. m. or, h à petites fleurs. orient. or. h à rayons. Italie. or. h ombellifère. Alger. or. h à feuilles de Lin. Alger. or. h

2. Tige épineuse.

hérissé. F. h

Aspalat. Alger. or. h

à grosses épines. Alger. or. h

scorpius. F. m. or. h

épineux. F. m. or. h

laineux. Alger. or. h

de Crète. or. h

CYTISE

à f. sessiles. Esp. h (orn.)
noirci. f. h (orn.)
faux ébénier. f. h (orn.)
— à larges seuilles.
cajan ou pois d'Angole. Ant. ambun,
s. ch. h
velu. f. m. h

anagyrius l'Her. stirp.
austriacus L.
divaricatus l'Her. stirp.
spartium complicatum L.
leucanthus willd.?
proliferus L. f.
foliolosus l'Her. stirp.
triflorus l'Her. stirp.
biflorus l'Her. stirp.
supinus S. Veg.
argenteus L.
volgaricus L. f.
pinnatus Pallas, Ross.

CROTALARIA.

1. Foliis ternatis.

arborescens encycl. incanescens L. f. incana L. purpurascens encycl. purpurea vent. malm.

2. Foliis simplicibus.

sagittalis L.
juncea L.
semperflorens vent. H. cels.
retusa L.
benghalensis Encycl.
verrucosa L.
angulosa Encycl

angulosa Encycl. cœrulea Jacq. 1c. styracifolia.

Goodia lotifolia Bot. Mag.

RAFNIA

retusa vent. malm.
Templetonia retusa H. K.

Lupinus

varius L. angustifolius L. luteus L.

ONONIS.

1. Flores purpurei aut albi, antiquorum L. spinosa L. arvensis s. veg. hircina willd. sp.

Anagyris. Esp. or. 9
d'Autriche. 9
étalé. F. 9
à fleurs blanches. Hongrie. 9
prolifère. canaries. or. 9
feuillu. canaries. or. 9
à fleurs ternées. F. m. or. 9
à deux fleurs. Hongrie. 9
couché. F. 9
argenté. F. 9

CROTALAIRE.

r. Feuilles ternées.

en arbre. île de F. s. ch. 5 (orn.)

blanche. Antilles. ①
rougeatre. île de f. ①
pourpre. cap. or. b

2. Feuilles simples.

sagittée. Brésil. ①
jonciforme. Inde. ①
toujours fleurie. Inde. s. ch. ③
émoussée. Inde. s. ch. ①
du Bengale. ②

tuberculeuse. Inde. O

à feuilles de styrax. s. ch. o

Goodia
à f. de Lotier. N. Holl. or. 19

RAFNIA

émoussé. N. Holl. or. b

LUPIN

bigarré. F. m. O (orn.) à feuilles étroites. F. O jaune. Alger. O (orn.)

ONONIS.

1. Fleurs rouges ou blanches.

Arrête-bæuf. F. Z (méd.)

épineux. F. Z

des champs. F. Z

altissima Encycl.
mitissima L.
cenisia L. Mant.
alopecuroides L.
cherleri L.
rotundifolia L.
fruticosa L.
tridentata L.
hirta.

2. Flores lutei.

viscosa L.

Natrix L.

parviflora Encycl.

minutissima Jacq. (non L.)

columnæ All. Ped.

subocculta Vill. pelph.

ARACHIS hypogea L.

EBENUS cretica L.

ANTHYLLIS.

1. Fructicosa.

Barba-jovis L. cytisoides L. hermanniæ L. erinacea L.

2. Herbacea.

cornicina L.
montana L.
tetraphylla L.
vulneraria L.
purpurascens.

DALEA

violacea.

petalostemum violaceum

mich. Fl.

candida.

petalostemum candidum

mich. Fl.

Linnæi mich. Fl.

Psoralea pinnata L.

élevé. Allem. Z
à fleurs serrées. F. m. Z
du mont Cénis. Z
queue-de-renard. Esp. O
de Cherler. F. m. Z
à feuilles rondes. Alpes. Z
arbrisseau. Alpes. D (orn.)
à trois dents. Esp. or. D
hérissé. orient. or. Z

2. Fleurs jaunes.

visqueux. f.m. O natrix. f. ¥

à petites fleurs. F. &

ARACHIS

pistache-de-terre. Antilles. (écon.)

EBENUS de Crète. or. 5

ANTHYLLIS.

1. Tiges ligneuses.

satiné. orient. or. 5 à fleurs de cytise. F. m. or. 5 d'Orient. or. 5 épineux. Esp. or. 5

2. Tiges herbacées.

cornu. Esp. ()
de montagne. F. W
à quatre feuilles. F. M. ()
vulnéraire. F. W
— pourpre.

DALÉA

violet. Am. s. or. Z

blanc. Am. s. or. T

de Linné, Am. s. ¥

PSORALÉA

à seuilles pennées. cap. or. 5

odoratissima Jacq. H. sch. verrucosa willd. sp. angustifolia Jacq. H. sch. aphylla L. Mant. bituminosa L. palestina Gouan, Ill. pubescens Pers. syn. glandulosa L. americana L. bracteata L. Mant, corylifolia L.

MELILOTUS cœrulea. indica. -minor. officinalis. alba. dentata. Trifolium dentatum wald. et Kitt. polonica. italica. cretica. messanensis. sulcata pesf. Atl. ornithopodioides. Trigonella ornithopodioides

TRIFOLIUM,

Dec. Fl.

I. Lotoidea. Leguminibus tectis, polyspermis.

Lupinaster L.

strictum L.

angulatum wald.et kitt. Hung.

vaillantii Encycl.

michelianum savi, Itin.

repens L.

alpinum L.
involueratum willd. sp.

z. Lagopoidea. Calicibus villosis.

subterraneum L.

cherleri L.

lappaceum L.

rubens L.

pratense L.

diffusum wald. et kitt, Hung.

odorant. cap. or. 5

tuberculeux. cap. or. 5

sans feuilles. cap. or. 5

bitumineux. f. m. or. 5

de Palestine. or. 5

pubescent. or. 5

glanduleux. rérou. or. 5

d'Amérique. s. ch. 5

à grandes bractées. cap. or. 5

à feuill. de Noisetier. inde. ①

MÉLILOT

bleu. Bohême. (écon.)

des Indes. (
—petit.

officinal. F. & (méd. écon.)

blanc. sibérie. (écon.)

denté. нongrie. О

de Pologne. ①
d'Italie. ①
de Crète. ①
de Messine. ①
sillonné. Alger. ①

Pied-d'oiseau. F. O

TREFLE.

1. Lotoïdes. Gonsses polyspermes, recouvertes par le calice.

à feuilles de Lupin. sibérie. Le serré. F. ①
anguleux. Hongrie. ①
de Vaillant. F. Le
de Micheli. Italie. Le
rampant. F. Le
des Alpes. Le
à involucre. Le

2. Lagopodes. Calices velus.

souterrain. F. ①
de Cherler. F. m. ①
Bardane. F. ②
rouge. F. Z (écon.)
des prés. F. Z (écon.)
étalé. Hongrie. &

bracteatum willd. Enum. alpestre L. flexuosum Jacq. Fl. Austr. medium willd. sp. pictum Roth. cat. pannonicum L. Mant. ochroleucum s. veg. pallidum wald. et Kitt. Hung. squarrosum L. incarnatum L. - pallidum. angustifolium L. arvense L. gracile Thuil. Fl. ligusticum savi Itin. maritimum willd. sp. stellatum L. clypeatum L. alexandrinum L. scabrum L. glomeratum L. parviflorum willd. sp. striatum L. suffocatum L. Mant. albidum willd. sp.

3. Vesicaria. Calicibus inflatis ventricosis.

spumosum L. tomentosum L. fragiferum L. resupinatum L.

4. Lupulina. Vexillis corollæ inflexis.

montanum L.
agrarium willd. sp.
aureum Pollich. Palat. }
spadiceum L.
procumbens smith, Fl.
filiforme smith, Fl.

MEDICAGO.

1. Leguminibus lunatis.

arborea L.
radiata L.
circinata L.
sativa L.
falcata L.
lupulina L.

à grandes bractées. Maroc. O à deux têtes. Alpes. Z

tortueux. Alpes. Z

tacheté. (•) de Hongrie. T jaunatre. F. Y pâle. нопgrie. О herissé. F. O incarnat. F. () —pále. à feuilles étroites. F. O des champs. F. O grêle. F. 💿 d'Italie. 🔾 maritime. Angleterre. O étoilé. F. m. O bouclier. orient. • $d'Alexandrie. \odot$ rude. F. 🕥 aggloméré. F. 🔾 à petites fleurs. Hongrie. O strié. F. 💿 nain. r. m. 💿 blanc. ()

3. Vésiculeux. Calices renflés.

écumeux. F. ⊙
cotonneux. F. ⊙
Fraise. F. ¥
renversé. F. ⊙

4. Lupulins. Étendard de la corolle abaiss é.

de montagne. f. ¥

agraire. f. 🔾

brun. F. O tombant. F. O filiforme. F. O

LUSERNE.

1. Gousses falciformes.

en arbre. orient. or. 5
radiée. Italie. ①
pennée. Italie. ①
cultivée. ¥ (écon.)
falciforme. F. ¥
des prés. F. &

2. Leguminibus cochleatis.

prostrata z. f. glutinosa marsch. cauc. marina L. orbicularis z. tornata L. -minor. elegans willd. sp. tuberculata willd. sp. aculeata willd. sp. rigidula L. intertexta z. globulifera. tribuloides Encycl. murex willd. sp. ciliaris L. maculata willd. sp. arabica L. distans. coronata L. denticulata willd. sp. apiculata willd. sp. minima L. laciniata L.

TRIGONELLA.

I. Flores in pedicello communi.

platycarpos L.
hybrida Dec. Fl.
corniculata L.
cancellata.
prostrata.
hamosa L.
laciniata L.

2. Flores sessiles.

monspeliaca L.
spinosa L.
polycerata L.
rœnum-græcum L.

Lotus

edulis z.

- siliquosus L.
tetragonolobus Z.
conjugatus L.
peregrinus L.
oligoceratos Encycl.

2. Gousses en limaçon.

couchée. Hongrie. Z glutineuse. caucase. V maritime. F. m. or. Z orbiculaire. F. () Barillet. F. O -petit Barillet. élegante. sicile. O tuberculeuse. F. m. O à aiguillons. O rude. 💿 entrelacée. F. m. O à globules. O à grosses pointes. Barbarie. Murex. () ciliée. F. m. O tachée. F. 🔾 distante. O couronnée. O denticulée. F. m. O à petites pointes. O

TRIGONELLE.

velue. F. O

laciniée. F. O

1. Fleurs portées sur un pédicelle commun.

à gousses larges. sibérie. ⊙
hy bride. F. m. ¥
cornue. F. ⊙
pied-d'oiseau. ⊙
couchée. orient. ⊙
laciniée. Égypte. ⊙

2. Fleurs sessiles.

de Montpellier. ①
épineuse. crète. ①
à gousses longues. f. m. ①
Fenu-grec. f. m. ② (méd.)

LOTIER

comestible. orient. ①
à grosses gousses. F. ¥
à quatre ailes. orient. ②
conjugué. F. ①

étranger. Barbarie. O

dissus willd. sp. hispidus Dec. cat. arabicus L. Mant. coimbrensis willd. sp. creticus L. jacobæus L. ornithopodioides L. corniculatus L. -major. - angustifolius. varians Desvaux, Journ. hirsutus L. rectus L. Dorycnium L. norycnium monspeliense willd. sp. fruticulosus.

Dolichos 4 Lablab L. - albus. sinensis L. sesquipedalis L. unguiculatus L. luteolus Jacq. Hort. articulatus Encycl. minimus L. lignosus L. urens L. ensiformis L. acinaciformis Jacq. 1c. gladiatus Jacq. Ic. soja L. biflorus L.

PHASEOLUS vulgaris L. coccineus Encycl. multiflorus willd. sp. § lunatus L. vexillatus L. caracalla L. paniculatus mich. Fl. radiatus Encycl. semierectus L. Mant. nanus L. stipularis Encycl. sphærospermus L.

étalé. F. 🔾 hérissé. F. m. O d'Arabie. or. The de Coïmbre. O argenté. orient. or. h à fleurs brunes. Afr. or. E. comprimé. Esp. O pied-d'oiseau. F. V --élevé. - à feuilles étroites. à fleurs chang. orient. or. 1) velu. F. m. or. h à tige droite. F. m. Z poryenium. f. m. or. h

sous-arbrisseau. or. 19

Dolle ? Lablab. Égypt. (orn.) - à fleurs blanches. de Chine. O à longues gousses. Antilles. O onguiculé. Antilles. 🕥 jaunâtre. Antilles. O articulé. Antilles. s. ch. ¥ nain. Antilles. s. ch. T ligneux. inde. s. ch. h (orn.) brûlant. Antilles. s. ch. 19

pois-sabre. Ant. s. ch. 19 à grandes gousses. Ant. s. ch. 1) soja. japon. 🕥 à deux fleurs. inde. O 10,111

HARICOT

commun. inde. O (écon.) écarlate. Antilles. O arqué. inde. (écon.) à grand étendard. Antilles. O caracolle. inde. s. ch. b (orn.) paniculé. Am. s. T à rayons. ceylan. O pourpre. Antilles. 🕥 nain. mde. O à grandes stipules. Inde. O

à graines rondes. inde. O

herbacea z. corallodendrum z. abyssinica encycl. aculeatissima. crista-galli willd. sp. laurifolia jacq. obs.

CLITORIA

- Ternatea L.

— heterophylla Encycl. brasiliana L. virginiana L. glabella Galactia glabella Mich. Fl.

GLYCINE

monoica L.
caribæa Jacq. Ic.
tomentosa L.
bituminosa L.
Apios L.
frutescens L.
rubicunda Bot. Mag.
Kennedia rubicunda vent.
Malm.
bimaculata Bot. Mag.
Kennedia monophylla vent.
Malm.
coccinea Bot. Mag.
Kennedia coccinea vent.
Malm.

ABRUS

- precatorius s. veg. }
Glycine Abrus L.

Aмоприа fruticosa L. pumila mich. Fl.

Piscidia Erythrina L.

ROBINIA

pseudo-acacia L.
inermis.
viscosa vent. H. cels.
hispida L. mant.
altagana l'Her. stirp.

ERYTHRINA herbacé. caroline. or. V Arbre de corail. Ant. s. ch. 5

d'Abyssinie. s. ch. 5 très-epineux. s. ch. 5

crête-de-coq. Brésil. s. ch. 5

Voir. page, 26g.

CLITORIA

de Ternate. Inde. s. ch. o — à fleurs blanches. à feuilles var. Inde. s. ch. Z du Brésil. O de Virginie. O glabre. Am. s. Z

GLYCINÉ

monoique. Am. s. T des Antilles. s. ch. 5 cotonneux. Am. s. T bitumineux. cap. or. T Apios. Am. s. T arbrisseau. Am. s. 5 (orn.)

à fl. rouges. N. Holl. or. b (orn.)

à deux taches. N. Holl. or. 5

écarlate. N. Holl. or. h

ABRUS

à chapelet. Antilles. s. ch. 3

AMORPIIA

faux indigo. Am. s. h (orn.)
nain. Am. s. h

PISCIDIA

Erythrina. Antilles. s. ch. 9

ROBINIA

faux Acacia. Am. s. 5 (orn.)
sans épines. 5 (orn.)
visqueux. Am. s. 5 (orn.)
Acacia rose. Am. s. 5 (orn.)
Altagana. Daourie. 5 (orn.)

caragana L.

pygmæa L.

frutescens L.

chamlagu l'Her. stirp.

spinosa L. Mant.

halodendron L. f.

squamata Vahl, symb.

COLUTEA

arborescens L.

alepica Encycl.

pocockii Willd. sp. }

orientalis. Encycl.

cruenta H. K.

media Willd. Enum.

frutescens L.

LESSERTIA

perennans *Dec. Astr.*colutea perennans s. Veg. }
annua *Dec. Astr.*colutea herbacea L. }

PHACA

bœtica L.
astragalina pec. Astr. \
Astragalus alpinus L. \
alpina L.

OXYTROPIS.

campestris Dec. Astr.

Astragalus campestris L.

pilosa Dec. Astr.

Astragalus pilosus L.

deflexa Dec. Astr.

Astragalus deflexus Pallas,

Astr.

hians Jacq. Ic.

parviflorus Encycl.

ASTRAGALUS.

1. Stipulis caulinis; floribus rubris.

austriacus L.

annularis Forsk. Ægypt.

maculatus Encycl.

subulatus Desf. Atl.

stella s. Veg.
sesameus L.

caragana. sibérie. 5 (orn.)
grêle. sibérie. 5
arbrisseau. sibérie. 5
chamlagu. chine. 5 (orn.)
épineux. sibérie. 5
satiné. sibérie. 5
écailleux. Antilles. s. ch. 5

BAGUENAUDIER

en arbre. F. m. h (orn.)

d'Alep. orient. h (orn.)

d'Orient. 5 (orn.)

hybride. 5
d'Ethiopie. cap. or. 3 (orn.)

LESSERTIA

vivace. sibérie. 4
annuel. cap. ①

 P_{HACA}

de Portugal. or. ¥

faux Astragale. F. ¥

des Alpes. ¥

OXYTROPIS

des champs. F. ¥

velu. Alpes. ¥

à fruit pendant. sibérie. v

ASTRAGALE.

1. Stipules adhérentes à la tige; fleurs rouges.

d'Autriche. F. m. Z

annulaire. Afr. s. O

étoilé. F. m. O
à fleurs sessiles, F. m. O

vesicarius L.
pentaglottis L. Mant.
purpurens Encycl.
hypoglottis L. Mant.
Glaux L.
onobrychis L.
— major.
hispidulus Dec. Astr.
sulcatus L.

2. Stipulis caulinis; floribus ochroleucis.

bæticus L. depressus L. epiglottis L. contortuplicatus L. trimestris L. hamosus L. reptans willd. H. Ber. glyciphyllos L. cicer L. galegiformis L. asper Jacq. Ic. chloranthus Pallas Astr. canadensis L. uliginosus L. odoratus Encycl. falcatus Encycl. christianus L. tomentosus Encycl. alopecuroides L. narbonensis Gouan, Ill.

3. Stipulis petiolo adhærentibus; inermes.

caprinus z.
exscapus L.
incanus L.
monspesulanus z.

4. Spinescentes.

longifolius Encycl.
massiliensis Encycl.
Tragacantha L.
sempervirens Encycl.
aristatus l'Her. stirp.
Tragacantha Vill.
pelph.

vésiculeux. Alpes. W

pentaglotte. Barbarie. or. Z

pourpre. F. m. Z

Hypoglotte. F. ①

Glaux. Esp. ②

onobrychis. F. Z

— de Sibérie.

hérissé. Égypte.

sillonné. sibérie. W

2. Stipules adhérentes à la tige; fleurs d'un blanc jaune.

> de Portugal. O déprimé. F. Z Épiglotte. F. 🔾 recroquevillé. sibérie. 🔾 hâtif. Égypte. 🔾 en hameçon. f. m. O rampant. mexique. or. Z à feuilles de réglisse. F. Z à gousse ronde. F. Z Galéga. sibérie. 72 rude. sibérie. 72 de Canada. Z des marais. sibérie. T odorant. orient. W falciforme. Russie. 72 de Judée. or. v

3. Stipules adhérentes au pétiole; feuilles non epineuses.

de Narbonne. F. m. T

cotonneux. Égypte. or. T

queue-de-renard. sibérie. Z

odorant. Barbarie. or. ¥
sans tige. suisse. ¥
blanc. F. m. ¥
de Montpellier. ¥

4. Feuilles terminées en épine.
à long. feuilles. orient. or. y
de Marseille. F. m. y

toujours vert. F. 5

Biserrula Pelecinus L.

GLYCYRRHIZA echinata L. glabra L. fœtida Desf. Atl.

GALEGA

officinalis L.
orientalis Encycl.
rosea Encycl.
pulchella scop. insub.
stricta H. K.
cinerea L.
coronillæfolia.
caribæa Jacq. Am.
pubescens Encycl.
longifolia Jacq. Ic.
clitoria micrantha scop. Ins.

Italian p

Indigofera

viscosa Encycl.

— tinctoria L.

Anil L. Mant.

argentea l'Her. stirp. \
glauca Encycl. \
psoraloides Willd. sp.

cytisoides s. Veg.

macrostachya Vent. Malm.
australis Willd. sp.
enneaphylla L. Mant.

LATHYRUS. Phylla.

1. Pedunculis unifloris.

Aphaca L.
nissolia L.
axillaris Encycl.
sphæricus Retz. obs. }
cicera L.
sativus L.
setifolius L.
tumidus Encycl.

2. Pedunculis bifloris.

clymenum L.
articulatus L.
odoratus L.
tingitanus L.
annuus L.

BISERRULA en rateau. Barbarie. 🕥

Réglisse hérissée. Tartarie. V officinale. F. V (méd.) fétide. Barbarie. or. V

GALÉGA

officinal. F. V.
d'Orient. V.

rose. cap. or. 5

élégant. cap. or. 5

cendré. Antilles. ©
à feuill. de coronille. s. ch. 5
des Antilles. s. ch. 5
pubescent. Antilles. s. ch. 5

à long. feuilles. Ant. s. ch. 5°

INDIGOTIER

visqueux. Antilles. s. ch. & des teintur. inde. s. ch. b (écon.)

Anil. inde. s. ch. o (écon.)

argenté. orient. or. 5 (écon.)

faux psoraléa. cap. or. 5
faux cytise. cap. or. 5
à grands épis. chine. or. 5
austral. N. Holl. or. 5
à neuf feuilles. inde.

GESSE.

1. Pédoncules à une fleur.

Aphaca. F. ①
de Nissole. F. ①

axillaire. F. m. O

sillonnée. Esp. ①
cultivée. F. ① (écon.)
à feuilles étroites. F. m. ①
renflée. ¥

2. Pédoucules à deux fleurs.

d'Espagne. ①
articulée. F. m. ①
odorante. ceylan. ② (orn.)
de Tanger. ④
jaune. F. m. ②

3. Pedunculis multifloris.

hirsutus L.
tuberosus L.
pratensis.
sylvestris L.
latifolius L.
palustris L.

PISUM

sativum L.
— ecorticatum.
— umbellatum.
arvense L.
maritimum L.
ochrus L.

OROBUS

lathyroides L.
vernus L.
luteus L.
tuberosus L.
varius Bot. Magaz.
albus L. f.
sylvaticus L.
niger L.
tomentosus.
Lathyrus tomentosus cav. 1c.
vicia fruticosa willd. sp.

VICIA.

1. Pedunculis elongatis.

pisiformis L.
dumetorum L.
sylvatica L.
cracca L.
onobrychioides All. Ped.
atropurpurea Desf. Atl.
benghalensis L.
monanthos.
Ervum monanthos L.
Ervilia Willd. sp.
Ervum Ervilia L.

2. Floribus axillaribus, subsessilibus.

sepium z.
sativa z.
— angustifolia.
peregrina z.

William is

3. Pédoncules à plusieurs fleurs.

velue. F. ①
tubéreuse. F. ¥ (écon.)
des prés. F. Æ
sauvage. F. Æ
à larges feuilles. F. m. ¥
des marais. F. Æ

Pois

cultivé. F. ① (écon.)

— sans parchemin.

— à bouquets.

des champs. F. ①

maritime. F. ¥

ailé. F. ①

OROBE

à feuilles de Gesse. sibérie. To printanier. F. W. jaune. Alpes. W. tubéreux. F. W. bigarré. Italie. To blanc. Autriche. W. des bois. Alpes. To noir. F. To

cotonneux. pérou. s. ch. 5

VESCE.

1. Pédoncules allongés.

pisiforme. F. W

des buissons. F. W

des bois. F. W

à fleurs nombreuses. F. W

à feuill. de sainfoin. Alpes. O

brun. pourpre. Barbarie. O

du Bengale. O

à une fleur. F. O

2. Fleurs axillaires, presque sessiles,

des haies. F. Z
cultivée. F. ① (écon.).
— à feuilles étroites.
étrangère. F. ②

212	
torulosa.	bosselée. 💍
lathyroides L.	printanière. F. O
Ervum soloniense L. (ex willd.) lutea L.	
hybrida ż.	jaune. f. ⊙ hybride. f. ⊙
pannonica Jacq. Austr.	de Hongrie. 🔾
narbonensis z.	de Narbonne. O
FABA	FÉVE
major.	de marais. perse. (écon.)
— minor.	- Féverole.
— viridis.	-verte.
ERVUM	LENTILLE
hirsutum L.	velue. F. O
tetraspermum z.	à quatre graines. F. O
Lens L.	
cicer Lens Willd. sp.	cultivée. F. m. (écon.)
-minor.	— petite.
CICER	CICER
arietinum L.	Pois-chiche. orient.
IV. Legumen articulatum; articulis monos permis.	IV. Gousse articulée; articulations monospermes.
Scorpiurus	CHENILLETTE
vermiculata z.	écailleuse. F. m. O
muricata L.	hérissée. F. m. O
sulcata L.	sillonnée. F. m. 🔾
ORNITHOPUS	PIED-D'OISEAU
perpusillus z.	petit. r. O
compressus z.	comprimé. F. m. O
scorpioides L.	queue-de scorpion. F. m. O
Hippocrepis	HIPPOCRÉPIS
unisiliquosa z.	à gousses solitaires F. m.
multisiliquosa z.	à plusieurs gousses, f. m. O
comosa L.	des champs. F. L. de Mahon. or. 5
balearica sacq. 1c.	
Coronilla	CORONILLE
Emerus L.	émérus. Alpes. 5 (orn.)
stipularis Encycl.	à grandes stipules. F. m. or. b
glauca L.	
juncea <i>L</i> .	glauque. F. m. or. b
minima L.	jonciforme. F. m. or. 5 petite. F. Z
varia L.	bigarrée. F. Z (orn.)
globosa Encycl.	globuleuse. orient. or. Z
cretica z.	de Crète. O
securidaca L.	à gousses plates. F. O
	15
	*

1. Foliis simplicibus.

maculatum L.
gangeticum L.
vaginale L.
vespertilionis L. f.

triquetrum L.

2. Foliis ternatis.

junceum L.
coriaceum.
canadense L.
canescens L.?
marilandicum L.
diffusum.

- gyrans I. f. V.d Serpetum obile.

3. Foliis pinnatis.

alpinum L.
obscurum L.
coronarium L.
flexuosum L.
fruticosum L. f.
muricatum Jacq. 1c.
lanuginosum.
capitatum pesf. Atl.
onobrychis L.
saxatile L.
caput-galli L.
crista-galli s. Veg.

ESCHINOMENE Vol agate.

grandiflora L.

coronilla grandiflora willd.

sp.

sesban L.

coronilla sesban willd. sp.

picta cav. 1c.

coronilla picta willd. sp.

fusca.

V. Corolla papilionacea; legumen capsulare, submonospermum sapè, non dehiscens.

Dalbergia.
-latisiliqua pers. syn.

Geoffræa inermis swartz. prodr.

A institute of the state of the

In the thing

SAINFOIN.

1. Feuilles simples,

panaché. inde. ①
du Gange. inde. ①
à gaînes. inde. ①
Aile - d'oiseau. cochinchines
s. ch. &
triangulaire. inde. s. ch. b

2. Feuilles ternées.

effilé. sibérie. ¥
à feuilles coriaces. or. 5
de Canada. ¥
blanchâtre. Am. s. or. Æ
de Mariland. Æ
étalé. s. ch. 5
oscillant. Bengale. s. ch. o

3. Feuilles pennées.

des Alpes. F. Z
à fruit lisse. Alpes. ¥
d'Espagne. ♂ (orn. écon.)
tortueux. orient. ⊙
arbrisseau. sibérie. Þ
hérissé. Afr. ¥
laineux. orient. ¥
à fleurs en tête. Alger. ⊙
cultivé. F. (écon.)
des rochers. Alpes. Z
tête-de-coq. F. m. ⊙
crête-de-coq. orient. ⊙

Eschinoméné

à grandes fleurs. Inde. s. ch. >

sesban. égypte. s. ch. o

tacheté. N. Esp. s.ch. J

à fleurs brunes. s. ch. y

V. Corolle papilionacée; gousse capsulaire à une loge, ordinairement monosperme et ne s'ouvrant point.

DALBERGIA

à gousse large. Ant. s. ch. 5

Géoffréa

sans épines. Antilles. s. ch. 5

Prenocanpus

Ecastaphyllum willd. sp.

scandens L. volubilis willd. sp.

ORDO XII.

TEREBINTHACEÆ.

.Germen simplex; fructus unilocularis, monospermus.

ANACARDIUM occidentale L.

MANGIFERA
— indica z.

RHUS.

1. Foliis pinnatis.

typhinum L.
glabrum H. K.
vernix L.
copallinum L.
semialatum syst. veg.
javanicum L.

2. Foliis ternatis.

Toxicodendrum L. aromaticum H. K. tomentosum L. dentatum Thunb. Prodr. cuneifolium L. f. glaucum. Thezera Desf. Atl. Rhamnus pentaphyllus z. s oxyacanthoides. angustifolium L. vinginale H. K. heterophyllum. levigatum L. lucidum L. villosum L. f. undulatum Jacq. n. sch. nervosum.

PTÉROCARPUS
à feuilles simples. Ant. s. ch. 5
Sécuridaca

Voi'v m Sup. py 269. 1 satisfies

ORDRE XII.

TÉRÉBINTHACÉES.

I. Un seul ovaire; fruit à une seule loge monosperme.

ANACARDE

d'Occident ou Noix d'Acajou.

Antilles. s. ch. 3 (écon.)

MANGUIER cultivé. inde. s. ch. 5 (écon.)

SUMAC.

1. Feuilles pennées.

des corroyeurs F m. h (écon.)
de Virginie. h (orn.)
glabre. Am. s. h (orn.)
vernis. Am. s. h
ailé. Am. s. h
semi-ailé. Inde. s. ch. h
de Java. s. ch. h

2. Feuilles ternées.

vénéneux. Am. s. 5
aromatique. Am. s. 5
cotonneux. cap. or. 5
denté. cap. or. 5
cunéiforme. cap. or. 5
glauque. cap. or. 5

rhézéra. Alger. or. 5

à f. d'Aubépine. orient. or. 5
à feuilles étroites. cap. or. 5
flexible. cap. or. 5
à feuilles variables. or. 5
lisse. cap. or. 5
luisant. cap. or. 5
velu. cap. or. 5
velu. cap. or. 5

n°.

3. Foliis simplicibus.

cotinus z.

CNEORUM tricoccum z.

Comocladia ilicifolia swartz. prodr.

Amyris
polygama cav. 1c.
maritima Jacq. Am.

Schinus Molle z.

PISTACIA

Terebinthus Z.

trifolia L. \
vera Z. \
chia.

atlantica Desf. Atlanticus L.

Bursera gummifera z.

Spondias

monbin s. veg.

purpurea L.

{ cytherea encycl. }

dulcis willd. sp. }

myrobalanus s. veg. }

lutea L.

II. Germen multiplex; fructus multicapsularis.

AYLANTUS glandulosa Desf. Acad.

Brucea ferruginea l'Her. stirp.

FAGARA

pterota z.

microphylla.

- Co 7 (1 2.5 ° 2).

Zanthoxylum
fraxineum willd.sp.
cauliflorum mich. fl.
clava-herculis L.

3. Feuilles simples.

Fustet. F. 5 (orn. teint.)

CNÉORUM
à trois coques. F.m. 9

COMOCLADIA
à f. de Houx. Ant. s. ch. 5

Amyris

polygame. chili. s. ch. 5

maritime. Antilles. s. ch. 5

Schinus Mollé. pérou. or. 5 (orn.)

PISTACHIER

Térébinthe. F. m. h

cultivé. orient. or. h (écon.

méd.)

de Chio. or. h

de l'Atlas. or. h (écon.)

Lentisque. orient. or. h (écon.)

Burséra gommifère. Antilles. s. ch. 5

SPONDIAS

Monbin. Inde. s. ch. 5

Arbre de Cythère. île de Fr. s. ch. 5

jaune. Antilles. s. ch. 5

II. Plusieurs ovaires; autant de capsules.

AYLANTE glanduleux. Japon. 5 (orn.)

Brucés ferrugineux. Afr. s. ch. 5

à f. de Jasmin. Ant. s. ch. 5 à petites feuilles. Ant. s. ch. 5

ZANTHOXYLUM

à seuilles de Frêne. Am. s. 5

à gros aiguillons. Ant. s. ch. 5

PTELEA trifoliata L.

DodonæA

viscosa L. f.

ptelea viscosa L. s

angustifolia L. f.

triquetra willd. sp.

Averrhoa

— Bilimbi z.

Juglans
regia L.
— serotina.
— fraxinifolia

fraxinifolia Encycl.
alba L.
olivæformis H. K. }
cylindrica Encycl. }

- cinerea L.

ORDO XIII.

RHAMNOIDEÆ.

I. Stamina petalis alterna; fructus capsularis.

STAPHYLÆA

pinnata z.

trifoliata z.

Evonymus
europæus L.
latifolius L.
americanus L.
atropurpureus Jacq. Hort.
verrucosus Jacq. Austr.

scandens L.
cassinoides l'Her. sert.
octogonus l'Hert. sert.
lucidus l'Her. sert.
cassine concava Encycl.
buxifolius L.
pyracantha L.
senegalensis Encycl.
phyllacanthus l'Her. sert.
multiflorus Encycl.

PTÉLÉA à trois feuill. Am. s. 1) (orn.)

DODONÉA

visqueux. Inde. s. ch. 5
d feuill. étroites. Inde. s. ch. 5
triangulaire. N. Holl. or. 5

AVERRHOA
Bilimbi. inde. s. ch. 5

Noyer

cultivé. Asie. b (écon.)

— tardif.

à feuilles de Frêne. Asie. b

blanc. Am. s. b

Pacanier. Am. s. b (écon.)

cendré. Am. s. b

noir. Am. s. (écon.)

ORDRE XIII.

RHAMNOIDES.

I. Étamines alternes avec les pétales; une capsule.

STAPHYLÉA

à feuilles pennées. F. 5 (orn.)

à f. ternées. Am. s. 5 (orn.)

Fusain

d'Europe. F. 5 (écon. orn.)

à larges feuilles. F. 5 (orn.)

d'Amérique. Am. s. 5

noir-pourpre. Am. s. 5

galeux. Autriche. 5

CÉLASTRUS
grimpant. Am. s. 19
à f. de cassiné. canar. or. 5
octogône. pérou. s. ch. 19
luisant. cap. or. 5
à feuilles de Buis. cap. or. 5
à épines rouges. cap. or. 5
du Sénégal. s. ch. 5
à fleurs nombr. cap. or. 5

II. Stamina petalis alterna; drupa aut II. Étamines alternes avec les pétales; un bacca.

RUBENTIA mauritiana.

CASSINE capensis L. Mant. maurocenia L. xylocarpa vent. choix de Pl.

ILEX

Aquifolium z. - crassifolium. -ferox. - serratum. - variegatum. balearica. maderiensis Encycl. perado H. K. cassine L. canadensis mich. Fl. - angustifolia. æstivalis Encycl. prinoides H. K. vomitoria H. K. cassine peragua L.

PRINOS verticillatus L. glaber L. lucidus H. K.

III. Stamina petalis opposita; fructus drupaceus.

RHAMNUS.

1. Spinosi.

catharticus z. infectorius willd. sp.

theezans L. Mant. lycioides L. oleoides z. saxatilis Jacq. Austr. Erythroxylum Pallas, Ross.

2. Inermes.

Frangula z. colubrinus z. drupe ou une baie.

RUBENTIA Bois d'olive. île de F. s. ch. b

CASSINÉ du Cap. or. 19 à f. convexes. cap. or. h à fruit osseux. Ant. s. ch. 9

Houx

commun. f. h (orn. écon,) - à feuilles épaisses. - hérisson. -en scie. —panaché. de Mahon. h de Madère, or. 5 à f. de Laurier. carol. or. 5 de Canada. 5 — à feuilles étroites. d'été. caroline. or. 19 purgatif, Apalachine. Floride. or. h

PRINOS verticillé. Am. s. 3 glabre. Am. s. 19 luisant. 19

III. Etamines opposées aux pétales; un drupe.

NERPRUN.

1. Tiges épineuses.

purgatif. F. h (arts, med.) Graine d'Avignon. F. m. b (teint.) de Chine. or. h à f. linéaires. F. m. or. p à feuill. d'olivier. Esp. or. 5 des rochers. Alpes. 5 à longues feuilles. sibérie. 5

2. Tiges sans épines.

Bourgêne. F. b (arts.) ferrugineux. Antilles. s. ch. 5

hybridus l'Her. sert.) hybride. 5 burgundiacus. des Alpes. F. 1) alpinus L. à feuilles d'Aune. Am. s. b alnifolius l'Her. sert. nain. Alpes. b pumilus Jacq. 1c. glanduleux. canaries. or. 19 glandulosus H. K. ellipticus H. K. ceanothus reclinatus l'Her. elliptique. Antilles. s. ch. 5 Alaterne. F. m. b (orn.) Alaternus L. —à feuilles étroites. - angustifolius. -d'Espagne. _ hispanicus. — à feuilles rondes. - rotundifolius. —panaché. - variegatus. - anuda. JUJUBIER ZIZYPHUS de Chine. or. 5 sinensis Encycl. des Inguanes ou croc-de-chien. inguanea Encycl. antilles. s. ch. b Cermina. des Lotophages. Tunis. or. 1) Lotus Desf. Atl. sativa. cultivé. orient. 5 (écon. méd.) vulgaris Encycl. } Napéca. égypte. s. ch. 1) (écon.) spina-christi. sarmenteux. Am. s. 1) volubilis L. f. · 11.2 12) PALIURUS PALIURUS épineux. F. m. b aculeatus, PITTOSPORUM PITTOSPORUM ondulé. N. Holl. or. b undulatum vent. H. cels. coriace. madere. or. b coriaceum Andr. Rep. recourbé. N. Holl. or. 19 revolutum H. K. Tobira H. K. robira. chine. or. b Evonymus robira willd. sp. } de Chine. or. 1) sinense. Eléodendrum ELÆODENDRUM orientale Jacq. Ic. d'Orient. madagascar. s. ch. y Rubentia longifolia. australe vent. malm. austral. N. Holl. or. 9 Argan. maroc. or. b (econ.) Argan Retz. obs. IV. Etamines opposées aux pétales; fruit IV. Stamina petalis opposita; fructus tricoccus. à trois coques. POMADERRIS POMADERRIS apétale. N. Holl. or. b apetala Bill. N. Holl. COLLÉTIA

sans seuilles. Pérou. or. 9

COLLETIA

Ephedra vent. ch. de Pl.

CEANOTHUS

africanus z.

americanus z.

azureus.

discolor vent. malm.

macrophyllus.

PHYLICA ericoides z.

axillaris Lamk, Ill,
linearis.
plumosa L.
pubescens H. K.
squarrosa.
myrtifolia Encycl.
paniculata willd. sp. }
cordata L.
thymifolia Vent. Malm.

Genera Rhmnoideis affinia.

Brunia lanuginosa z. capitata.

LASIOPETALUM ferrugineum Andr. Rep.

Gouania integrifolia Encycl.

Aukuba japonica Thunb. Jap.

Céanothus
d'Afrique. cap. or. 5
d'Amérique. am. s. 5
azuré. 5

de deux couleurs. N. Holl. or. h à larges feuilles. h

PHYLICA

Bruyère du Cap. cap. or. 5
 (orn.)

axillaire. cap. or. 5
à feuilles linéaires. cap. or. 5
plumeux. cap. or. 5
pubescent. cap. or. 5
à feuilles roides. cap. or. 5
à feuilles de Myrte. cap. or. 5
à feuilles en cœur. cap. or. 5
à f. de Thym. N. Holl. or. 5

Genres qui ont de l'affinité avec les Nerpruns.

BRUNIA
lanugineux. cap. or. 5
à fleurs en tête. cap. or. 5

LASIOPÉTALUM ferrugineux, Bot. Bay. or. 5

Gouania

à feuilles entières. s. ch. 5

Aukubà

du Japon. 5

CLASSIS XV.

DICOTYLEDONES

APETALÆ.

(Stamina idiogyna.)

ORDO I.

EUPHORBIACEÆ.

I. Styli plures definiti, sapius 3.

Mercurialis perennis L. CLASSE XV.
DICOTYLÉDONS

APÉTALES.

(Fleurs unisexuelles.)

ORDRE I.

EUPHORBIACÉES.

I. Plusieurs styles définis, souvent trois,

MERCURIALE vivace. F. 76

annua L.
tomentosa L.
elliptica Encycl.

EUPHORBIA.

- 1. Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.
- hypericifolia z.

 maculata jacq. Hort.

 picta jacq. Ic.

 pilulifera z.

 capitata Encycl. }

 thymifolia z.

 canescens z.

 chamæsyce z.

 peplis z.

 prunifolia jacq. H. sch.
 - 2. Herbaceæ; umbella trifida.

micrantha willd. sp.
peplus z.
falcata z.
exigua z.

3. Herbaceæ; umbella quadrifida.

Lathyris L.

4. Herbacea; umbella guinquefida.

purpurata Thuil. Fl.
flavicoma Dec. cat.
alepica L.
segetalis L.
Helioscopia L.
serrata L.
verrucosa L.
platiphylla L.
litterata Jacq. Ic.
buplevroides Desf. Atl.
orientalis L.
hyberna L.
sylvatica L.

5. Herbacea; umbella multifida.

Esula L.
virgata wald. et kitt. Hung.
illyrica Encycl.
linariæfolia Encycl.

annuelle. f. ① (méd.)
cotonneuse. f. m. b
elliptique. Portugal. or. b

EUPHORBE.

1. Tiges her hacées; ombelle bifide ou nulle.

à f. d'hypéricum. inde. ①
tacheté. Am. s. ①
panaché. Am. m. s. ch. ¥
à globules. inde. ②
à feuilles de Thym. inde. ②
blanchâtre. Esp. ①
chamésycé. F. m. ②
péplis. F. m. ②
à feuilles de Prunier. ③

2. Tiges herbacées; ombelle à trois rayons.

à petites fleurs. perse. O
péplus. F. O
falciforme. F. O
menu. F. O

3. Tiges herbacées; ombelle à quatre rayons.

épurge. F. & (méd.)

4. Tiges herbacées; ombelle à cinq rayons.

purpurin. F. ①

jaune d'or. F. Z

d'Alep. syrie. or. ¥

des moissons. F. ②

Réveille-matin. F. ②

en scie. F. Z

tuberculeux. F. ¾

à feuilles larges. F. ③

bariolé. ③

à f. de Buplèvre. Alger. or. Z

d'Orient. Z

à feuilles de Lauréole. F. ¾

des bois. F. Z

5. Tiges herbacées; ombelle à plus de cinq rayons.

Ésule. F. W effilé. Hongrie. W de Dalmatie. W à feuilles de Linaire. F. W pinifolia Encycl.

cyparissias z.

palustris z.

salicifolia Dec. Itin.

myrsinites z.

amygdaloides Encycl.

nicensis Jacq. Ic.

6. Caule suffruticoso aut fruticoso.

characias z.

Paralias z.

Pithyusa z.

spinosa z.

mauritanica z.

virgata.

dendroides z.

atropurpurea pec. cat.

longifolia encycl.

mellifera H. K.

linearis retz. obs. et encycl.

suppl.

cotinifolia z.

verticillata.

heterophylla z.

7. Carnosæ inermes.

8. Carnosæ spinosæ.
uncinata pec. pl. gr.
canariensis L.
histrix jacq. H. sch.
loricata encycl.
neriifolia L.
officinarum L.
mamillaris L.
polygona.

- PHYLLANTHUS.

1. Fruticosa.

grandifolia L. brasiliensis Encycl.

reticulata Encycl.

à feuilles de Pin. F. Z petit cyprès. F. Y des marais. F. Y à feuilles de saule. F. Y Myrsinitès. F. m. Y à feuilles d'Amandier. F. Z

C (II)

6. Tige ligneuse ou presque ligneuse,

à fleurs brunes. F. m. 5
maritime. F. 5
à feuilles de Genévrier. F. 5
piquant. F. m. or. 5
de Mauritanie. or. 5
effilé. Afr. or. 5
en arbre. Barbarie. 5
noir-pourpre. canaries. or. 5
mellifère. canaries. or. 5
linéaire. Antilles. s. ch. 5

à f. de Fustet. Ant. s. ch. p verticillé. Antilles. s. ch. p à feuilles var. Ant. s. ch. p

7. Tiges charnues, sans épines.

à feuilles ov. ant. s. ch. b à crêtes. madagascar. s. ch. b tête-de-Méduse. cap. s. ch. b à trois dents. cap. s. ch. b

8. Tiges charnues, épineuses.
à crochets. s. ch. 5
des Canaries. s. ch. 5
hérissé. cap. s. ch. 5
à f. de Nérium. inde. s. ch. 5
des boutiques. cap. s. ch. 5

des boutiques. cap. s. ch. p mamillaire. cap. or. p polygône. cap. or. p

PHYLLANTHUS.

i. Tiges ligneuses.
à grandes feuill. Ant. s. ch. h
du Brésil ou Bois enivrant.
s. ch. h
à réseau. île de f. s. ch. h

2. Herbacea.

- wiruri L: caroliniensis mich. Fl.

KIRGANELIA . . phyllanthoides. virginea Encycl. suppl. phyllanthus kirganelia willd.

XYLOPHYLLA

falcata swartz, prodr. angustifolia swartz, prodr. latifolia swartz. Prodr. ramiflora H. K. obovata willd. Enum.] Phyllanthus lucidus.

KIGGELLARIA africana L.

CLUTIA

pulchella L. alaternoides L. polygonoides L. daphnoides willd. sp.

ANDRACHNE telephioides z.

impubes L. Mant.

Buxus

sempervirens L. - suffruticosa. - angustifolia. balearica Encycl.

SECURINEGA - nitida pers. syn.

ADELIA

Acitodon L.? acuminata mich. Fl. ovata.

RICINUS

communis z.

int.

- rutilans. viridis willd. sp. inermis Jacq. Ic.

2. Tiges herbacées,

Niruri. Inde. O de Caroline.

KIRGANÉLIA

à f. de phyllanthus. île de Fr. s. ch. b

XYLOPHYLLA

falciforme. Antilles. s. ch. 1) à f. étroites. Antilles. s. ch. 5 à f. larges. Antilles. s. cli. b à fleurs axillaires, sibérie, p ovale renversé. s. ch. 5

KIGGELLARIA d'Afrique. cap. or. 5

CLUTIA élégant. cap. or. h à feuill. d' Alaterne. cap. or. 5 à f. de polygonum. cap. or. b daphnoïde. cap. or. 19

ANDRACHNÉ couché. orient. &

AGYNÉIA glabre. chine. O

Buis

toujours vert. F. h (arts, orn.) --nain.— à feuilles étroites. de Mahon. 5

SÉCURINÉGA à f. luisantes. île de f.s. ch. b

ADÉLIA Acitodon. Antilles. s. ch. 5 acuminé. Am. s. h ovale.

RICIN commun. Inde. (méd. écon. orn.) —pourpre. vert. Inde. ()

à fruit lisse. Inde. s. ch. D

L 12 1, 1 4

JATROPHA

curcas L.
multifida L.
napæifolia Encycl.
gossypiifolia L.
acuminata Encycl.
panduræfolia Andr. Rep.

Loureira

cuneifolia cav. 1c.

Mozinna spatulata ortega, Dec.

ALEURITES

moluccana.

Ambinux *pers. syn.*croton moluccanum *z.*

CROTON.

1. Fruticosa.

- sebiferum z.

penicillatum vent. ch. de pl. ciliato-glanduliferum ortega, pec.

punctatum Jacq. 1c. balsamiferum L. Mant. lacerum.

2. Herbacea.

dioicum cay. 1c. argenteum L. tinctorium L.

lobatum L.

ACALYPHA

virginica L.
alopecuroidea Jacq. 1c.
cuspidata Jacq. H. sch.
virgata L.
scabrosa swartz, prodr.

II. Stylus unicus.

TRAGIA

volubilis z.
involucrata z.
plumosa.

SAPIUM

laurocerasum.

- Coca Dijt. cha.

JATROPHA

Pignon-d'inde. s. ch. 5 (méd.) lacinié. Antilles. s. ch. 5 à f. de Napéa. Ant. s. ch. 5 à f. de cotonnier. Ant. s. ch. 5 à f. pointues. cuba. s. ch. 5

LOUREIRA

cunéiforme. mexique. s. ch. 5

ALEURITES

Noix de Bancoul. 1 nde. s.ch. 3

Croton.

1. Tige ligneuse.

Arbre à suif. mde. s. ch. 5 (écon.)

pénicillé. cuba. s. ch. 5

ponctué. Antilles. s. ch. p balsamique. Antilles. s. ch. p lacéré. s. ch. p

2. Tige herbacée.

dioique. Mexique. 5
argenté. Antilles. ©
des teinturiers ou rournesol.
F. m. © (écon.)
lobé. Antilles. s. ch. &

ACALYPHA

de Virginie. ①
queue-de-renard. ①
en pointe. caracas. s. ch. p
effilé. Antilles. s. ch. p
à feuilles rudes. Ant. s. ch. p

II. Un style.

TRAGIA

à involucre. Inde. s. ch. 5 plumeux. Antilles. s. ch. 5

SAPIUM

à f. de Laurier-cerise. Antilles, s. ch. b

HURA

crepitans L.

DALECHAMPIA
villosa Encycl. \
scandens L.

ORDO II.

CUCURBITACEA.

GRONOVIA scandens z.

Sicros angulata L. "

BRYONIA

dioica Jacq. Austr.
africana L.
palmata L.
laciniosa L.
pubescens.

Melothria pendula 1.

Momordica charantia L.

Luffa L.
Balsamina L.
Elaterium L.

Cucumis

colocynthis L.
prophetarum L.
anguria L.
acutangulus L.
melo L.
— saccharinus.
— cantalou.
— viridis.
chate L.
nudaim L.
sativus L.
— minor.
flexuosus L.

CUCURBITA

leucantha.
— lagenaria.

- latior.

SABLIER

élastique. Antilles. s. ch. 5

DALÉCHAMPIA

sarmenteux. Antilles. s. ch. O

ORDRE II.

CUCURBITACÉES,

GRONOVIA
sarmenteux. vera-crux. O

Sicros
anguleux. Am. s.

BRYONE

dioïque. F. F (méd.)

d'Afrique. cap. or. F

palmée. ceylan. s. ch. E

laciniée. ceylan. s. ch. E

pubescente. s. ch. F

MÉLOTHRIA à fruit pendant. Am. s. O

Momordica
charantia. Inde. ①
Luffa. ceylan. ①
Balsamine. Inde. ①
concombre sauvage. F. m. ①

Concombre
coloquinte. Barb. ① (méd.)
des prophètes. Arabie. ②
d' Amérique. ①
à angles aigus. Inde. ①
melon. Asie. ② (alim. méd.)
— hrodé.
— cantalou.

— vert.

Abdélaoui. Égypte. ⊙

orange. Afr. s. ⊙

commun. ⊙ (alim.)

— petit.

serpentin. inde. ⊙

Courge

à fleur blanche. Am. m. ©

— cougourde.

— courde.

- pyrotheca. - longa.

Pepo L.

-- luteus.

- viridis.

melopepo L.

- verrucosus. -- aurantiiformis.

— pyriformis. - clypeatus.

- radiatus.

citrullus L.

TRICHOSANTHES Anguina L.

The sice had not for ORDO III.

PASSIFLORÆ.

PASSIFLORA.

1. Foliis simplicibus. maliformis L.

laurifolia z. quadrangularis z.

alata H. K. serratifolia L. cuprea L.

2. Foliis bilobis.

normalis.L. luberosa Jacq. H. sch. biflora Encycl.

3. Foliis trilobis.

ciliata H. K. punctata L. lutea L. suberosa z. minima z. angustifolia willd sp. } heterophylla H. K. glauca Jacq. H. sch. Adiantum willd. Enum. glabra wendl. collect. -poire-à-poudre. -calebasse. pepon. (alim.) -jaune. -vert. мélopepon. (alim.) -tuberculeux. -orange. - pyriforme. - Bonnet-d'électeur. -Artichaux. pasteque. orient. (alim.)

TRICHOSANTHÈS Anguina. chine. O

ORDRE III.

GRENADILLE'S.

GRENADILLE.

1. Feuilles simples. à gros fruit. Antilles. s. ch. B (alim.) à f. de Laurier. surin. s. ch. b quadrangulaire. Antilles. s. ch.

41 - 32 74 - 41

b (orn.) ailée. inde. s. ch. 5 (orn.) à feuill. en scie. surin.s.ch. y cuivrée. Bahama. s. ch. 5

2. Feuilles bilobées.

à lobes tronqués. Am. m.s.ch. 5 tubéreuse. Am. m. s. ch. b rouge. Antilles. s. ch. 5 à deux fleurs. Ant. s. ch. 19

3. Feuilles trilobées. ciliée. Antilles. s. ch. 3 ponctuee. Perou s. ch. 5 jaune. Virginie. or. 5 fongueuse. Antilles. s. ch. b à petites fleurs. Ant. s. ch. 5

à feuilles var. ant. s. ch. 5

glauque. cayenne. s. ch. 5 Adiantum. s. ch. 19

holosericea L.
peltata cav. Diss.
fœtida L.
incarnata L.

4. Foliis multilobis.

cœrulea L. filamentosa cav. piss.

CARICA

monoica. pesf. Ann.
microcarpa. Jacq. H. sch.
cauliflora Jacq. H. sch.

ORDO IV.

URTICÆ.

1. Flores in communi involucro monophyllo reconditi.

Ficus

carica L.

— violacea.

mauritiana Encycl.
 ulmifolia Encycl.
 symphytifolia Encycl.
 macrophylla
 nymphæifolia L. Mant.

benghalensis L.

laurifolia Encycl.

martinicensis Willd. sp. }

citrifolia Encycl. (non Willd.)

crassinervia

rubiginosa vent. malm.
australis willd sp.
populnea willd. sp.
religiosa L.
racemosa L.
vestita.
phytolaccæfolia.
glaucophylla.
cordata Thunb. Prodr.
undulata.
pyrifolia.
arbutifolia.
arbutifolia.
microcarpa. L. f.

.t'.) (,

veloutée. Mexique. s. ch. p en bouclier. Antilles. s. ch. p fétide. Antilles. s. ch. p incarnate. Brésil. s. ch. p

4. Feuilles à plus de trois lobes.

bleue. Brésil. or. 5 (orn.)

filamenteuse. Antilles. s. ch. 5

PAPAYER

commun. mde. s. ch. 5 monoïque. s. ch. 5 à petit fruit. caracas. s. ch. 5 à tige fleurie. caracas. s. ch. 5

ORDRE IV.

ORTIES.

I. Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

FIGUIER

cultivé. F. (écon.)

— violet.

de l'Ile de France. s. ch. 5

à f. d'orme. inde. s. ch. 5

à f. de consoude. inde. s. ch. 5

à grandes f. N. Holl. or. 5

à f. de Nymphéa. caracas. s. ch. 5

à f. de Laurier. Ant. s. ch. 5
à f. de citronnier. Ant. s. ch. 5
à grosses nervures. Antilles. s. ch. 5
du Bengale. s. ch. 5
rouillé. N. Holl. or. 5
à f. de Peuplier. Ant. s. ch. 5
à grappes. Inde. s. ch. 5
écailleux. s. ch. 5
à f. de Phytolacca. s. ch. 5

glauque. cap. s.ch. 5 ondulé. Antilles. s. ch. 5 à feuilles de Poirier. s. ch. 5 à f. d'arbousier. Ant. s. ch. 5

d - inderd.

pumila z.
scandens Encycl.
stipulata willd. sp.

Dorstenia contraverva z.

II. Flores receptaculo communi multifloro impositi, aut squamis involucrantibus capitati, aut distincti sparsi.

CECROPIA peltata L.

ARTOCARPUS integrifolia z. f.

Morus

alba L.

italica Encycl.

constantinopolitana.

nigra L.

rubra z.,

BROUSSONETIA

papyrifera willd. sp. \
morus papyrifera z. \

URTICA.

1. Foliis alternis.

baccifera z. nivea z. canadensis z.

2. Foliis opposisis.

pumila L.
crassifolia Willd. sp.

— cylindrica L. V. A Sochmer D.
cannabina L.
dioica L.
urens L.
pilulifera L.
podartii L.

FORSKALEA

tenacissima *t. mant*. angustifolia *willd. sp.*

Parietaria
officinalis z.
arborea l'her. stirp.
urtica arborea z. f.

à réseau. chine, s. ch. 5
sarmenteux. Antilles. s. ch. 5

Dorsténia
contrayerva. pérou. s. ch. ¥
(méd.)

II. Fleurs sur un réceptacle commun, ou réunies en une tête accompagnée d'écailles, ou distinctes et éparses.

CÉCROPIA
en bouclier. cayenne. s. ch. 5
ARTOCARPUS

à f. entières. Antilles. s. ch. 5

Murier

blanc. Asie min. 5 (écon.)

d'Italie. 5 (écon.)

de Constantinople. 5 (écon.)

noir. Asie min. 5 (écon.)

rouge. Am. s. (écon.)

Broussonétia

Műrier à papier. chine. 5

(écon.)

ORTIE.

r. Feuilles alternes.

baccifère. Antilles. s. ch. 5 cotonneuse. chine. or. 5 de Canada. L

2. Feuilles opposées.

naine. Am. s. &

à f. épaisses. Ant. s. ch. 5

cylindrique. Am. s. Z

de Sibérie. & (écon.)

dioïque. f. Z

grièche. f. O

à globules. f. O

de Dodart. f. O

FORSKALÉA

à larges feuilles. Barbarie.
à feuilles étroites. Afr.

PARIÉTAIRE
officinale. F. \(\pi\) (méd.)
en arbre. canaries. or. \(\pi\)

Humulus Lupulus £.

Cannabis sativa L.

Theligonum cynocrambe £.

DATISCA cannabina L.

Genera urticis affinia.

PIPER

medium Jacq. Ic.
plantagineum Encycl. }
aduncum L.
scabrum Encycl. }
discolorum.
umbellatum L.
celtidifolium
tuberculatum Jacq. Ic.
cuneifolium Jacq. Ic.
magnoliæfolium Jacq. Ic.
portulacoides Lmk Ill.

pereskiæfolium jacq. ic. blandum jacq. ic. rhomboidale. suaveolens. nitens. pulchellum H. K.

IVA-

frutescens L.

AMBROSTA

bidentata mich. Fl.
artemisiæfolia L.
maritima L.
trifida L.
arborescens Encycl.
xanthium fruticosum L. f.
Franseria ambrosioides cav.
1c.

XANTHIUM
strumarium L.
orientale L.
- spinosum L.

Houblon cultivé. L (écon.)

CHANVRE cultivé. inde. (écon.)

Thé Ligonum cynocrambé. F. 🕤

DATISCA chanvre de Crète, orient. ¥

Genres qui ont de l'affinité avec les Orties.

POIVRE

moyen. Antilles. s. ch. 19

crochu. cayenne. s. ch. 5

de deux couleurs. Ant. s.ch. 5
ombellisere. Antilles. s. ch. 5
à seuilles de celtis. s. ch. 5
tuberçuleux. Am. m. s. ch. 5
cunéisorme. Antilles. s. ch. 5
à f. de magnolia. Ant. s. ch. 5
à f. de Pourpier. 1le de Fr. s. ch. 7
à f. de Péreskia. Ant. s. ch. 7
à longs épis. Ant. s. ch. 7
rhomboïdal. s. ch. 7
vernissé. s. ch. 7
élégant. Antilles. s. ch. 7
élégant. Antilles. s. ch. 7

IVA

arbrisseau. virginie. or. 5

AMBROISIE

à deux dents. Am. s. L à feuilles d'Armoise. Am. s. L maritime. F. L à trois lobes. Am. s. O

en arbre. pérou. or. 9

Lampourde commune, f. ① d' Orient. ① épineuse, f. m. ①

16

ORDO V.

AMENTACEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

Fothergilla alnifolia z. f. — lanceolata.

ULMUS

campestris L.

— latifolia.

— suberosa.

pedunculata Foug. Acad.

effusa Willd. sp.

americana L.

rubra Mich. Arb.

fulva Mich. Fl.

chinensis.

parvifolia Jacq. H. sch.

PLANERA

ulmifolia *mich*. *Fl*.
crenata.
Richardi *mich*. *Fl*.
ulmus polygama *Encycl*.
Rhamnus carpinifolius *Pall*. *Boss*.

II. Flores unisexuales.

CELTIS

australis L.
occidentalis L.
cordata.
crassifolia Encycl. }
Tournefortii Encycl. volt ou autchio.
sinensis Bosc. Dict.
aspera.
missipipiensis Bosc, Dict.

SALIX.

1. Folia glabra.

Helix L.

triandra L.

hermaphroditica L.

pentandra L.

purpurea L.

rubra smith, Fl.

vitellina L.

ORDRE V.

AMENTACÉES

I. Fleurs hermaphrodites.

Fothergilla à feuilles d'aune. Am. s. 5 —lancéolé.

ORME

champêtre F. 5 (aris.)

— à larges feuilles.

— fongueux.

pédonculé. F. 5

d'Amérique. 5

rouge. Am. s. 5

de Chine. or. 5

PLANÉRA à feuilles d'orme. Am. s. 5

à seuilles crénelées. sibér. 5

II. Fleurs unisexuelles.

MICOUCOULIER

de Provence. 5 (arts, orn.)
de Virginie. 5 (arts, orn.)
à feuilles en cœur. Am. s. 5
de Tournefort. orient. 5
de Chine. 5
râpeux. Am. s. 5
du Missipipi. 5

SAULE.

1. Feuilles glabres.

Hélix. F. 5
h trois étamines. F. 5
hermaphrodite. F. 5
à cinq étamines. F. 5
pourpre. F. 5
rouge. F. 5
osier jaune. F. 5

nigra willd. sp.	noir. am. s. h
fragilis L.	fragile. F. 5
præcox willd. sp.	medical and the
amygdalina z.	precoce. F. b
babylonica L.	is feuilles d'amandier. F. D
nontedovene will a	pleureur. orient. 5
pontederana willd. sp.	de Pontédéra. Alpes. 5
myrsinites L.	my reinites. Alpes. 3
retusa z.	émoussé. F. h
2. Folia villosa.	2. Feuilles velues.
reticulata L.	
	à réseau. Alpes. 5
incubacea z.	des dunes. F. 19
fusca L.	hmm Atm
incubacea Encycl.	brundtre. F. 9
lanata.	7
arenaria L.?	laineux. Alpes. 5
riparia willd. sp.	
lavandulæfolia Lapeyr. Fl.	à f. de Lavande. pyrénées. 5
alba L.	
viminalis z.	blanc. F. 5
	à longues feuilles. F. 5
acuminata smith, Fl.	acuminé. F. 5
aurita z.	auriculé. F. D.
aquatica smith, Fl.	aquatique. F. H
caprea z.	marceau. F. h
Populus	$oldsymbol{P_{EUPLIER}}$
alba z.	blanc. f. h
	ottine. F. 2)
of Isea.	
grisea.	-grisaille.
tremula z.	— grisaille. Tremble. F. D
grandidentata <i>mich. arbr.</i>	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H
grandidentata <i>mich. Arbr.</i> græca <i>H. K.</i>	— grisaille. Tremble. F. D
tremula z. grandidentata <i>mich. Arbr.</i> græca <i>н. к.</i> fastigiata	— grisaille. Tremble. F. D à grandes dents. Am. s. D d'Athènes. orient. or. D
tremula z. grandidentata <i>mich</i> . <i>Arbr</i> . græca <i>H</i> . <i>K</i> . fastigiata dilatata <i>willd</i> . <i>sp</i> .	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L.	— grisaille. Tremble. F. D à grandes dents. Am. s. D d'Athènes. orient. or. D
grandidentata mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata willd. sp. } nigra L. hudsoniana mich. Arbr.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. S. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. S. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. S. H
tremula L. grandidentata mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata willd. sp. nigra L. hudsoniana mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. canadensis mich. Arbr.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. canadensis Mich. Arbr. angulata H. K.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bose, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H Baumier. Am. s. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L. candicans Willd. sp.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H Baumier. Am. s. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L. candicans Willd. sp.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H Baumier. Am. s. H blanchâtre. Am. s. H MYRICA
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L. candicans Willd. sp.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H Baumier. Am. s. H blanchâtre. Am. s. H MYRICA Galé. F. H
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. } nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. } canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. } balsamifera L. candicans Willd. sp. Myrica Gale L. cerifera L.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H blanchâtre. Am. s. H MYRICA Galé. F. H cirier de la Louis. H (écon.)
tremula L. grandidentata Mich. Arbr. græca H. K. fastigiata dilatata Willd. sp. nigra L. hudsoniana Mich. Arbr. virginiana molinifera H. K. canadensis Mich. Arbr. angulata H. K. marilandica Bosc, Dict. heterophylla L. argentea Mich. Arbr. balsamifera L. candicans Willd. sp. MYRICA Gale L.	— grisaille. Tremble. F. H à grandes dents. Am. s. H d'Athènes. orient. or. H d'Italie. H noir. F. H de la baie de Hudson. H suisse. Am. s. H de Canada. H anguleux ou de Caroline. H de Mariland. H argenté. Am. s. H Baumier. Am. s. H blanchâtre. Am. s. H MYRICA Galé. F. H

à feuilles en cœur. cap. or. 5 cordifolia L. à feuilles de chêne. cap.or. 5 quercifolia L. à feuilles en scie. cap. or. 5 serrata Encycl. Faya. madere. or. b Faya H. K. trifoliata. à feuilles ternées. Am. s. b Rhus suaveolens L. BOULEAU BETULA blanc. F. h (econ.) alha L. à feuill. de reuplier. Am. s. 5 populifolia mich. Arbr. noir. Am. s. b nigra H. K. jaune. Am. s. h lutea Mich. Arbr. papyrifera mich. Fl. à papier. Am. s. 3 merisier. Am. s. D lenta L. élevé. Am. s. h excelsa willd. sp. nain. sibérie. y nana L. à feuill. de marceau. Am. s. 19 pumila L. AUNE ALNUS communis. commun. F. 5 glutinosa willd. sp.) — lacinié -laciniata. à feuilles arrondies. Am. s. 5 subrotunda blanc. Alpes. b incana willd. sp. à feuilles en scie. Am. s. 3 serrulata willd. sp. à feuilles en cœur. 5 cordata. CHARME CARPINUS commun. F. h Betulus L. - à feuilles de chêne. -quercifolius. d'Amérique. 5 americana L. virginiana L. de Virginie. h ostrya virginiana willd. sp. } ostrya L. Houblon. Italie. 5 ostrya vulgaris willd. sp. d'Amérique. -americana. HÉTRE FAGUS des bois. F. h sylvatica L. purpurea pourpre. Am. s. 5 (orn.) ferruginea willd. sp. } CHATAIGNIER CASTANEA commun. f. h (écon.) vesca willd. sp. ragus caslanea L. S pumila willd. sp.) chincapin. Am. s. b (écon.) Fagus pumila L. CHÉNE. QUERCUS. 1. Feuilles persistantes. 1. Foliis perennantibus. Yeuse. F. 5

ilex L.

— integrifolia.
— longifolia.
suber L.
Ballota Desf. All.

coccifera L.
cinerea Mich. Arbr.
virens Mich. Arbr.

2. Foliis deciduis.

Phellos L. pseudo-suher Desf. Atl. ægylopifolia Encycl. crinita Bosc, Dict. cerris L. Tauza Bosc, Dict.) pubescens willd. lusitanica Bosc, Dict. infectoria oliv. 1tin. prasina Bosc. Dict. rubra L. coccinea mich. Arbr. catesbæi'mich. Arbr. obtusiloba mich. Arbr. aquatica L. pannosa Bosc. Dict. discolor Mich. Arbr. § tinctoria mich. Arbr. Prinus Mich. Arbr. alba L. Robur L. pedunculata willd. sp. fastigiata Encycl. apennina Encycl.

CORYLUS

rostrata H. K.
americana Mich. Arbr.
Avellana L.
tubulosa Willd. sp.
colurna L.
bizantina

Liquidambar styraciflua L. imberbe H. K.

Comptonia asplenifolia H. K.

— à feuilles entières.

— à feuilles longues.

Liége. F. m. or. b (écon.)

Ballote ou à glands doux. Alger. or. b (écon.)

au Kermès. F. m. b

cendré. Am. s. b

verdoyant. Am. s. b

2. Feuilles tombantes.

à feuilles de saule. Am. s. 5 faux Liége. Alger. 5 à feuilles d'Égylops. F. 5 crinite. F. 5 cerris. F. 5

de Portugal. h
à la noix de galle. Persc. h
Prase. Portugal. h
rouge. Am. s. h
écarlate. Am. s. h
de Catesby. Am. s. h
à lobes obtus. Am. s. h
aquatique. Am. s. h

velouté. Am. s. h

quercitron. Am. s. h (écon.)

Prinus. Am. s. h

blanc. Am. s. h

Rouvre. F. h

pédonculé. F. h

pyramidal. portugal. h

des Apennins. h

Noisetier

cornu. Am. s. 5
d'Amérique. 5
Avelinier. F. 5
Avelinier rouge. F. 5
glabre. orient. 5
de Byzance. 5

COPALME
d'Amérique. 5
d'Orient. 5

à f. d'Asplénium. Am. s. b

PLATANUS

orientalis L.

acerifolia.

occidentalis L.

ORDO VI.

CONIFERÆ.

EPHEDRA

monostachya L.,

distachya L.,

altissima pesf. Atl.

CASUARINA

equisetifolia L. f.

torulosa H. K.

stricta H. K.

distyla vent. H. cels.

quadridentata.

Podocarpus elongata l'her. Mss. (
Taxus elongata H. K.)

TAXUS

communis L.
— suecica.
oxycedrus L.
bermudiana L.
virginiana L.
phœnicea L.
sabina mas c. B.
sabina fœmina c. B.
thurifera H. K.
prostrata mich. Fl.
excelsa willd. sp.
Hermanni pers. syn.

Cupressus
sempervirens L.
— horizontalis.
pendula l'her. stirp. \
lusitanica mill. pict. \
rhyoides L.
juniperoides L.

PLATANE

d'Orient. 5 (orn. écon.)

— à feuilles d'Érable.

d'Occident. Am. s. 5 (orn. écon.)

ORDRE VI.

CONIFÈRES.

EPHÉDRA
à un épi. sibérie. 5
à deux épis. F. 5
élevé. Barbarie. 5

à f. de prêle. inde. s. ch. b tuberculeux n. Holl. or. b ramassé. n. Holl. or. b à quatre dents. n. Holl. or. b

Commun F. b (écon.)

Podoc ARPUS

allongé. cap. or. b

GENÉVRIER

commun. F. h (écon.)

— de Suède.

cade. F. h (écon.)

des Bermudes. h (écon.)

de Virginie. h (orn. écon.)

de Phénicie. F. m. or. h

sabine mâle. F. h (méd. orn.)

sabine femelle. F. h (méd.)

à l'encens. Espagne. h

couché. Am. s. h

Pyramidal. crète. 5 (écon.)

— horizontal.

pendant. Goa. or. 5

faux Thuya. Am. s. 5 (écon.)

faux Genévrier. cap. or. 5

```
(247)
 SCHUBERTIA mirbel.
                                     SCHOUBERTIA
      disticha.
                                          cyprès chauve. 5 (écon.)
      cupressus disticha L.
 THUYA
                                      THUYA
     occidentalis L.
                                          d'Occident. Am. s. b (orn.)
     orientalis z.
                                          de la Chine. 5 (orn.)
     articulata vahl, symb.
                                          articulé. Barbarie. or. 5 (écon.)
PINUS
                                     p_{IN}
     sylvestris L.
                                          sauvage. h
     - genevensis.
                                          - de Genève.
     -- rubra.
                                          - rouge.
     Laricio Encycl.
                                          Laricio. corse b
     mughus willd. sp.
                                          Mugo. Alpes. 5
     Pumilio willd. sp.
                                          pumilio. carinthie. 3
     maritima Encycl.
                                          maritime F. 5 (écon.)
     Pinea L.
                                          à pignons. F. m. b (écon.)
     halepensis willd. sp.
                                          d'Alep. F. b
     mitis mich. Fl.
                                          jaune. Am. s. h
     Tæda L.
                                          Téda. Am. s. h
     rigida mich. Arbr.
                                          épineux. Am. s. h
     mops mich. Arbr.
                                          chétif. y
     palustris willd. sp.
                                          de marais. Am. s. b
     australis mich. Arbr. §
     strobus L.
                                          de Weimouth. Am. s. b (econ.)
     adunca Bosc.
                                          de Monteray. 19
     cembro L.
                                          cembro. Alpes. 19
ABIES
                                     SAPIN
    taxifolia.
                                          argenté. F. b (écon.)
    pinus picea z. S
                                         baumier de Gilead. Am. s. p
    balsamea L.
                                            (méd.)
    canadensis mich. Arbr.
                                         Hémelock-spruce. Am. s. b
                                            (orn.)
                                         sapinette noire. Am. s. b
    nigra mich. Arbr.
                                         sapinette blanche. Am. s. 1)
    alba mich. Arbr.
     picea.
                                         epicia. F. 9 (écon.)
    pinus abies E.
    columbaria.
                                         hérissé. île Norfolck. or. 5
LARIX
                                    MÉLÈZE
    europæa
                                         d'Europe. Alpes. 1) (écon.)
    Pinus Larix L.
    americana mich. Fl.
                                         d'Amérique. 19
    pinus microcarpa Lambert,
       Pin.
                                         cèdre du Liban. Asie min. b
    cedrus.
```

(orn.)

rinus cedrus L.

Genera incertæ sedis.

Pollichia
campestris H. K.
nekeria campestris cmel.

Ardisia crenulata vent. ch. de pl.

CHLORANTHUS inconspicuus l'Her. sert.

Azıma

tetracantha Encycl.

monetia barlerioides l'Her.

stirp.

MONOTROPA Hypopitys L.

Euclea racemosa L. f.

Aristotelia macqui l'her. stirp.

SARRACENIA purpurea L. flava L.

nitida H. K.
obliqua l'Her. stirp.
minor Jacq. Ic.
purpurea swartz, prodr.
dichotoma Jacq. Ic.
suaveolens.
humilis willd. sp.
hirsuta Aublet, Guyan,
discolor H. K.

Commersonia echinata L. f.

Antidesma alexiteria L.

Pogonia debilis andr. Rep. scabra.

BALANOPTERIS
rothila Gærtn. Fruct.

Genres non classes.

POLLICHIA

des champs. cap. or. o

Ardisia crénelé. Antilles. s. ch. 5

CHLORANTHUS
à petites fleurs. chine. s. ch. 5

AZIMA

à quatre épines. inde. s. ch. 3

Monotropa нуроріtys. ғ. Е

Euclés à grappes. cap. or. 5

ARISTOTÉLIA macqui. chili. or. h

SARRACÉNIA

pourpre. Am. s. V

jaune. Am. s. V

BÉGONIA

luisant antilles. s. ch. b

dicotome. caracas. s. ch. 5 odorant. s. ch. 5 nain. inde. s. ch. 6 hérissé. cayenne. s. ch. 6 discolor. chine. s. ch. 7

à fruit hérissé. otaiti. s. ch. 5

ANTIDESMA alexitère. ile de fr. s. ch. 5

Pogonia
à tiges grêles. n. Holl. or. h
à feuilles rudes. n. Holl. or. h

BALANOPTÉRIS Tothila. inde. s. ch. 3 (249)

CONDALIA microphylla cav. 1c.

SAMYDA serrulata z.

CORIARIA myrtifolia z.

PANDANUS odoratissimus Jacq. Fragm. utilis willd. Enum.

GINKGO biloba L. mant. salisburia adiantifolia smith, CONDALIA à petites feuilles. chili. s. ch. 31

SAMYDA à feuilles en scie. Ant. s. ch. 3

à feuill. de myrte. F. 5 (écon.)

VACOUA odorant. madagascar. s. ch. 5

GINKGO

bilobé. chine. 5 (écon.) spreaments and office of the second ductions I'm time form . - Cotais

thistosticion without or were - had in so of die in the angre well in - " ambornanti. . which is it is a serie in the horosof passinatus ? ... die and the server to the server sellent,

= ,. 1. i.wip. 1, ~6.

INDEX GENERUM.

A

A 1 °	Dage of	Alcina.	Page 127
Abies.	Page 247	Aletris.	28
Abroma.	220	Aleurites.	236
Abrus.	207	Alisma.	26
Acacia	207	ALISMACEÆ.	Ibid.
Acalypha.	61	Allamanda.	93
ACANTHEÆ.	Ibid.	Allium.	$\frac{93}{32}$
Acanthus.		Allophyllus.	159
Acer.	159 Ibid.	Alnus.	. 244
Acera.	10ta. 125	Aloe.	28
Achillea.	_	Alopecurus.	11
Achras.	94 53	Alsine.	181
Achyranthes.		Alstroemeria.	53
Aconithum.	148	Althæa.	170
Acorus.	7	Alyssum.	155
Acrostichum.	2	AMARANTI.	52
Actæa.	1/19	Amarantus.	Ibid.
Adansonia.	173	Amaryllis.	34
Adelia.		Ambrosia.	241
Adenanthera.	210	4 1	6
Adiantum	4.	Amellus.	129
Adonis.	146	AMENTACEÆ.	242
Adoxa.	190	Amethystea.	66
Ægilops.	16	Amirola.	159
Ægiphila.	.64		145
Ægopodium.		Ammi. Amomum.	5 9
Æschinomene.	226	_	220
Æsculus.		Amorpha.	206
Æthusa.	140	Amygdalus.	228
Agapanthus.		Amyris. Anacardium.	227
Agave.	Ibid.	Anacaruram.	117
Ageratum.	116	Anacyclus.	57
Agrimonia.	203		211
Agriphyllum.	130		146
Agrostemma.	185		78
Agrostis.	13		156
Agyneia.	235		87
Aira.	16		202
Ajuga.	69		255
Aïzoon.	195	Andrachne. Andromeda.	97
Albuca.	Ž1		15
Alchimilla.	203	Andropogon.	

(251)

	(2.	<i>J</i> 1 <i>j</i>	
Androsace.	Page 57	AROIDEÆ.	Page 6
Andryala.		Artemisia.	112
Anemone.	146	Artocarpus.	240
Anethum.	139	Arum.	6
Angelica.		Arundo.	21
Anigozanthos.		Asarum.	45
Anona.		Asclepias.	93
Anonæ.	174	Ascyrum.	93
Anthemis.	124	ASPARAGINEÆ.	23
Anthericum.	29	Asparagus.	Ibid.
Antholiza.	38	Asperugo.	87.
Anthospermum.	134	Asperula.	152
Anthoxanthum.	, 10	Asphodelus.	50
Anthyllis.	215	Aspidium.	
Antidesma.	248	Asplenium.	2. 3
Antirrhinum.	78	Asprella.	18
Apargia.		Aster.	121
Aphyllantes.	25	Astragalus.	221
Apium.	139	Astrantia.	144
APOCYNEÆ.	92	Athamanta.	142
Apocynum.	Ibid.	Athanasia.	117
Aquilegia.	148	Atractylis.	108
Arachis.	. 215	Atragene.	145
Aralia.	158	Atraphaxis.	47
ARALIÆ.	Ibid.	Atriplex.	51
Arbutus.	97	ATRIPLICEÆ.	49
Arctium.	108	Atropa.	81
Arctotis.	130	Aucuba.	232
Ardisia.	248	Avena.	21
Arduinia.	93	Averrhoa.	229
Arenaria.	182	AURANTIA.	161
Aretia.	57	Axyris.	52
Argemone.	149	Ayenia.	175
Aristida.	14	Aylantus.	228
ARISTOLOCHIÆ.	42	Aytonia.	163
Aristolochia.	Ibid.	Azalea.	95
Aristotelia.	248	Azima	248
, , ,			
1	I	}	
4			
Baccharis.	114	Banksia.	45
Balanites.	161	Barleria.	45 61
Balanopteris.	248	Basella.	50
Balbisia.		Bauhinia.	211
Ballota.	73	Beckmannia.	12
Balsamita.	111	Befaria.	06
Baltimora.	127	Begonia.	2.48
Banisteria.	160	Bellis.	117

(252)

	,(20		
Bellium.	Page 119	Boronia.	Page 179
BERBERIDES.	175	Bosea.	49
Berberis.	Ibid.	Botrychium.	I
Beta.	50	Brassica.	151
Betonica.	72	Briza.	2 I
Betula.	244	Bromelia.	35
Bidens.	129	Bromus.,	18
Bignonia.	90	Broussonetia.	240
BIGNONIÆ.		Browallia.	79
Billardiera.	90 84	Brucea.	228
Biscutella.	154	Brunia.	232
Biserrula.	223	Brunnichia.	47 84
Bistropogon.	71	Brunsfelsia.	34
Bixa.	177	Bryonia.	237
Blackwellia.	207	Bubon.	140
Blakea.	199.	Bucida.	43 76
Blechnum.	3	Budleia.	76
Blitum.	52	Bufonia.	181
Bocconia.	150	Bulliarda.	187
Boebera.	120	Bunias.	157
Boerhaavia.	55	Bunium.	143
Boltonia.	121	Buphthalmum.	126
Bombax.	173	Buplevrum.	143
Bonplandia.	89	Bursera.	228
Bontia.	84	Butomus.	26
Boraginez.	84	Buxus.	235
Borago.	87	Byttneria.	173
Borbonia.	212	•	
•			
		C	
Cacalia.	115	Calycanthus.	207
Cachrys.	142	Calyptranthes.	198
CACTI.	191	Calyxymenia.	55
Cactus.	Ibid.		162
Cæsalpinia.	210	Cameraria.	92
Cakile.	157	Campanula.	98
Caladium.	6	CAMPANULACEÆ.	Ibid.
Calceolaria.	78	Camphorosma.	49
Calea.	117	•	98
Calendula.	119		39
Calla.	6		49 98 39 241
Callicarpa.	64	CANNÆ.	59 - 89
Callicoma.	190	Cantua.	
Calligonum.	48		157
Callistachys.	212		158
Callitriche.	5		76
Caltha.	140	~ *	
marie a consection	٠ (م		

(253)

	,		
Capsicum.	Page 83	Chelone.	Page 90
Cardamine.		Chenopodium	5 t
Cardiospermum.	158		182
Carduus.	107	0.1	135
Carex.	7	Chionanthus.	63
Carica:	250	Chironia.	gr
Carlina.	108		Ibid.
Carpesium.	112	Chloranthus.	248
Carpinus.		Chloris.	15
Carthamus.		Chondrilla.	101
Carum.		Chondrosum.	15
CARYOPHYLLEÆ.	180		212
Caryota.	22	Chrysanthemum.	118
Cassia.	209	~ .	115
Cassine.	230		
Castanea.	244		94
Casuarina.	2 44 2 46		190 225
Catabrosa.	16		106
Catananche.		Cicuta.	
Caucalis.		Cinara.	140
Ceanothus.		Cineraria.	107
Cecropia.		Cinna.	
Cedrela.	•	Circæa.	10
Celastrus,			196
Celosia.		Cissus.	163
Celsia.	53		177
Celtis.	79	Cistus.	1bid.
	24.2	Citharexylum.	65
Cenchrus.	15	Citrus.	162
Centaurea.	109	Claytonia.	193
Centunculus.	56		145
Cephalanthus.		Cleome.	157
Cephalophora.	116		76
Cerastium.	181	Clerodendrum.	64
Ceratonia.	209	Clethra.	97
Ceratophyllum.	5	Cliffortia.	203
Cerbera.	93	Clinopodium.	74
Cercis.	211	Clitoria.	220
Cercodia.	195		161
Cerinthe.	85		235
Cestrum.	84		154
Ceterach.	2	Cneorum.	228
Chærophyllum.	139	Cnicus.	106
Chamærops.	22	Cobœa.	89
Chamagrostis.	14	Coccoloba.	46
Chara.	5		155
Cheilanthes.		Coffea.	155
Cheiranthus.	152	Coïx.	22.
Chelidonium.	150	COLCHICACEÆ.	27

(254)

	(2	7	
Colchicum.	Page 27		Page 200
Colletia.	231	Cratæva.	158
Collinsonia.	68		103
Columnea.	78		84
Colutea.	221		34
Comarum.	204		142
Commelina.	26		1/12 38
COMMELINEÆ.	Ibid.	- -	214
Commersonia.	248	•	236
Comocladia.	228		179
Comptonia.	245		179
Condalia.	249		150
CONIFERÆ.	246		II
Conium.	143	_	185
Convallaria.	24		237
Convolvulace E.	88		Ibid.
Convolvulus.	Ibid.		Ibid.
Conyza.	114		140
Cookia.	161		159
Corchorus.	176		199
Cordia.	84	Cupressus.	246
Coreopsis.	127	Curcuma.	40 89 138
Coriandrum.	140		89
Coriaria.		Cussonia.	138
Coris.		Cyanella.	3 r
Corispermum.	52	CYCADEE.	4
Cornucopiæ.	II	Cycas.	Ibid.
Cornus.	137	Cyclamen.	58
Cornutia.	$6\overset{\circ}{4}$	Cydonia.	200
Coronilla.	225	Cymbidium.	41
Coronopus.	155	Cynanchum.	93
Correa.	179	Cynodon.	12
Corrigiola.	193	Cynoglossum.	87
Cortusa.	58	Cynosurus.	17
Corylus.	245	CYPEROIDEÆ.	7
Cosmos.		Cyperus.	10
Costus.		Cypripedium.	41
Cotula.	117	Cyrilla.	97
Cotyledon.	188	Cyrthantus.	97 54
Crambe.	157	Cytisus.	213
Crassula.	187		
	T		
	D		
Wh. 1°			
Dactylis.		Dalea.	215
Dahlia.		Dalechampia.	237
Dais.		Danthonia.	. 20
Dalbergia.	226	Dapline.	44

(255)

B775	(~	,	,
Datisca.	Page 241	DIPSACEÆ.	Page 130
Datura.	80	Dipsacus.	131
Davallia.	4	Dirca.	
Daucus.	143	Disandra.	44 60
Daviesia.	212	Disodium.	
Decumaria.	198		127
Delphinium.	148	Dodoothoon	7 7 58
Dentaria.	148		58
Dianella.	154		229
	23		219
Dianthus.	185	•/	
Diasia.	38		175
Dichondra.	85		120
Dictamnus.	179	Dorstenia.	240
Diervilla.	136	Draba.	155
Digitalis.	78	Dracæna.	23
Digitaria.	12	Dracocephalum.	75
Dillenia.	174	Dracontium.	
Dineba.	17	Drepania.	103
Dioscorea.	2.5	Drimmia.	
Diosma.	180	Drosera.	30
Diospyros.			158
Diotis.	94	Dryas.	205
10000	117	Duranta.	65
	. т	2	,
	· I	4	
TL		י אין דייני	
Ebenus.	215	Epidendrum.	42
Echeandia.	29	Epigæa.	97
Echinaria.	, 16	Epilobium.	196
Echinophora.	144	Epimedium.	175
Echinops.	III	Epipactis.	41
Echioides.	87	EQUISETACEÆ.	1
Echium.	86	Equisetum.	6
Eclypta.	126	Erianthus.	4 14 96 Ibid.
Ehretia.	84	Erica.	14
Ehrharta.	22	ERICÆ.	71.: 3
ELFAGNEÆ.	43		
Elæagnus.	Ibid.	Erinus.	121
Elæodendrum.	251		60
Elatine.	181	Eriocephalus.	119
Elephantopus.		Eriogonum.	49
Elousino	III	Eriophorum.	
Eleusine.	17	Eriospermum.	9 3 t
Elichrysum.	113	Erodium.	166
Ellisia.	85	Ervum.	225
Elymus.	17	Eryngium.	144
Embothrium.	45	Erysimum.	152
Empetrum.	98	Erythrina.	220
Encelia.	127	Erythronium.	27
Ephedra.	246	Erythroxylum.	160
24 9		W N	W 63 4V

(256	1
	200	1

			•		673	0
	Ethulia.	Page	III	Eupatorium.	Page	
	Eucalyptus.		198	Euphorbia.		233
	Euclea.		248	EUPHORBIACEA	i.	232
	Eucomis.		3 0	Euphoria.		159
	Eugenia.		198	Euphrasia.	1	6 _o
	Evolvulus.		89	Entaxia.		212
			229		đ	
	Evonymus.		229			
			F	1		
			T			
				Flooratio		176
	Faba.		225	Flacurtia.		III
	Fabricia.		197	Flaveria.		106
	Fagara.			FLOSCULOSE.		63
	Fagonia.		179	Fontanesia.		
	Fagus.		244	Forskalea.		240
	Fedia.		132	Fothergilla.		242
	Ferraria.		56	Fragaria.		204
	Ferula.		142	Frankenia.		186
	Festuca.		19	Fraxinus.	1	62
	FICOIDEÆ.		193	Fritillaria.		27
	Ficus.		239	Fuchsia.		197
gave t	Filago.		113	Fumaria.		150
	FILICES.		r			
	rilices.			,	•	
			(T		
				,		- 1
	Galanthus.		35	Geum.		204
	Galardia.		129	Ginkgo.		249
			58 38	Githago.		185
	Galaxia.		223	Gladiolus.		38
	Galega.		49	Glaux.		199
	Galenia.		-	Glecoma.		72
	Galeobdolon.		J2 Ibid.	Gleditsia.		209
	Galeopsis.			Glinus.		195
	Galinsoga.		129	Globba.		59
	Galium.	0	133			58
	Gardenia.		134			220
	Garidella.		148	Glycine.		225
	Gastridium.		13	Glycyrrhiza.	1	113
	Gaultheria.		97	Gnaphalium.		
	Gaura.		196	Gnidia.		44
	Genista.		212	Gomphrena.		53
	Gentiana.		19	Goodenia.		100
	GENTIANEÆ.		Ibid.	Goodia.		214.
	Geoffrea.		226	Gordonia.		173
	GERANIA.		164	Gorteria.		120
	OLIKATIA.		CC	0	*	7 50 1

Gorteria. Gossypium. Gouania.

GRAMINE E.

172 | 232 |

10

164 166

105

99

Geranium.

Geropogon. Gesneria.

(257)

	(2	207)	
Grangea.	Page 112	Guettarda.'	Page 135
Gratiola.	79	0 '1 1'	210
Grewia.	176		161
Grindelia.	120		209
Gronovia.	237		111
GUAIACANÆ.	94	Gypsophila.	182
GUAIACUM.	179		160
Guazuma.	175		
•			
1	•	H	
Hæmanthus.	33	Hippocrepis.	225
Hæmatoxylum.	210	Hippophae.	
Hakea.	45	Hippuris.	43
Halesia.	95		210
Halleria.		Holcus.	15
Hamamelis.	175	Holosteum.	180
Hamellia.		Homalium.	207
Hebenstreitia.	66	Hopea.	95
Hedera.		Hordeum.	18
Hedychium.	40	Horminum.	75
Hedysarum.		Hornemannia.	78
Helenium.	119		190
Helianthemum.	177	Hottonia.	57
Helianthus.	128	Houstonia.	134
Helicteres.	59	Humea.	111
Holiocommo	175	Humulus.	241
Heliocarpus. Heliophila.		Hura.	237
Heliotropium.	152	Hyacinthus.	30
Helleborus.	85	Hydrangea.	190
Helmintia.	148	Hydrocharider.	42
Helonias.	104	Hydrocharis.	Ibid.
Hemerocallis.	27	Hydrocotyle.	144
Hemitomus.		Hydroglossum. Hydrophyllum,	I
Heracleum.	79 141	Hymenea.	85
Hermannia.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Hyosciamus.	211
Hernandia.	46	Hyoseris.	- 80
Herniaria.	54	Hypecoum.	103
Hesperis.	, 152	HYPERICA.	150
Heterosperma.	129	Hypericum.	160
Heuchera.	189	Hypochæris.	160
Hibiscus.	171	Hypoxis.	105 35
Hieracium.	102	Hyptis.	
Hippia.		Hyssopus.	72
Hippocratea.	160	1.	70
			n

1 .

1

	-		
Jambolifera.	Page 174	Iresine	Page 55
Jasione.		IRIDEÆ.	1 uze 37
JASMINEÆ.		Iris.	Ibid.
Jasminum.		Isatis.	157
Jatropha.		Isnardia.	
Iberis.	156	Isopyrum.	199 148
Ilex.	230	Itea.	96
Illecebrum.		Iva.	241
Illicium.		Juglans.	229
Impatiens.		Junceæ.	25
Imperatoria.		Juncus.	Ibid.
Indigofera.	223	Juniperus.	246
Inga.	200	Jussiæa.	196
Înula.	120	Justicia.	6t
Ionidium.		Ixia.	57
Ipomœa.	88		135
		22202	130
\	•	ar as	
=.		K	*
		1	
Kæmpferia.	40	Kirganolia	235
Kalankoe.		Kirganelia. Kitaibelia.	168
Kalmia.		Knautia.	132
Kiggellaria.		Koelreuteria.	158
Killingia.	10	Kuhnia.	116
2211111161111	10	ixumma.	110
		l	
•		P.	
LABIATE.	66	Laserpitium.	141
Lachenalia.	31	Lasiopetalum.	232
Lachnea.	44	Latania.	23
Lactuca.		Lathræa.	61
Lagasca.	111	Lathyrus.	223
Lagerstromia.		Lavandula.	70
Lagoecia.		Lavatera.	169
Lagunea.	•	LAURINEÆ.	46
Lagurus.		Laurus.	Ibid.
Lamarkia.	•	Lawsonia.	
Lamium.	,	Ledum.	199
Lampsana.		Leersia.	93
Lantana.		LEGUMINOSÆ.	207
Larix.		Lemna.	5
Larrea.	179	Leonurus.	73
	• 19		

(259)

*	(-	259)	
Lepidium.		Lobelia.	enigrag
Leptospermum.	197	F 3.4	Page 99
Lessertia.	22.1	Lomandra.	25
Leucoium.	35	Lonicera.	
Leuzea.	108	Lopezia.	136
Liatris.	115	Lotus.	195
Ligusticum.		Loureira.	218
Ligustrum.	64		236
LILIACEÆ.	27	_ 4	13
Lilium.		Lunaria.	196
Limodorum.		Lupinus.	154
Limonia.	162	Luzula.	214
Limosella.		Lychnis.	25
Linaria.		Lycium.	185
Lindernia.	77		83
Linnæa.	79 136	Lycopersicum.	81
Linum.	186	Lycopsis.	8 ₇ 66
Liquidambar.	245	Lycopus.	66
Liriodendrum.		Lygeum.	22
Lithospermum.	174	Lysimachia.	5 ₇ 56
Littorella.	55	Lysimachie.	56
	33	Lythrum.	199
	_	-	
	N	\mathbf{I}	
Madia.	* * 0	Madail	
Magnolia.	119	Medeola.	23
MAGNOLIÆ.	174	Medicago.	217
Mahernia.	Ibid.	Melaleuca.	197
Maianthemum.	176	Melampodium.	127
Malachra.	24.	Melampyrum.	60
Malaxis.	170	Melastoma.	199
Malope.	41	Melastomæ.	Ibid.
Malpighia.	168	Melia.	163
MALPIGHIACEÆ.	160	Meliaceæ.	Ibid.
Malva.	Ibid.	Melianthus.	180
MALVACEÆ.	169	Melica.	16
Malvaviscus.		Melilotus.	216
Malus.		Melissa.	. 74
Mammea.		Melittis.	75
maininea.	-6:-		
		Melochia.	*
Mangifera.	227	Melotria.	172 237
Mangifera. Manulea.	60 60	Melotria. Menisperma.	172 257
Mangifera.	227 60 40	Melotria.	172

Mentzelia.

Menziezia.

Menyanthes. Mercurialis.

7 I

197 96

58

232

4

90 30

117

Marsilea.

Martynia. Massonia.

Matricaria.

(260)

Merendera.	Page 27	Momordica.	Page 257				
Mesembryanthemum.	193		66				
Mespilus.	201	Monotropa.	248				
Messerschmidia.	85	Monsonia.	167				
Methonica.	27	Montia.	193				
Metrosideros.	197	Moræa.	37				
Michauxia.	98	Morina.	130				
Micropus.	113	Moringa.	210				
Milium.	13	Morus.	240				
Milleria.	. 119	Murraya.	162				
Mimosa.	209	The art	59				
Mimulus.	V	71. /1"	Ibid.				
Minuartia.	79		30				
Mirabilis.	55						
Mitchella.	135	Myagrum.	157				
Mitella.		Myosotis.	87				
	190	Myosurus.	147				
Mœrenghia.		Myrica.	245				
Mogorium. Molinia.	63	Myriophyllum.	195				
	16	Myrsine.	94				
Mollugo.	180	Myrti.	197				
Molucella.	74	Myrtus.	198				
NAIADES. Naias. Nandina.	5 Ibid. 175	Nerium. Nicandra. Nicotiana.	92 81 80				
Napæa.	170	Nigella.	148				
NARCISSEÆ.	33		195				
Narcissus.	Ibid.	Nolana.	87				
Nardus.	22	Notelæa.	65				
Narthecium.	27	NYCTAGINE E.	55				
Nemesia.	78	Nymphæa.	42				
Neottia.	41	Nyssa.	43				
Nepeta.	70	U	8.				
•	ð						
O							
Ocymum:	75	Onopordon.	T (0, F9'				
OEdera.	111	Onosma.	86				
OEnanthe.							
OEnothera.	140	Opercularia.	135				
Olea.	196		I				
Onagræ.	63	Ophrys.	41				
Onagra.	195	Ophyoxylum.	93				
Ononis.	3	ORCHIDEÆ.	40 Thi A				
OHOIII3.	214	Orehis.	Ibid.				

,	(2	61)		
Origanum.	•	•	n	
Ornithogalum.	Page 74 31	Osmunda.	Page 2	
Ornithopus.	225	Osteospermum.	119	equalifying
Orobanche.	60	Osyris. Othonna.	43	
Orobus.		Oxalis.	124	
Orontium.	224		167	
Ortegia.	7	Oxylobium. Oxytropis.	212	
Oryza.	22	Oxyttopis.	221	
J	على لايا			
	_			
		P		
			,	
Pæderia.	135	Perilla.		
Pæonia.			70	
Palavia.	149 168	Periploca.	92	
Paliurus.	231	Peronia.	40	
Pallasia.		Persoonia.	46	
PALMÆ.	49	Petiveria.	49	
Panax.	22 138	Peucedanum.	142	
Pancratium.	35	Phaca.	221	
Pandanus.		Phalangium. Phalaris.	29	
Panicum.	249		11	
Papaver.		Pharnaceum. Phaseolus.	181	
PAPAVERACEÆ.	149 I bid.	Phellandrium.	219	
Parietaria.	2 40	Philadelphus.	140	
Paris.	25	Phillyrea.	199	
Parkinsonia.	209	Philyca.	252	
Parnassia.	158	Phleum.		
Paronychia.	53	Phlomis.	11	
Parthenium.		Phlox.	73	
Paschalia.	129	Phœnix.	89	
Paspalum.	12	Phormium.	3 ₁	
Passerina.	44	Phyllanthus.	234	
PASSIFLORÆ.	238	Phyllis.	154	
Passiflora.	Ibid.	Physalis.	81	
Pastinaca.	139	Phyteuma.	99	
Paullinia.	158	Phytolacca.	49	
Pavonia.	170	Picridium.	105	
Pectis.	119	Picris.	104	
PEDICULARES.		Pilularia.	4.	
Pedicularis.	6o	Pimpinella.	138	
Peganum.	179	Pinguicula.	58	
Pelargonium.	164	Pinkneia.	134	
Penicillaria.	14	Pinus.	247	njin
Pentapetes.	173	Piper.	241	
Penstemon.	90	Piqueria.	116	
Penthorum.	189	Piscidia.	220	
Peplis.	199	Pisonia.	55	

Pistacia.	Page 228	Pomaderris.	Page 251
Pisum.		Pontederia.	38
Pitcairnia.	28		243
Pittosporum.	251	^	
Planera.		Portesia.	179 163
PLANTAGINEÆ.		Portulaca.	192
Plantago.		Portulacaria.	193
Plalanus.		PORTULACEÆ.	102
Platilobium.	212	The same of the sa	19 2
Plectrantus.		Potentilla.	203
Plocama.		Poterium.	202
PLUMBAGINEÆ.		Pothos.	
Plumbago.		Prasium.	76
Plumiera.		Prenanthes.	_
Poa.		Primula.	101
Podalyria.		Prinos.	57
Podocarpus.		Priva.	230
Podophyllum.			65
Pogonia.	149		195
Poinciana.		Protea.	45
		PROTEACEÆ.	Ibid.
Polemoniaceæ.		Prunella.	76
Polemonium.		Prunus.	205
Polianthes.		Psidium.	198
Pollichia.	•	Psoralea.	215
Polycarpea.	180	Psychotria.	155
Polycarpon.	Ibid.	Ptelea.	229
Polycnemum.	49	Pteranthus.	49
Polygala.	58	Pteris.	3
Polygonatum.	24	Pterocarpus.	227
POLYGONEÆ.	46	Pulmonaria.	86
Polygonum.	47	Punica.	198
Polymnia.	127	Pyrola.	97
Polypodium.	2	Pyrus.	200
Polypogon.	14		
	_		
	(`	
	(2	
Quercus.	244	Queria	180
•			
	T		
	·	i	
		•	
RADIATÆ.	117	RANUNCULACEÆ.	145
Rafnia.	214	Ranunculus.	1 43
Rajania.	24	Raphanus.	150
Ramonda.	So	Rayenala.	59
Randia.	154	Rauvolfia.	J9
A COLUMN CATERO		ready offices	93

(263)

		25		
	Reaumuria.	Page 193	Robinia.	Page 220
	Reseda.	158	Rondeletia.	134
	Rhagadiolus.	100	Rosa.	201
	RHAMNOIDEÆ.	220	Rosacex.	199
	Rhamnus.		Rosmarinus.	67
	Rhapis.		Rottbollia.	16
	Rheum.	48		
	Rhinanthus.	6 0	Rubentia.	95 230
	RHIZOSPERMÆ.	4	Rubia.	154
	RHODODENDRA.	95	RUBIACEÆ.	132
	Rhododendrum.	Ibid.	Rubus.	205
	Rhodora.		Rudbeckia.	128
	Rhus.		Ruellia.	6r
	Ribes.		Rumex.	
	Ricinus.	255	Ruppia.	47
	Ricotia.	154	Ruscus.	24
	Rindera.	87	Ruta.	179
	Rivina	49	RUTACEÆ.	Ibid.
,		49	ACO LILGENIN	20100
	,			
		S	3	
	Sabal.	22	Satureia.	P7.03
	-Saccharum.	14	Saururus.	70 5
	Sagina.	181	Saxifraga.	189
	Sagittaria.	26	SAXIFRAGÆ.	Ibid.
	SALICARIÆ.		Scabiosa.	151
	Salicornia.	199 52	Scandix.	140
	Salix.		Scheuchzeria.	26
	Salsola.		Schinus.	228
	Salvia.		Schizandra.	175
	Sambucus.	157	Schkuhria.	120
	Samolus.	58	Scheenus.	
	Samyda.		Schrankia.	209
	Sanguinaria.	149	Scilla.	3r
	Sanguisorba.	202	Scirpus.	
	Sanicula.	144	Scleranthus.	195
	Sanseveria.	28	Sclerocarpus.	193
	Santolina.	117	Scolopendrium	14/
	Sanvitalia.	128	Scolymus.	106
	SAPINDI.	158	Scoparia.	76
	Sapindus.	Ibid.	Scorpiurus.	225
	Sapium.	-	Scorzonera.	
	Saponaria.		Schottia.	104
	SAPOTÆ.	94	Scrophularia.	200
	Saracha.	94	Con a priving los	76 n:1

Schottia.
Scrophularia.
Scrophulariæ.

Scutellaria.

Secale.

94 81

91 248

Saracha. Sarothra.

Sarracenia.

75 18

76
Ibid.

(264)

	(2	64)	
Securidaça.	Page 227	Solidago.	7
Securinega.	235	Sonchus.	Page 122
Sedum.	188	Sophora.	101
Selago.	66	Sorbus.	211
Selinum.			200
Semiflosculosæ.	100	Sorghum.	Ĭ 4.
SEMPERVIVÆ.	187	Spaendoncea.	210
Sempervivum.	189	Sparganium.	7
Senebiera.	N 0	Spartina.	16
Sanecio.		Spartium.	213
Serapias.		Spergula.	181
Serjania.	41	Spermacoce.	134
Seriola.	100	Sphæranthus.	III
Serissa.	105	Sphærolobium.	212
Serratula.	135	Spielmannia.	65
Sesamum.	108	_1 0	92
Seseli.	90	Spilanthus.	92 150
Sesleria.	159	Spinacia.	50
	17	Spiræa.	205
Sesuvium.	195	Spondias.	228
Sherardia.	132	Stachys.	72
Sibbaldia.	203	Stachytarpheta.	65
Sibthorpia.	<u>6</u> 0	Stæhelina.	108
Sicyos.	237	Stapelia.	92
Sida.	170	Staphylea.	229
Sideritis.	71	Statice.	56
Sideroxylum.	94	Stellaria.	182
Sigosbeckia.	126	Stellera.	44
Silene.	184	Sterculia.	173
Silphium.	127	Stevia.	116
Sinapis.	151	Stipa.	14
Sison.	140	Stratiotes.	42
Sisymbrium.	155	Strelitzia.	42 59 44 173
Sisyrinchium.	36	Struthiola.	44
Sium.	141	Stuartia.	173
Smilacina.	24	Styphelia.	98
Smilax.	Ibid.	Styrax.	95
Smyrnium.	139	Swertia.	
Solandra.	81	Swietenia.	163
SOLANEÆ.		Symphoricarpos.	136
Solanum.	79 82	Symphitum	86
Soldanella.	58	Syringa.	62
		J 0 11	Ų ži
		•	

T

Tabernæmontana.	92	Tamarindus.	200
Tageles.	120	Tamarix.	195
Talinum.	192	Tamnus.	25

(265)

		(20	5)	
Tanacetum.	Page	112	Tradescantia.	Page 26
Taraxacum.	O	104	Tragia.	236
Tarchonanthus.		117	Tragopogon.	105
Taxus.		246	Tragus.	15
Telephium.		195	Trapa.	195
TEREBINTHACEÆ.		227	Trianthema.	193
Terminalia.		43	Tribulus.	
Ternstromia.		162	Trichilia.	179
Tetragonia.		105	Trichodium.	15
Teucrium.		69	Trichosanthes.	238
Thalictrum.		145	Trientalis.	57
Thapsia.		139	Trifolium.	216
Thea.			Triglochin.	26
Theligonum.		241	7 17 4	218
Theophrasta.		03	Triguera.	80
Thesium.		43	Trillium.	25
Thlaspi.		156	Triopteris.	160
Thuya.		247	717 4	136
Thymbra.		74	FR9 1 3 1	48
THYMELEÆ.		44		i 5
Thymus.		74		18
Tiarella.		190	CT2 1	28
Tigridia.		36		176
Tilia.			Trollius.	148
TILIACEÆ.		175		167
Tillæa.		187	Tulipa.	27
Tillandsia.		35	Turnera.	192
Tordylium.		143	Turritis.	15 1
Tormentilla.		205		114
Tournefortia.		85	Typha.	7
Trachelium.		99	Турнж.	7
A COLLOS OF STATE		33		
		т	· *	
		ı	J	,
- Uiex.		212	Urtica.	240
Ulmus.		242	URTICEÆ.	239
Umbelliferæ.		138		78
Uniola.		21	Utricularia.	58
Urena.		170	Uyularia.	27
Urospermum.		105		
*				
	1	2	V	
			1	
76. T	,		W-11'	e
Vaccinium.		97.	Vallisneria.	42
Valantia.		134		42
VALERIANEÆ		132		85
Valeriana.		Ibid.	Velezia.	186

	(2	00)	
Vella:	Page 157	Viminaria.	7)
Veltheimia.	28		Page 212
Veratrum.	27	Mark nor a	92
Verbascum.	79	NOTE A COLUMN TO A	178
Verbena.	66	Viscum.	211
Verbesina.	130	Visnea.	136
Vernonia.		VITES.	95
Veronica.		Vitex.	163
Viburnum.	136	VITICEÆ.	64
Vicia.		Vitis.	64
Vieusseuxia.	57		163
Villarsia.		V Olkalifellas	64
	91		
	77.7	T7	-
	${f V}$	V	
57 76 77 N N			
Wachendorfia.	38	Westeringia.	6m
Waldsteinia.	202	Winterania.	67 163
Waltheria.	175	Woodwardia.	3
	,		3
9	X		
	23	.	
Xanthium.		75 T A	
		Ximenesia.	127
Xeranthemum.	113	Xylophylla.	235
			1
*	Y	•	•
	_		
Yucca.	28		
	20		
	F7		
	Z	,	
No.			
Zacintha.	104	Zea.	0.00
Zamia.	-	Zinnia.	22
Zanichellia.		Ziziphora.	129
Zanthorhiza.	149	Ziziphus.	66
Zanthoxylum.	228	Zoegea.	251
Zappania.		Zygophyllum.	109
A A	90	-18 ohn mann.	179

to form burnance. The words when the second of the second

1 2 1 5

Litte der Senser qui ne donn pas Compris dans at om Celtairie polata. - Cidentitaciói. - Sago 258. Vel Joliffia africana. Dejundium etaopamum - rigaminaja. - 226. Computer Cocciner. - Verbenacier. - 66. Leonoti, mauritiana. - rabico. - 76. Muxia Vertici Yata. - Aubintico. - 139. Scuphulain on Duthunger. - + Oryaphi Uum Calicinum. - Crimalica. - 188. Zornia Itroballifera. - regummensev. -226. Custis glabra. - lerebinthacico. - 228. Ocmaria Cylindrica, vd wither. _ with cur. - 240. Hunrodium John av. - Longino, -1. Gusvina hitemphylla. - Japindacie. - 158. hyptigetitraptera. - samestericas. - 160. munanda artubata. - Aubiacia. - 135. Szanguria, borbonica. - Combritació. - 207. Stricta macrophylla. - Lieben. -1. borddalia immis. - Tembrithaci. - 22g. vd Jeopolia. Glychena burmane. - Tongino. - 4. Summerayus ana carrium. - Terribinthacie. - 227. Statmania didero xylund, - Sapindacio. - 15g. Ewchettatiflow. - Outheriacia. - 173. Cynthon arbona. - dougens. -1. Liplarium bulbifumm. Ideno. - 1. Entetia amantida. - 0 mitidico. - 162. area alba. - Salmino. - iz. tritonia longifloro. - Indico. - 37. agatophyllumarometicum. - Lanzinev. - 46. melania verticillata. _ Andricios. - +36. melvacio en c'aducióncio - 173.
Danais France. - 30m. - 130 Danais tryuno. - 30 eno. - 135. mouine untitolore. - id. -135. Suttificación Suttifica. - 161. Laumania huniptera. - Longiero. -1. rythrospernum elepticum. - Theouthanico. - 176. matherum manricatum, - Graminec. - 15.

loda Variano. - Campanulacio. - 99. Strychnos vontac. - apocynico. - 93. Inxiahotrophyla. - Guttifine. - 161. vivua Coccinea. - Combritacie. - 207. enecylon angulatum - mystacie on hulastomice. - 198. Entrophium borianum, - Lougirco, -1. Inckinovata. - avsicie, - 207. Noiro lackwillia. Chazalin pry cotrioi de. _ Mubincici. - 139. ryptostigia grandiflora, -apo cymico, - 90. Vangueria Dulis. - Aubircial. - 139. y norchis latifolia. - 6 reproceso. -41. ing neum etatum. - Den. - 41. France Vanco. - 1. Rusborn amplitation, Nel mithridathoen. - lettered. - 240. Savonga pamientata. Sypericineco. - 161. Patom'en on saningtom's presion. - my stacies. - 199. enthichteria citiatio. - Suminico. -21. Gica Distidoa. - hyphoster. - 236. l'phomen's lingoun. - Unto caco. -135. bectone grandis. - grittiliso. - 64. Jenacia undulata. - Mammoi Oco. - 201. Salaxis abiertia. - Drugirco. -98. mounce. -1. Una. y cop od inn poblegman a. - iden. - 1. alpinia untano. - 40. Balisier. - 40. Thumbuyia elata. - a conther. - 61 er 27 4 Suppliments. my etante arbor tritio. - Jasminice. - 63. Trichosterna manritima. - Labice. - 75. Minusopes elengi. - Sapotillier. - gh. O untruphe mauritiana. - Capindacial. - 15g. hrelicocça diversitatia. - Demo. - 15g. sephrosia purpurer. - eguminenser. - 223. vart Saliga. dupotum obje. - Dem. - 226. voir hedy drum. Mark vd Olychinomans. - id. - 226. Bolmskiddia Sangainea. - 227 Viliano. - 64.

truthern launtolia. - Laurinew. - 46. hillia grazum wolfa. - Outheriacie. - 173. y hitatomutosa. - lignuminum w. - 21g. deaumentin grandiflora. _apocymen. - g3. Coevola plumica. - 201 chico. -100. hidia javamica. - Suttifico. - 161. arcinin alchica. _ Wern. _ 161. nyristica moschata. - Lauriner on my notacico. - 46. Coronea Chartreia. - Olinew. - 63. atuna elastica. - aselyindin. - 93. chylachium panduritoruis. - Capparidice. - 158. anarum Commune. - Einbirthacia. - 228. heobroma Cacao. - Wantraccieron but min acce. - 173. ansærinn prinatum. - 6 ignonia Cero. - 91. ary ophythus mounts one, vel Engaria Caryovhy Unta. - Caryophillie. - 180 anghima venent ha, vet Cubuatanghim. - avog new. - 93. lamegiatrichetten, vel slemingintymenia-ligumineuron-226 er 26 g Jung ocos uncifera'. - Julinine. - 22. jusposin populace, vel sibison, populace. _ Malvace. _ 172. alystegia igium. - Convolvulación. - 88. Pilotum triquetrum et Donhadia Vichotoma. - ny copodia cial. - 1. Inonahameta. - anonacie. - 174. - uncinata. - 160. - - 16. mich dia Champaca. _ hragnotiav. _ i. andina. - hyrning - ghet 248.



MALVAVISCUS mollis. ACHANIA mollis H. K. Manulea alternifolia, p. 60. Buchnera fœtida Jacq. H. sch. Melaleuca chlorantha Bonpl. malm.

Melochia varroniæfolia. Mespilus carolina encycl. celsiana Dum. cours. suppl.

elliptica Bosc. eriocarpa Dec. syn. tomentosa willd. sp. J

fissa Bosc.

flabellata Bosc.

flavescens Bosc.

heterophylla Flugge, Ann.

lobata Bosc.

lucida Dum. cours. Bot. cult.

nigra willd. sp.

obovata Bosc.

odorata Andr. Rep.

oliveriana Dum. cours. B. cult.

orientalis Bosc.

parvifolia. cratægus parvifolia willd.sp.) pectinata pum. cours. Bot. cult.

prunellifolia Bosc.

purpurea Bosc.

quinqueloba Bosc.

trifoliata Bosc.

Metrosyderos crassifolia dum.

cours. suppl. citrina.

MIRABILIS hybrida willd. Enum.

Morus tartarica L.

Narcissus polyanthos pelongch.

sav. Eir.

subalbidus nelongch. sav. Etr.

NAUENBURGIA trinervata willd.sp. BROTERA contrayerva schrad.

Journal.

NICOTIANA humilis.

OCHROMA lagopus willd. sp.

OENOTHERA salicifolia.

OLEA exasperata Jacq. H. Sch.

ORNITHOPUS lotoides viviani,

Fragm.

OSMUNDA struthiopteris L.

STRUTHIOPTERIS germanica willd.

MALVAVISCUS velouté. s. ch. 9

MELALEUCA à fleurs blanches. N. Holl. or. 19

Mélocнia à f. de varronia.s.ch. у

highis de Caroline. 19

de Cels. orient. 5 elliptique. Am. s, h

à fruit velu. F. h

incisée. Am. s. 9

en évantail. 19 jaunatre. b

à seuilles variables. 5

lobée. Am. s. 5

luisante. Am. s. 5

à fruit noir. sibérie. 9

ovale-renversée. 5

odorante.

d'olivier. perse. h

d'Orient, b

à petites f. pinchaw. Am. s. b

pectinée. orienf." 5

à feuill. de prunellier. Am. s. 1)

pourpre. 19

à cinq lobes. Am. s. b

trifoliée. orient. h

MÉTROSY DÉROS à feuill. épaisses.

N. Holl. or. b

à fleurs pâles. N. Holl. or. 1)

MIRABILIS hybride. W

Murier de Tartarie. 5

Narcisse à fleurs nombreuses. F. W

blanchâtre. F. h

NAVENBURGIA à trois nervures.

Am. m. O

NICOTIANE petite. O

OCHROMA lagopus. Antilles. s. ch. 5 ONAGRE à feuilles de saule. &

OLIVIER tuberculeux. cap. or. 1)

ORNITHOPUS à feuilles de Lotier. ıtalie. O

OSMONDE d'Allemagne. Te

PACHYSANDRA procumbens mich. PACHYSANDRA à tige tombante. PANCRATIUM parvislorum. Paullinia caracasana Jacq. H. sch. cauliflora Jacq. 1c. Peucedanum petroselinum. PHYLLANTHUS ellipticus. ovatus. Pinus Tournefortii. Pittosporum sinense, p. 231. Pittosporum viridiflorum Bot. magaz. Pickis sprengeriana, p. 10/1. Picris pauciflora willd. sp. Poa cristata L. p. 20. Koeleria cristata pers. syn. (Pogostemon plectranthoides pesf. Mém. du mus. Populus tremuloides mich. Arbr. Pothos digitata Jacq. Ic. lanceolata L. Prenanthes hispida, p. 101, chondrillæ species. Prinos ambiguus mich. Fl. lanceolatus. longifolius. prunifolius. Prunus acuminata mich. Fl. chicasa mich. Fl. pensylvanica willd. sp. 1 borealis mich. Arbr. pendula. sphærocarpa mich. Fl. susquihana Dum. cours. suppl. PTEROSPERMUM acerifolium cav. Diss. PULMONARIA mollis schrad. Dec. PULTENZA daphnoides smith, soc. Pyrus michauxii Bosc. Dict. Quercus Banisteri mich. Arbr. prinus monticola mich. Arbr. RHAMNUS latifolius l'Her. sert. RHODODENDRUM azaloides.

catesbæum Dum. cours. suppl. Rhus elegans H. K. Ribes palmatum. Rosa corymbosa Bosc. Dict. damascena willd. spec.

Am. s. 72 PANCRATIUM à petites fleurs. L PAULLINIA de Caracas. s. ch. 5 cauliflore. caracas. s. ch. 5 PEUCÉDANUM à feuill, de persil. L PHYLLANTHUS à f. elliptiq. s. ch. 5 à feuilles ovales. s. ch. 5 PIN de Tournefort. Asie. b

Pogostémon à feuilles de Plectranthus. s. ch. 5 (labiées). PEUPLIER, faux Tremble. Am. s. 5 Porнos digité. caracas. s. ch. 72 lancéolé. вarbade. s. ch. и

Prinos de Caroline. 5 lancéolé. 19 à longues feuilles. 5 à feuilles de Prunier. 5 PRUNIER acuminé. Am. s. 5 chicasaw. caroline. 19 de Pensylvanie. 5 pendant. 5 à fruit rond. Am. s. h susquihana. Am. s. 5

PTÉROSPERME à feuilles d'Érable. inde. s. ch. 5

PULMONAIRE veloutée. Allem. 5

PULTENÆA à feuilles de Daphné. N. Holl. or. b Poirier de Michaux. Am. s. 19 CHÉNE de Banister. Am. s. 19 prinus de montagnes. Am. s. 19 NERPRUN à larges feuill. Açores. 5 RHODODENDRUM à feuilles d'Azaléa. 5 (an species hybrida). de Catesby. Am. s. b SUMAC élégant. Am. s. 19 GROSEILLIER à feuilles palmées. 5 Rosier corymbifère.

de Damas. F. D

evratina Bosc. Dict. montana vill. Delph. pensylvanica mich. Fl. pimpinellifolia. rubrispina Bosc. Dict. sulphurea minor. trifoliata Bosc. Dict. turgida Pers. syn.) rapa Bosc. Dict.

d'Evrath. caroline. 5 de montagne. Alpes. 5 de Pensylvanie. 5 à feuill. de Pimprenelle. F. D à épines rouges. Am. s. > jaune petit. h trifolié. chine. 5 turneps. Écosse. b

Santolina pinnata viviani, Fragm. distincta species a S. eriophora,

p. 117. SARACHA procumbens. ATROPA procumbens cav. Ic. 5 Saxifraga ajugæfolia L.

SARACHA à tiges tombantes. Mexique. O SAXIFRAGE à feuilles d'Ajuga. Pyrénées. Z

aquatica Lapeyr. Fl. Pyren. petræa gouan. Ill. ascendens willd. sp. aretioides Lapeyr. Fl. Pyren. groelandica L. luteo-purpurea Lapeyr. Fl. pyren. nervosa Lapeyr. Fl. Pyren.

aquatique. Pyrénées. T

ranunculoides.

arétioïde. pyrénées. Z du Groëland. pyrénées. Z jaune-pourpre. pyrénées. #

Scutellaria orientalis L. SALIX acutifolia willd. sp.)

à nervures. pyrénées. L. à seuilles de renoncule. T Scutellaire d'Orient. or. W

violacea Andr. Rep. aquatica smith, Fl. aurita smith, Fl. bicolor willd. sp. caroliniana mich. Fl. nigra willd. sp. cinerea L. discolor willd. sp.

SAULE violet. 5 aquatique. F. b auriculé. F. 5 bicolor. Allem. 5

forbyana willd. sp. lambertiana smith, Fl. malifolia willd. sp.

de Caroline. 5 cendré. F. b

phylicifolia L. prunifolia smith, Fl. repens smith, Fl.

de deux couleurs. Am. s. 5 Forbyana. Angleterre. 9 de Lambert. Angleterre. 5 à feuill. de Pommier. Angl. 19 à feuilles de Phylica. 5 à feuilles de Prunier. Écosse. 5 rampant. F. h

russeliana willd. sp. sphacelata willd. sp. spathulata willd. sp. de Russel. F. 5 sphacélé. F. h en spatule. F. h

starkeana willd. sp. undulata willd. sp. SALVIA clusii Jacq. H. sch.

de Starke. silésie. 5 ondulé. Allem. 19 SAUGE de l'Ecluse. orient. or. 19

forskalæi L. Mant.

de Forskal. orient. Z SIDA crépu. Antilles. O faux Abutilon. O

Sida crispa L. pseudo-Abutilon. pulchella willd. Enum.

élégant. N. Holl. or. 19

Sisymbrium erysimifolium, p. 153, deleatur syn. Sisymbrium allioni Pers. syn. Sonchus acuminatus willd. sp. LAITRON à f. pointues. Am. s. O pinnatifidus. pinnafide MADERE? or. 5 virgatus. effilé. Am. s. 🔾 prænanthes virgata mich. Fl. Spiræa acutifolia willd. Enum. SPIRÆA à feuilles aiguës. 5 alpina willd. sp. lancéolé. Russie. 5 oblongifolia wald. et kitt. à feuill. oblongues. Hongrie. 19 ulmifolia willd. sp. à feuill. d'orme. carniole. 3 Stevia laxiflora Dec. Mss. STÉVIA à fl. lâches. mexique. or. ¥ ovata willd. sp. à feuill. ovales. mexique. or. 华 THALICTRUM rugosum, p. 146, dele, et Th. vaginatum subjice. THUYA australis. Bosc. THUYA des terres australes. or. 5 inæqualis. à écailles inégales. 19 THUNBERGIA fragrans willd. sp. 61. THUNBERGIA odorant. inde.s.ch. 13 Tilia rubra pec. cat. Tilleul rouge. f. h mississipiensis Bosc. Dict. du Misissipi. 5 Tordylium sulcatum. Tordylium sillonné. ¥ Trifolium suaveolens willd. H. Ber. TRÈFLE odorant. Perse. O ULMUS viscosa. ORME visqueux. Am. s. 5 striata Bosc. Dict. strié. Am. s.? h VACCINIUM arboreum mich. Fl. Myrtille arborescent. am. s. 19 arctostaphylos Andr. Rep. d'Orient. 19 frondosum L. feuillu. Am. s. h glaucum mich. Fl. glauque. Am. s. h ligustrinum L. à feuilles de troëne. Am. s. p myrsinites mich. Fl. myrtoide. Am. s. h nigrum. à fruit noir. 5 nitidum Andr. Rep. luisant. Am. s. h resinosum mich. Fl. résineux. Am. s. h VIBURNUM acuminatum. VIORNE acuminée. Am. s. 5 edule mich. Fl. comestible. Am. s. h ERVUM gracile Dec. suppl. LENTILLE grêle. F. m. O Vicia gracilis Lois. Fl. VICIA serratifolia Jacq. Austr. VESCE à feuill. en scie. Autriche. Viola pedata. L. VIOLETTE digitée. Am. s. Z Yucca boscii Hort. paris. quæ floruit in horto dicto Litta juxta Milanum, est genus novum Agave affine. Balbis in litteris. and in the continues and including at any of a section consisted 226. FIN. entry de transmission of the second of

H. N. extends to the state of t

and the contract of

Taken of the grand of the test of the state of the state

Let docked with a met . 158.

SUPPLÉMENT.

Nota. Ce Supplément renferme plusieurs plantes que le Jardin royal a acquises depuis la publication de mon Tableau, et autres que j'avois omises. J'y indique aussi un nombre assez considérable d'espèces cultivées dans les pépinières du Roi, près Versailles, dans les jardins de MM. Cels, Noisette et autres, qui manquent à la collection du Jardin des Plantes, et que l'on pourra facilement se procurer par des échanges.

Je me fais un devoir et un plaisir de déclarer ici que mon collègue, M. Bosc, m'a beaucoup aidé dans ce travail, en me communiquant des observations qu'une longue expérience lui a acquises sur plusieurs arbres et arbrisseaux étrangers, dont il a enrichi

les pépinières du Roi, et qu'il y cultive avec un grand succès.

ACER hybridum Bosc. Dict. nigrum Mich. Arbr. Acosmus pruriens Desvaux. Adelia acuminata, p. 235. Boria acuminata willd. sp. \ ligustrina mich. Fl. Boria ligustrina willd. sp.) AGRIPHYLLUM grandiflorum. RHORIA grandistora Thunb. Prodr. Berckheia grandistora willd. sp. ALNUS macrophylla. oblongata willd. sp.

Andromeda acuminata H. K. canescens. lanceolata.

Annona grandislora.

ORCHIDOCARPON grandiflorum mich. Fl.

Annona parviflora.

ORCHIDOCARPON parviflorum mich. Fl.

Annona pygmæa mich. Fl.

ORCHIDOCARPON pygmæum mich. Fl.

Anthemis elongata.

ARALIA pubescens pec. cat.

ARCTOTIS anthemoides L.

Aristolochia tomentosa Bot. Mag.

ARTEDIA squamata L.

Arum pumilum.

Arundo ægyptia.

Asclepias angustifolia willd. H. Ber.

Asparagus amarus Dec. cat.

Aster canus jacq. nort.

ericoides, p. 123, Deleat. L. et mich. Fl. subjice. multiflorus Willd. sp.

ERABLE hybride. Am. s. 5 noir. Am. s. h Acosmus piquant. s. ch. b

à seuill. de troëne. Am. s. 3

AGRIPHYLLUM à grande fleur, cap.

AUNE à grandes feuilles. 19 à feuill. oblongues. Europe. 5 rouge. h

ANDROMEDA acuminé. Am. s. 5 velouté, Am. s.? 5 lancéolé. Am. s.? 5

Annone à grandes fleurs. Am. s.)

à petites fleurs. Am. s. 9

petite. Am. s. 1)

Anthémis à longs pédoncules. O ARALIA pubescent. N. Esp. s. ch. 3 Arctotis anthémoide. cap. O ARISTOLOCHE cotonneuse. Am. s. b. ARTÉDIA écailleux. orient. O ARUM petit. Am. s. T. Roseau d'Egypte. W ACLÉPIAS à f. étroites. mexique? s. ch. 5 ASPERGE à gros fruit. F. T

ASTER incane. Allem. T

heterophyllus willd. Enum. leptophyllus. lithospermifolius H. p. altaicus willd. Enum. paniculatus willd. sp. pannonicus wald. et Kitt. pendulus willd. sp.? reflexus L. secundiflorus. sparsiflorus mich. Fl. ASTRAGALUS micranthus pesvaux, ATRAGENE Sibirica Bot. Magaz. alpina Pallas, Ross. ATRIPLEX salina Desvaux, Journ. BALLOTA discolor. parvifolia. + BARLERIA lactea. Tage 611. BETONICA stricta H. K. (an varietas). BETULA fructicans Pallas, Ross. pontica. pubescens willd. sp. rubra mich. Arbr. BUCHNERA VISCOSA H. K. CACALIA villosa Jacq. Ic. Senecio purpureus willd. sp. } CALADIUM pinnatifidum willd. sp.) ARUM pinnatifidum Jacq. H. sch. CALYCANTHUS nanus Dum. cours. Bot. cult. CAMPANULA lactiflora Fischer. versicolor smith, Fl. Græcæ, prodr. CARDUUS tenuislorus smith, Fl. Cassia sulcata Dec. cat. CHRYSANTHEMUM Broussoneth pers. syn. Pyrethrum grandistorum willd. Enum. CINERARIA heterophylla. platanifolia. Cnicus araneosus. semipinnatus. carduus pratensis Encycl. Commelina pallida willd. H. Ber. rubens red. Lil. Corchorus japonicus willd. sp. Cornus canadensis L.

à feuill. changeantes. Am. s. V.
à feuilles gréles. V.
à feuill. de crémil. sibérie. V.
paniculé. Am. s. V.
de Hongrie. V.

à rameaux inclinés. Am. s. & recourbé. cap. or. 5
à grappes unilatérales. & à fleurs éparses. Am. s. Z.
ASTRAGALE à petites fleurs. &

Atragéné de Sibérie. ¥

ARROCHE des marais. F. O

BALLOTA discolor. or. Z

à petites feuilles or. Z

BARLÉRIA à fl. blanches. s. ch. y

BÉTOINE à fleurs serrées F. Z

BÉTULA arbrisseau. Russie. y

de Pont. y

pubescent. F. y

rouge. Am. s. y

CACALIA velu. cap. or. Z

CACALIA velu. cap. or. Z

CALADIUM pinnatifide. caracas.
s. ch. Z

CALYCANTHUS nain. Am. s. 5

CAMPANULA à fl. blanche. Russie. *
versicolor. orient. or. Z

CHARDON à fleurs menues. F. O Casse sillonnée. s. ch. 5

CHRYSANTHÉME de Broussonet.

canaries. or. 5

CINÉRAIRE à feuilles variables. Z
à feuilles de Platane. s. ch. Z
CNICUS à tête cotonneuse.

pinnatifide. F. Z

COMMÉLINE à fleur pâle. Am. m., s. ch. ¥
ramassée. s. ch. ¥
Corchorus du Japon. or. 5
Cornouiller de Canada. ¥

CRASSULA dejecta Jacq. H. sch. CRATÆGUS sorbifolia. CROTON lineare Jacq. Am.

ALISIER à seuilles de cormier. 5. CROTON à f. linéaires. Aut. s. ch. 5

CRASSULE étalée. cap. or. h

CROTON punctatum Jacq. Dele, et CROTON mucronatum willd. sp. subjice, p. 236.

quinquepartitum. variegatum L.

Cucumis lineatus Bosc. Journ.

d'Hist. nat.

Cupressus disticha L. p. 2/17. TAXODIUM distichum Richard, Ann. du Mus.

Curtisia faginea H. K. CYCLAMEN COUIN Willd. sp. Cyrisus albidus pec. cat. alpinus willd. Enum.

purpureus scop. carn. Dalea purpurea vent. H. cels. DAPHNE altaica Pallas, Ross.

oleoides L. mant.

Dioscoræa waltheri. Dombeys erithroxylum willd. sp.

Donia fruticosa.

glutinosa H. K. inula glutinosa, p. 121. doronicum glutinosum willd.

squarrosa Bot. Magaz.

DRABA fladniziensis Jacq. miscel. Есним parvislorum willd. Enum. Equiserum variegatum willd. sp.)

ramosum Dec. Fl.

Eronium lucidum Lapeyr. Fl. Pyren. ERYTHRINA velutina willd. sp. p. 220, ERYTHRINA velouté. carac. s. ch. 5 Exacum viscosum smith. 1c. Pict. Fagus comptoniifolia (varietas)

FESTUCA multiflora walther.

FLEMINGIA trinervia.

Vel Slamegia trichettrain ju zzy. FRAXINUS caroliniana willd. sp.

lancea Bosc. Dict. longifolia willd. sp. nigra Bosc. Dict. pallida Bosc. Dict. parvifolia Encycl. Richardi Bosc. Dict. viridis mich. Arbr.

FUMARIA formosa H. K. GALIUM ellipticum willd. En. suppl.

à cinq lobes. s. ch. 19 panaché. inde. s. ch. b Concombre strié. cayenne. O

Curtisia à f. de nêtre. cap. or. 5 CYCLAMEN de Cos. or. Z CYTISE blanc. or. 9 des Alpes. b. pourpre. carniole. 3 DALEA à fl. pourpres. Am. s. Z Dapuné de Sibérie. 5

à feuill. d'olivier. orient. or, p DIOSCOREA de Walther. Am. s. Z Dombey A de deux couleurs: 11e

sainte-нélène. s. ch. э

Donia arbrisseau. or. b

à calice rude. Am s.? T DRABA de Fladniz. ¥ VIPÉRINE à petites fleurs. maroc. O

Préle rameuse. F. V

ERODIUM luisant. pyrénées. Z Exacum visqueux. canaries. or. 1 HÉTRE à feuilles de comptonia. 5 FESTUCA à fl. nombreuses. Ain. s. 5 Flémingia à trois nervures. ile de Fr. s. ch. 5 (légumineuses).

FRÊNE de Caroline. or. 5 à feuilles en lance. Am. s. 3 à longues feuilles. Am. s. 3 noir. Am. s. b vert-pâle. Am. s. h à petites seuilles. Esp. 9 de Richard. Am. s. 9

vert. Am. s. b FUMETERRE à gr. fleurs. Am. s. W CAILLELAIT elliptique. 4

Goodia lotifolia H. K.

GRINDELIA inuloides, p. 120. Inula serrata pers. syn. HELIANTHEMUM alpestre. Cistus alpestris jacq. Fl. Austr. œlandicus sacq. ibid. (an Lin.) HERMANNIA flammea Jacq. H. sch.

tenuifolia Bot. Magaz. HIERACIUM foliosum willd. sp. lævigatum willd. H. Ber. ramosum willd. sp. scabrum.

tubulosum, p. 102, species distincta ab H. intybaceo. HIBBERTIA crenata Andr. Rep. grossulariæfolia Bot. Magaz.

Hyosciamus ægyptiacus. senecionis willd. Enum. IBERIS nudicaulis, p. 156. Guepinia iberis Bastard, Fl. suppl TEESDALIA nudicaulis H. K.

ILEX Dahoon mich. Fl.,

opaca H. K. Inis triflora Balbis, Add. Ixona americana Jacq. H. sch. Juglans amara mich. Arbr. aquatica mich. Arbr. squamosa mich. Arbr.

Juncus bicornis mich. Fl. Juniperus rigida.

Laurus diospyroides mich. Fl.

glaucescens. LEONURUS multifidus. LINARIA Viscosa. Antibrhinum viscosum Bot. Magaz. (an Lin.). LITHOSPERMUM dispermum L. retortum Pallas, Itin. (eadem Marsch.).

LOBELIA alata Bill. N. Holl. lutea z.

Lonicera balearica. CAPRIFOLIUM balearicum Dum. cours. Bot. cult.

Lupinus perennis Bot. Magaz. Madia mellosa Jacq. H. sch.

Goodia à feuill. de Lotier. N. Ho. or. 5 (légumineuses).

HÉLIANTHÉME des Alpes. 5

HERMANNIA couleur de feu. cap or. h à feuilles menues. cap. or. 1 EPERVIÈRE feuillue. Hongrie. Z lisse. T

rameuse: Hongrie. T a tiges rudes. Ta

HIBBERTIA à f. crenelées. N. Holl.

Jusquiame d'Egypte. or. Te

Houx pahoon. caroline. or. 3 opaque. Am. s. h IRIS à trois fleurs. T Ixora d'Amérique. mexiq. s. ch. 5 Nover amer. Am. s. b aquatique. Am. s. h écailleux. Am. s. 5 Jone à deux cornes. Am. s. Z GÉNÉVRIER à feuilles roides. N.

Holl. or. 5 LAURIER à feuilles de viospyros. Am. s. h

glaucescent. h L'ÉONURUS lacinié. 🔾

LINAIRE visqueuse. Esp. O

GREMIL à deux graines. sibérie. 🔾

LOBÉLIA ailé. N. Holl. or. W à fleurs jaunes. cap. or. ¥

CHÈVREFEUILLE de Mahon. 5

LUPIN vivace. Am. s. Z. MADIA à fl. pédonculées, chili, O



